

FERNANDO ANGELINI

## **Coleotterofauna del Massiccio del Pollino (Basilicata-Calabria)** *(Coleoptera)*

Nella presente memoria riferisco sui risultati delle ricerche coleotterologiche che ho condotto sul Massiccio del Pollino negli anni dal 1969 al 1985, rivolgendo particolare attenzione a microambienti poco o niente affatto considerati da parte degli innumerevoli entomologi che hanno visitato tale complesso montuoso. Infatti il mio interesse si è anche rivolto all'habitat subcorticale di ceppaie e tronchi abbattuti, al legno marcescente, ai depositi di foglie morte nel sottobosco, ai carpofori fungini.

Ciò ha fruttato il reperimento di 745 specie di Coleotteri nuove per il Pollino, di cui 251 sono nuove anche per la Basilicata o la Calabria e comprendono: *a)* 22 specie di particolare interesse perché finora note di singole Regioni della Penisola o delle Isole; *b)* 4 specie nuove per la fauna italiana; *c)* 1 specie recentemente descritta altrove, nuova per la scienza.

Onde tracciare un quadro complessivo della coleotterofauna del territorio in argomento, l'esposizione di detti reperti inediti viene qui integrata con quanto è già comparso in letteratura per un totale di 1.824 specie di 86 famiglie. Del Pollino erano già note, infatti, 1.079 specie, in gran parte (793 specie) riportate in specifici lavori pubblicati negli Annali dell'Istituto e Museo di Zoologia dell'Università di Napoli o segnalate da COLONNELLI (1974) e, per il resto (286 specie), segnalate da vari Autori in oltre ottanta lavori di sistematica e/o corologia.

Desidero porgere un vivo ringraziamento agli amici Dr. LUIGI DE MARZO (Istituto di Entomologia Agraria dell'Università di Bari) e Dr. FERNANDO MONTEMURRO (Taranto), per la collaborazione nello svolgimento di alcune escursioni, ed inoltre tutti coloro che, attraverso la determinazione del mate-

---

Questo lavoro fa parte delle ricerche programmate e svolte dall'Istituto di Entomologia Agraria dell'Università di Bari sulla Coleotterofauna dell'Italia meridionale. È stato realizzato parzialmente con il contributo finanziario del Ministero Pubblica Istruzione, quota 60%.

riale, la revisione degli elenchi e l'invio di dati, riferimenti bibliografici e consigli, mi hanno permesso di realizzare la presente nota:

Sig. PIETRO ABBAZZI (*Curculionidae*), Dr. VITTORIO ALIQUÒ (*Tenebrionidae* e *Scarabaeidae*), Dr. PAOLO AUDISIO (*Silphidae*, *Cleridae*, *Nitidulidae* e *Rhizophagidae*), Dr. R. BATTEN (*Mordellidae*), Dr. CLAUDE BESUCHET (*Scydmaenidae*, *Ptiliidae* e *Pselaphidae*), Dr. MAURIZIO BIONDI (*Chrysomelidae: Alticini*), Dr. MARCO BOLOGNA (*Oedemeridae* e *Meloidae*), Sig. ITALO BUCCIARELLI (*Carabidae*, *Catopidae*, *Pythidae* e *Anthicidae*), Dr. ROBERTO CALDARA (*Curculionidae*), Dr. CLAUDIO CANEPARI (*Coccinellidae*), Dr. GIORGIO CASTELINI (*Scydmaenidae* e *Pselaphidae*), Dr. ENZO COLONNELLI (*Curculionidae*), Dr. GIANFRANCO CURRETTI (*Buprestidae*), Sig. MAURO DACCORDI (*Chrysomelidae*), Dr. MICHAEL DARBY (*Ptiliidae*), Dr. SEBASTIAN ENDRODY-YOUNGA (*Clambidae*), Dr. F. ESPANOL (*Anobiidae*), Dr. SILVIO FAILLA (*Buprestidae*), Sig. GIORGIO FERRO (*Hydrophilidae*), Dr. GIULIO GARDINI (*Tenebrionidae*), Rev. DON ELIO GENTILI (*Hydrophilidae*), Sig. CARLO GIUSTO (*Apionidae*), Dr. ALFREDO GUGLIELMI (*Elateridae*), Dr. ZOLTAN KASZAB (*Melandryidae*), Dr. JABLOKOFF KHNZORIAN (*Erotilidae*, *Micetophagidae*, *Ptinidae*), Prof. BERNARD KLAUSNITZER (*Helodidae*), Dr. D. G. H. HALSTEAD (*Dermestidae*), Dr. PAVEL HOZMAN (*Staphylinidae*), Dr. VLADIMIR KALIK (*Dermestidae*), Dr. JOHNSON COLIN (*Ptiliidae*, *Cryptophagidae*, *Lathridiidae* e *Anobiidae*), Sig. PIERINO LEO (*Tenebrionidae*), Dr. CARLO LEONARDI (*Chrysomelidae: Alticini*), Dr. GIANFRANCO LIBERTI (*Melyridae*), Sig. ANDREA LIBERTI (*Elateridae*), Dr. GUSTAV A. LOHSE (*Cisidae* e *Anobiidae*), Sig. FERDINANDO MAGINI (*Cerambycidae*), Sig. LUIGI MAGNANO (*Curculionidae*), Prof. GIORGIO MARCUZZI (*Tenebrionidae*), Dr. ALESSANDRO MASCAGNI (*Heteroceridae*), Dr. LUIGI MASUTTI (*Scolytidae*), Prof. ALESSANDRO MINELLI (*Melyridae*), Sig. VITTORIO MONZINI (*Carabidae*), Sig. CARLO MOSCARDINI (*Cantharidae*), Dr. HEINZ W. MUCHE (*Alleculidae*), Dr. HANS MUHLE (*Buprestidae*), Dr. J. MUONA (*Staphylinidae*, *Eucnemidae* e *Melandryidae*), Prof. MASSIMO OLMI (*Dryopidae*, *Elmididae* e *Heteroceridae*), Dr. GIUSEPPE OSELLA (*Curculionidae*), Dr. JOSÉ CARLOS OTERO (*Cryptophagidae*), Sig. MAURIZIO PAVESI (*Carabidae*), Dr. CARLO PESARINI (*Curculionidae*), Dr. HELIO PIEROTTI (*Scarabaeidae*), Dr. RICCARDO PITTINO (*Scarabaeidae*), Dr. ROBERTO POGGI (*Pselaphidae*), Dr. V. PUTHZ (*Staphylinidae: Stenus*), Dr. ENRICO RATTI (*Cucujidae*), Sig. SERGIO RIESE (*Elateridae*), Sig. VITTORIO ROSA (*Staphylinidae*), Dr. WOLFGANG H. RUCKER (*Merophysiidae* e *Lathridiidae*), Sig. LIVIO TAMANINI (*Scaphidiidae*), Sig. MICHELE TEDESCHI (*Coccinellidae*), Dr. PIERPAOLO VIENNA (*Histeridae*), Sig. MARCELLO ZAMPETTI (*Bruchidae*), Dr. ADRIANO ZANETTI (*Staphylinidae*), Sig. STEFANO ZOIA (*Catopidae*), Dr. W. WITTMER (*Cantharidae: Malthinus* e *Malthodes*).

MATERIALI E METODI

Le raccolte sono state svolte nei mesi da aprile a ottobre degli anni dal 1969 al 1985 nel corso di 15 escursioni della durata variabile da 1 a 10 giorni. Limitatamente ai mesi primaverili, è stata esaminata la fauna floricola mentre in ogni periodo si sono raccolti Coleotteri micetofagi, corticicoli, coprofagi e della lettiera. Le tecniche adottate sono state:

- a) raccolta a vista e con vaglio sotto la corteccia di tronchi abbattuti e nel terreno sottostante agli stessi, sfasciume di legno marcio, nei carpofori fungini di ogni consistenza, nello sterco di bovini;
- b) vaglio di foglie morte nel sottobosco, carie di alberi, terriccio alla base di alberi e arbusti;
- c) retino per falcio su erbe e infiorescenze, nei prati o ai margini di boschi e torrenti;
- d) ombrello entomologico per alberi e arbusti;
- e) trappole con varie esche (carne, ossa, carpofori fungini).

Il materiale è stato in gran parte sottoposto all'esame dei diversi specialisti, ma rimangono ancora da studiare una piccola parte di *Corylophidae*, *Staphylinidae*, *Mycetophagidae* ed *Endomychidae* e una gran parte di *Helodidae*, *Throscidae* e *Phalacridae*.

Riguardo alla sequenza di esposizione dei reperti, si precisa che: per le famiglie ci si è basati sull'opera *Die Käfer Mitteleuropas* salvo a tener conto di fonti più recenti nei casi di smembramento (*Dryopidae*, *Curculionidae*) o riunificazione (*Carabidae*); nell'ambito di ciascuna famiglia, generi e specie sono stati disposti in ordine alfabetico, in mancanza di un apposito volume della « Fauna d'Italia », altrimenti si è adottata la sequenza stabilita dagli Autori di tali opere.

Le specie vengono contraddistinte da un \* se nuove per la regione calabro-lucana, con \*\* se particolarmente interessanti, con \*\*\* se nuove per fauna italiana; quelle che risultano endemiche del Massiccio del Pollino o che hanno in esso il loro limite meridionale di diffusione, sono contraddistinte, rispettivamente, con i simboli (E) e (M).

Se la specie è stata reperita in un solo esemplare ciò viene esplicitamente indicato, diversamente sono state usate le seguenti abbreviazioni:

- r. (raro) se reperita una sola volta in 2-5 esemplari;
- p.c. (poco comune) se reperita in più riprese ma in 2-5 esemplari;
- c. (comune) se reperita in più riprese ed in 6-15 esemplari;
- m.c. (molto comune) se reperita in più riprese ed in più di 15 esemplari.

ELENCO DELLE STAZIONI DI RACCOLTA

Versante lucano (prov. Potenza):

1. Terranova Pollino, m 800-1100, dintorni e Canale Duglia.
2. Strada Terranova P.-Duglia, m 1000-1200.
3. Acqua Tremola, m 1400.
4. Duglia, m 1300-1400.
5. Lago Ricciardule, m 1300.
6. Piano delle Mandre, m 1400-1500.
7. Cugno Ruggeri, m 1400-1500.
8. Pantano Grande, m 1380.
9. Lago della Duglia, m 1380.
10. Lago Fondo, m 1500.
11. Cugno dell'Acero, m 1500-1600.
12. Pendici sud-est di Serra delle Ciavole, m 1900.
13. Pendici nord-ovest di Serra Dolcedorme, m 2000.
14. Canale di Malevento, m 1800-1850.
15. Piano Pollino, m 1800.
16. Piano Toscano, m 1800.
17. Fontana di Rummo, m 1670.
18. Madonna di Pollino, m 1570.
19. Colle dell'Impiso, m 1570.
20. Serra del Prete. pendici nord-est, m 1550-1600.
21. Vaccuarro, m 1450-1500.
22. Valloncello di Viggianello, m 1500-1650.
23. Colle Gaudolino, m 1680.
24. Timpa del Demonio, m 1300.
25. Cozzo di Visitone, m 1400.
26. Vallone e Piano Zaverna, m 1300-1550.
27. Serra del Prete, pendici ovest, m 1600.
28. Valle Malvento, m 1510-1590.
29. Piano Ruggio, m 1510-1590.
30. Cozzo Dimoniello, m 1480.
31. Pedarreto, m 1480.
32. Fosso di Mauro, m 1500-1550.
33. Coppola di Paola, pendici nord-est, m 1500-1700.




Fig. 1 - Ubicazione dei biotopi esaminati sul Massiccio del Pollino. I numeri si riferiscono all'elenco delle stazioni di raccolta.

Versante calabro (prov. Cosenza):

- 34. Coppola di Paola, pendici sud e vetta, m 1700-1910.
- 35. Colle del Dragone, m 1600.
- 36. Vallone della Caballa, m 1350-1450.
- 37. Anticristo, m 1100-1300.
- 38. Campotenese, m 950-980.

CARABIDAE

- Cicindela campestris* L.: MAGISTRETTI, 1955 a: Anticristo, r., VII.  
*Cybrus italicus* Bon.: MAGISTRETTI, 1955 a: 1 sub (*C. italicus meridionalis* Chaud.); Piano Pollino, 1 ex., VII; Piano Ruggio, r., VI.  
*Carabus preslii* ssp. *neumeyeri* Schaum: BRUNO, 1970: 52 (sub *C. hortensis neumeyeri* Schaum);  
*Carabus convexus* F.: GOBBI, 1973: 34 (sub *C. convexus paganettii* Born);  
*Carabus lefebvrei* ssp. *bayardi* Sol.: MAGISTRETTI, 1955 a: 3 (sub *C. intricatus lefebvrei* Dej.);  
*Carabus violaceus* ssp. *piceus* Villa: MAGISTRETTI, 1955 a: 51.

- Carabus coriaceus* L.: MAGISTRETTI, 1955 a: 2 (sub *C. coriaceus* n. *mediterraneus* Born).
- Calosoma inquisitor* L.: MAGISTRETTI, 1955 a: 4;
- Calosoma sicophanta* L.: MAGISTRETTI, 1965: 58; Terranova P., 1 ex., VI.
- Leistus spinibarbis* ssp. *fiorii* Lutsh.: MAGISTRETTI, 1955 a: 4; Terranova P., 1 ex., VI; Lago Fondo, r., VI;
- Leistus rufomarginatus* Duft.\*: Duglia, r., VI;
- Leistus fulvibarbis* Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 4; Pantano Grande, r., VI.
- Nebria psammodes* ssp. *schreibersi* Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 4; Cugno Ruggeri, r., VI;
- Nebria kratteri* Dej.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 63; MAGISTRETTI, 1955 a: 5; Duglia, c., VI-VIII; Valle Malvento, p.c., VI; Piano Ruggio, c., VII;
- Nebria brevicollis* F.: Vacquarro, r., VI.
- Notiophilus pusillus* Waterh.: MAGISTRETTI, 1955 a: 82;
- Notiophilus aquaticus* L.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 63; MAGISTRETTI, 1955 a: 83;
- Notiophilus substriatus* Waterh.: Terranova P., 1 ex., VI;
- Notiophilus geminatus* Dej.: Terranova P., p.c., VI-VII;
- Notiophilus rufipes* Curt.: MAGISTRETTI, 1955 a: 5; Piano Ruggio, r., VII;
- Notiophilus biguttatus* F.: MAGISTRETTI, 1955 a: 5; Colle dell'Impiso, p.c., VI; Pedarreto, r., VI.
- Loricera pilicornis* ssp. *apennina* Bin.\*: Duglia, r., VI.
- Clivina fossor* L.: MAGISTRETTI, 1955 a: 6.
- Siagona europaea* Dej.: Duglia, p.c., IX; Campotenesse, 1 ex., VII.
- Asaphidon caraboides* ssp. *nebulosum* Rossi: MAGISTRETTI, 1955 a: 6; Cugno Ruggeri, 1 ex., VII;
- Asaphidon rossii* Schaum: MAGISTRETTI, 1955 a: 6; Terranova P., r., VI;
- Asaphidon stierlini* Heyd.: MAGISTRETTI, 1955 a: 6;
- Asaphidon curtum* Heyd.: Terranova P., 1 ex., VI.
- Bembidion lampros* Herbst: MAGISTRETTI, 1955 a: 6; Acqua Tremola, r., VI;
- Bembidion puntulatum* ssp. *obscuripes* Müll.: Piano Ruggio, 1 ex., VIII;
- Bembidion bipunctatum* ssp. *pyritosum* Rossi: MAGISTRETTI, 1955 a: 7; Pantano Grande, r., VII;
- Bembidion geniculatum* Heer.: MAGISTRETTI, 1955 a: 7;
- Bembidion bugnioni* Dan.: MAGISTRETTI, 1955 a: 7; Duglia, 1 ex., VIII;
- Bembidion nitidulum* Marsh.\*: Fosso di Mauro, r., VI;
- Bembidion dalmatinum* ssp. *latinum* Net.: MAGISTRETTI, 1955 a: 8;
- Bembidion gudenzi* Neri: Duglia, 1 ex., IX;

- Bembidion praeustum* ssp. *fauveli* Ganglb.: MAGISTRETTI, 1955 a: 8; Duglia, 1 ex., IX, leg. e coll. MONTEMURRO;
- Bembidion italicum* De Monte: MAGISTRETTI, 1955 a: 8;
- Bembidion occidentale* Müll.: Duglia, c., VIII; Piano Ruggio, c., VI-VII;
- Bembidion andreae* ssp. *bualei* Duv.: MAGISTRETTI, 1955 a: 8;
- Bembidion hypocrita* Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 9;
- Bembidion eques* ssp. *nobile* Rottbg.: MAGISTRETTI, 1955 a: 9; Vacquarro, 1 ex., VI; Valle Malvento, 1 ex., VII;
- Bembidion decorum* ssp. *ticinense* Meyer: MAGISTRETTI, 1955 a: 8; (M);
- Bembidion jaqueti* ssp. *apenninum* De Monte: MAGISTRETTI, 1955 a: 9; (M);
- Bembidion genei* ssp. *illigeri* Net.: MAGISTRETTI, 1955 a: 9; Acqua Tremola, r., VI;
- Bembidion callosum* Küst.: MAGISTRETTI, 1955 a: 9; Vallone Zaperna, 1 ex., VI; Colle del Dragone, r., VI-VII;
- Bembidion latiplaga* Chaud.: Piano Ruggio, 1 ex., VIII;
- Bembidion escherichi* ssp. *paganettii* Net.: MAGISTRETTI, 1955 a: 7;
- Bembidion luigionii* Müll.\*: Duglia, r., IX, leg. e coll. MONTEMURRO.
- Tachys sexstriatus* Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 9.
- Tachyta nana* Gyll.: MAGISTRETTI, 1955 a: 10; Duglia, 1 ex., IX; (M).
- Perileptus areolatus* Creutz.: MAGISTRETTI, 1955 a: 10.
- Trechus angelae* Magr.: MAGRINI, 1984: 247-258; (E);
- Trechus quadristriatus* Schrk.: MAGISTRETTI, 1955 a: 10; Duglia, r., VIII;
- Trechus obtusus* ssp. *lucanus* Foc.: FOCARILE, 1949: 71; MAGISTRETTI, 1955 a: 10; Coppola di Paola, rif. Rotonda, pendici nord-est, p.c., VI-VII;
- Trechus schatzmayri* Foc.: FOCARILE, 1949: 73; MAGISTRETTI, 1955 a: 10; Duglia, p.c., VIII-IX; (E).
- Chlaenius spoliatus* Rossi: MAGISTRETTI, 1965: 249; Lago Fondo, 1 ex., VI;
- Chlaenius velutinus* Duft.: Campotenese, 1 ex., VI;
- Chlaenius vestitus* Payk.: Duglia, r., IX; Vacquarro, 1 ex., VI;
- Chlaenius chrysocephalus* Rossi: MAGISTRETTI, 1965: 256.
- Badister bipustulatus* F.: MAGISTRETTI, 1955 a: 10; Campotenese, r., VI.
- Licinus silphoides* Rossi: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 64; MAGISTRETTI, 1955 a: 11; Duglia, r., VI-VII;
- Licinus italicus* Puel.: MAGISTRETTI, 1955 a: 262; Piano Ruggio, 1 ex., VI; (M);
- Licinus cassideus* F.: GOBBI, 1973: 34; (M).
- Amblystomus levantinus* Reitt.\*: Duglia, r., VI; Cugno Ruggeri, 1 ex., VI;
- Amblystomus metallescens* Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 12.
- Carterus dama* ssp. *gilvipes* La Brul.: MAGISTRETTI, 1955 a: 12.

- Ditomus clypeatus* Rossi: MAGISTRETTI, 1955 a: 12.  
*Acinopus picipes* Ol.: MAGISTRETTI, 1955 a: 12; Piano Ruggio, 1 ex., VII;  
*Acinopus megacephalus* Rossi: Campotinese, r., VII.  
*Ophonus sabulicola* ssp. *columbinus* Germ.\*: Piano Ruggio, r., VII;  
*Ophonus cordatus* Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 13; (M);  
*Ophonus melleti* ssp. *zigzag* Costa: MAGISTRETTI, 1955 a: 13;  
*Ophonus azureus* ssp. *supremus* Schaub.: Terranova P., r., VI; Campotinese, 1 ex., VII.  
*Harpalus pubescens* Müll.: MAGISTRETTI, 1955 a: 13; Colle del Dragone, r., VII;  
*Harpalus aeneus* F.: MAGISTRETTI, 1955 a: 13; Anticristo, r., VI;  
*Harpalus oblitus* Dej.: MAGISTRETTI, 1965: 291; Terranova P., 1 ex., V;  
*Harpalus distinguendus* Duft.: MAGISTRETTI, 1969: 198; Duglia, r., VI;  
*Harpalus dimidiatus* Rossi: MAGISTRETTI, 1955 a: 13; Duglia, 1 ex., V;  
*Harpalus serripes* Quens.: MAGISTRETTI, 1955 a: 14;  
*Harpalus rubripes* Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 14; Valle Malvento, 1 ex., VI; Pedarreto, r., VI-VII;  
*Harpalus sulphuripes* ssp. *decolor* Schaub.: MAGISTRETTI, 1955 a: 14; Vacquarro, r., VI; Anticristo, c., VII;  
*Harpalus honestus* Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 14; (M);  
*Harpalus rufitarsis* ssp. *decipiens* Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 14;  
*Harpalus attenuatus* Steph.: MAGISTRETTI, 1955 a: 15; Pedarreto, 1 ex., VI;  
*Harpalus impressus* ssp. *latianus* Schaub.: MAGISTRETTI, 1955 a: 15; Terranova P., 1 ex., VI; Campotinese, 1 ex., VII;  
*Harpalus tardus* Panz.: Valle Malvento, p.c., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Pedarreto, 1 ex., VI.  
*Parophonus maculicornis* Duft.: Cugno dell'Acero, 1 ex., VI.  
*Trichotichnus nitens* Heer: MAGISTRETTI, 1955 a: 15; Vacquarro, 1 ex., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VIII; Colle del Dragone, r., VII.  
*Stenolophus teutonius* Schrk.: Piano Ruggio, 1 ex., VII; Anticristo, r., VII;  
*Stenolophus abdominalis* Gené: Terranova P., 1 ex., V; (M).  
*Egadroma marginata* Dej.: Piano Ruggio, 1 ex., VIII.  
*Acupalpus dorsalis* F.: Campotinese, 1 ex., VII.  
*Scybalicus oblongiusculus* Dej.: Valle Malvento, 1 ex., VI.  
*Anisodactylus binotatus* F.: Terranova P., 1 ex., VI; Acqua Tremola, r., VI.  
*Amara ovata* F.: MAGISTRETTI, 1955 a: 15;  
*Amara aenea* Deg.: MAGISTRETTI, 1955 a: 15;  
*Amara eurynota* Panz.: MAGISTRETTI, 1955 a: 15;



- Amara familiaris* Duft.: MAGISTRETTI, 1969: 203; Piano Ruggio, r., VI;  
*Amara anthobia* Villa: MAGISTRETTI, 1955 a: 16; Duglia, r., VIII; Valle Mal-  
vento, r., VI; Piano Ruggio, c., VII;  
*Amara lucida* Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 16;  
*Amara praetermissa* Sahlb.: MAGISTRETTI, 1955 a: 156; (M);  
*Amara apricaria* Payk.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 65 (sub. *Brady-  
tus apricarius* Payk.); MAGISTRETTI, 1955 a: 16;  
*Amara aulica* Panz.: MAGISTRETTI, 1955 a: 16; Valle Malvento, r., VIII; An-  
ticristo, 1 ex., VII;  
*Amara sicula* Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 16.  
*Zabrus tenebroides* Goeze: Duglia, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI;  
*Zabrus costai* Heyd.: MAGISTRETTI, 1955 a: 17; (M).  
*Stomis pumicatus* Panz.: Madonna di Pollino, 1 ex., VI; Valle Malvento, p.c.,  
VI-VII.  
*Poecilus cupreus* ssp. *calabrus* Flach.: Cugno dell'Acero, 1 ex., VII;  
*Poecilus angustatus* Duf.: MAGISTRETTI, 1955 a: 18.  
*Pterosticus niger* Schall.: Terranova P., 1 ex., VI;  
*Pterosticus nigrita* F.: MAGISTRETTI, 1955 a: 19; Terranova P., r., V; Duglia,  
c., VIII; Piano Ruggio, r., VI-VII;  
*Pterosticus strenuus* Panz.: MAGISTRETTI, 1955 a: 19;  
*Pterosticus unctulatus* ssp. *apenninus* Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 19; Piano  
Pollino, r., VII; Colle dell'Impiso, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano  
Ruggio, c., VI-VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est, r., VII;  
*Pterosticus melas* ssp. *italicus* Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 20; molto comune  
ovunque, V-IX;  
*Pterosticus cristatus* ssp. *picipes* Chaud.: MAGISTRETTI, 1955 a: 20; Duglia, 1  
ex., IX; Valle Malvento, 1 ex., VIII;  
*Pterosticus bicolor* ssp. *amorei* Ganglb.: MAGISTRETTI, 1955 a: 20; molto co-  
mune ovunque, V-IX.  
*Abax ater* ssp. *curtulus* Fairm.: MAGISTRETTI, 1955 a: 20; Terranova P., r., VI.  
*Percus bilineatus* Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 21; Duglia, 1 ex., IX; Coppola  
di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VI; (M).  
*Platyderus canaliculatus* ssp. *jannei* Bin.: MAGISTRETTI, 1955 a: 21; Cugno  
dell'Acero, 1 ex., VII.  
*Calathus montivagus* Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 25; Duglia, r., IX; pendici  
sud-est di Serra delle Ciavole, r., VI; Canale di Malevento, 1 ex., VI; An-  
ticristo, 1 ex., VI; Campotenese, m.c., VI-VIII;  
*Calathus fracassii* Heyd.: MAGISTRETTI, 1955 a: 24 (sub *C. luctuosus fracassii*  
Heyd.); Vacquarro, 1 ex., VI;

- Calathus sirentensis* D'Am.: MAGISTRETTI, 1955 a: 24; (M);  
*Calathus fuscipes* ssp. *latus* Serv.: MAGISTRETTI, 1955 a: 25; molto comune ovunque, VI-X;  
*Calathus mollis* Marsh.: MAGISTRETTI, 1955 a: 26; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VII;  
*Calathus melanocephalus* L.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 65; MAGISTRETTI, 1955 a: 26; Duglia, r., VI-VII;  
*Calathus piceus* Marsh.: MAGISTRETTI, 1955 a: 26; Valle Malvento, p.c., VIII; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, 1 ex., VII.  
*Laemosthenes venustus* Dej.\*: Anticristo, 1 ex., VI.  
*Synuchus nivalis* Panz.: MAGISTRETTI, 1955 a: 26.  
*Odontonyx glabricollis* Germ.: MAGISTRETTI, 1955 a: 26 (sub *Olisthopus glabricollis* Germ.).  
*Agonum marginatum* L.: Anticristo, p.c., VIII;  
*Agonum viridicupreum* Goeze: MAGISTRETTI, 1969: 213; Terranova P., c., V; *Agonum muelleri* ssp. *unicolor* Leoni: MAGISTRETTI, 1955 a: 27; Colle del Dragone, 1 ex., VII.  
*Anchus ruficornis* Goeze \*: Duglia, 1 ex., VIII; Anticristo, r., VIII.  
*Anchomenus dorsalis* Pont.: MAGISTRETTI, 1955 a: 27.  
*Lebia cyanocephala* L.: MAGISTRETTI, 1955 a: 27; Fosso Mauro, 1 ex., VI;  
*Lebia humeralis* Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 27; Piano Ruggio, r., VI;  
*Lebia cruxminor* ssp. *nigripes* Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 27; Timpa del Demonio, 1 ex., VI; Fosso Mauro, 1 ex., VI; Anticristo, r., VII;  
*Lebia trimaculata* Vill.\*: Duglia, r., VIII; Fosso Mauro, p.c., VI;  
*Lebia marginata* Fourcr.: MAGISTRETTI, 1955 a: 28; Piano Toscano, 1 ex., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Vacquaro, c., VI;  
*Lebia scapularis* Fourcr.: Terranova P., 1 ex., VI.  
*Demetrias atricapillus* L.: Piano Ruggio, c., VI-VII; Campotenese, 1 ex., VII.  
*Dromius linearis* Ol.: MAGISTRETTI, 1955 a: 28;  
*Dromius agilis* F.: GOBBI, 1973: 34; (M);  
*Dromius quadrimaculatus* L.\*: Duglia, 1 ex., IX; Campotenese, c., VII; (M).  
*Philorbizus quadrisignatus* Dej.: Campotenese, r., VII;  
*Philorbizus melanocephalus* Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 28; Campotenese, r., VII;  
*Philorbizus crucifer* Luc.: Duglia, 1 ex., VIII; Anticristo, 1 ex., VI.  
*Microlestes maurus* Sturm \*: Duglia, r., VIII.  
*Lionychus quadrillum* Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 28.  
*Cymindis axillaris* ssp. *distinguenda* Chaud.: MAGISTRETTI, 1955 a: 28 (sub *C. axillaris* F.); Colle del Dragone, 1 ex., VI;

- Cymindis scapularis* ssp. *etrusca* Bassi: MAGISTRETTI, 1955 a: 29; Terranova P., 1 ex., VI; Pedarreto, 1 ex., VII.  
*Brachynus sclopeta* F.\*: Piano Ruggio, 1 ex., VII;  
*Brachynus explodens* Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 29;  
*Brachynus crepitans* L.: MAGISTRETTI, 1955 a: 29.  
*Clinidium canaliculatum* Costa: GOBBI, 1973: 33; Duglia, p.c., VI-VII.

#### HALIPLIDAE

- Haliplus obliquus* F.: L. Ricciardule, r., VI;  
*Haliplus ruficollis* Deg.: ANGELINI, 1978: 75; L. Ricciardule, c., VI-VII.

#### HYGROBIIDAE

- Hygrobia tarda* Herbst: Terranova P., r., VI.

#### DYTISCIDAE

- Bidessus minutissimus* Germ.: Terranova P., c., VI; Anticristo, r., VI.  
*Guignotus pusillus* F.: SANFILIPPO, 1955: 1; Campotenese, c., VI-VII.  
*Hygrotus inaequalis* F.: ANGELINI, 1978: 115; Duglia, r., VII; L. Ricciardule, c., VII; Piano Ruggio, c., VIII; Anticristo, r., VI.  
*Hydroporus pubescens* Gyll.: BERTRAND, 1956: 6; L. Ricciardule, p.c., VII; Anticristo, r., VI-VII;  
*Hydroporus pubescens* ssp. *habelmanni* Wehn.: SANFILIPPO, 1955: 2;  
*Hydroporus planus* F.: ANGELINI, 1982: 62; Terranova P., r., VI; L. Ricciardule, r., VII;  
*Hydroporus discretus* Fairm.: SANFILIPPO, 1955: 2; Piano Pollino, p.c., VII; Anticristo, r., VII;  
*Hydroporus analis* Aubé: ANGELINI, 1978: 85;  
*Hydroporus palustris* L.: FOCARILE, 1960 a: 68; L. Ricciardule, c., VI-IX; Duglia, c., VI-VII;  
*Hydroporus tessellatus* Drap.: SANFILIPPO, 1955: 2; BERTRAND, 1956: 2; Duglia, r., VI; Piano Pollino, r., VII;

- Hydroporus nigrita* F.: Terranova P., p.c., VI; Piano Pollino, r., VII;  
*Hydroporus obsoletus* Aubé: SANFILIPPO, 1955: 2; BERTRAND, 1956: 3; Terranova P., r., VI;  
*Hydroporus memnonius* Nicol.: SANFILIPPO, 1955: 2; L. Ricciardule, c., VII; Piano Pollino, r., VII; Vacquarro, c., VI.  
*Graptodytes varius* Aubé: ANGELINI, 1982: 71; Terranova P., 1 ex., VII; L. Ricciardule, 1 ex., VII;  
*Graptodytes concinnus* Steph.: ANGELINI, 1978: 115 (sub *G. flavipes* Ol.); L. Ricciardule, r., VII; Campotenesse, c., VI-VII.  
*Porhydrus lineatus* F.: ANGELINI, 1978: 88; L. Ricciardule, r., VII.  
*Scarodytes halensis* F.: BERTRAND, 1956: 3;  
*Scarodytes ruffoi* Franc.: ANGELINI, 1978: 89; Duglia, r., VII.  
*Deronectes delarouzei* Duv.: ANGELINI, 1978: 96; Duglia, r., VII; Cugno Acero, 1 ex., VIII; Vacquarro, r., VI;  
*Deronectes moestus* Fairm.: BERTRAND, 1956: 3.  
*Potamonectes griseostriatus* Deg.: ANGELINI, 1978: 97; Duglia, r., VII;  
*Potamonectes sansi* Aubé: BERTRAND, 1956: 3.  
*Noterus clavicornis* Deg.: L. Ricciardule, c., VI-VII; L. Fondo, p.c., VI.  
*Laccophilus minutus* L.: SANFILIPPO, 1955: 1; L. Ricciardule, r., VII; Piano Pollino, r., VII; Vacquarro, c., VI-VII.  
*Agabus didymus* Ol.: SANFILIPPO, 1955: 3; BERTRAND, 1956: 5; L. Ricciardule, c., VII; Vacquarro, c., VI;  
*Agabus biguttatus* Ol.: SANFILIPPO, 1955: 3; BERTRAND, 1956: 4; Duglia, c., VI-VII; Vacquarro, c., VI-VII;  
*Agabus biguttatus* f. *nitidus* F.: SANFILIPPO, 1955: 3;  
*Agabus guttatus* Payk.: ANGELINI, 1978: 101; Duglia, r., VII;  
*Agabus bipustulatus* L.: SANFILIPPO, 1955: 3; BERTRAND, 1956: 4; L. Ricciardule, p.c., VII;  
*Agabus paludosus* F.: L. Ricciardule, r., VI;  
*Agabus nebulosus* Först.: SANFILIPPO, 1955: 3;  
*Agabus chalconotus* Panz.: ANGELINI, 1978: 102; L. Ricciardule, c., VII.  
*Ilybius ater* Deg.: ANGELINI, 1978: 103; L. Ricciardule, 1 ex., VII;  
*Ilybius fuliginosus* F.: Lago Ricciardule, r., VI.  
*Colymbetes fuscus* L.: Terranova P., p.c., VI.  
*Acilius sulcatus* L.: SANFILIPPO, 1955: 3.  
*Dytiscus marginalis* L.: ANGELINI, 1978: 115; L. Ricciardule, r., VII; Duglia, 1 ex., VI.

GYRINIDAE

- Aulonogyrus striatus* F.: SANFILIPPO, 1955: 4.  
*Gyrinus substriatus* Steph.: SANFILIPPO, 1955: 4; BERTRAND, 1956: 5; L. Ricciardule, p.c., VII; Vacquarro, r., VI-VII.

HYDROPHILIDAE

- Anacaena bipustulata* Marsh.: Fontana di Rummo, r., V; Valle della Caballa, r., VI;  
*Anacaena globulus* Payk.: Duglia, r., V-IX; Vacquarro, 1 ex., VI; Valle della Caballa, p.c., VI;  
*Anacaena limbata* F.: Lago Fondo, r., VI.  
*Berosus signaticollis* Sharp: Lago Ricciardule, r., V-VII; Lago Fonfo, r., VI.  
*Cercyon haemorrhoidalis* F.: Vacquarro, c., VI-IX; Colle Gaudolino, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., V-X;  
*Cercyon quisquilius* L.\*: Piano Pollino, r., VII; Piano Zaperna, c., V-VII;  
*Cercyon unipunctatus* L.\*: Vacquarro, c., VI-VIII; Colle Gaudolino, 1 ex., VII.  
*Coelostoma orbiculare* F.: Piano Zaperna, p.c., VI.  
*Cryptopleurum minutum* F.: Timpa del Demonio, c., VII; Cozzo di Visitone, c., VII.  
*Elophorus aquaticus* ssp. *italus* Kuw.: Piano Ruggio, p.c., VI;  
*Elophorus asperatus* Rey: CHIESA, 1959: 96; (M);  
*Elophorus brevipalpis* Bed.: Piano Zaperna, 1 ex., VII;  
*Elophorus discrepans* Rey: CHIESA, 1959: 98; (M);  
*Elophorus erichsoni* Bach.: CHIESA, 1959: 102;  
*Elophorus glacialis* Villa: CHIESA, 1959: 86; (M);  
*Elophorus granularis* Er.: Valloncello di Viggianello, r., VII;  
*Elophorus maritimus* Rey: Lago Ricciardule, c., V-VIII; Lago Fondo, r., VI-VII; Piano Pollino, c., VI;  
*Elophorus minutus* F.\*: Duglia, c., VI; Lago Ricciardule, c., VI;  
*Elophorus rufipes* Bosch.: CHIESA, 1959: 79;  
*Elophorus viridicollis* Steph.: Piano Pollino, r., VII; Piano Ruggio, c., V-VII; Pedarreto, r., VI.  
*Helochares lividus* Först.: Vacquarro, c., V-X.  
*Hydraena devillei* Ganglb.\*\*: Vacquarro, c., VI-VII; Valle della Caballa, 1 ex., VI; nota di Liguria, Piemonte, Emilia, Toscana, I. Elba (CHIESA, 1959: 65);

- Hydraena imperatrix* Knisch.: CHIESA, 1959: 41;  
*Hydraena riparia* Kug.\*: Duglia, p.c., VII; Lago Ricciardule, r., V-VII;  
*Hydraena truncata* ssp. *falzonii* Pretner: CHIESA, 1959: 57.  
*Hydrobius fuscipes* L.: Vacquarro, c., V-VIII.  
*Hydrochus angustatus* ssp. *flavipennis* Küst.: Piano Pollino, 1 ex., VII;  
*Hydrochus grandicollis* Kiesw.: Lago Fondo, r., V-VII.  
*Laccobius obscuratus* Rottbg.: GENTILI & CHIESA, 1975: 139;  
*Laccobius neapolitanus* Rottbg.: GENTILI & CHIESA, 1975: 146.  
*Limnebius furcatus* Baudi: Valle della Caballa, 1 ex., VI;  
*Limnebius nitiduloides* Baudi\*: Fontana di Rummo, r., V-VII; Valloncello di Viggianello, r., VI;  
*Limnebius papposus* Muls.\*: Lago Ricciardule, c., V-VI; Lago Fondo, c., VI.  
*Megasternum boletophagum* Marsh.\*: Piano Toscano, r., VI.  
*Ochthebius difficilis* Muls.\*: Duglia, r., V-VI; Piano Ruggio, r., VI;  
*Ochthebius ragusai* Kuw.: Duglia, 1 ex., VI.  
*Philydrus quadripunctatus* Herbst: Valloncello di Viggianello, 1 ex., X.  
*Sphaeridium bipustulatum* F.: Colle Gaudolino, c., VI-VII; Piano Ruggio, c., VI-VIII;  
*Sphaeridium scarabaeoides* L.: Vacquarro, c., V-VIII;  
*Sphaeridium substriatum* Fald.: Piano Zaperna, r., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII.

#### HISTERIDAE

- Plegaderus dissectus* Er.: VIENNA, 1980: 80; Vacquarro, 1 ex., VI.  
*Abraeus granulum* Er.\*: Valle Malvento, 1 ex., VIII;  
*Abraeus globosus* Hoffm.: Coppola di Paola, versante sud, p.c., VII.  
*Saprinus detersus* Ill.: VIENNA, 1980: 138; Piano Ruggio, 1 ex., VI;  
*Saprinus semistriatus* Scriba: MÜLLER, 1955: 1;  
*Saprinus subnitescens* Bickh.: VIENNA, 1971: 255; probabilmente vanno riferiti a questa specie gli exx. citati da MÜLLER (l.c.) sub *S. semistriatus* Scriba;  
*Saprinus furvus* Er.: MÜLLER, 1955: 1; Terranova P., r., VI;  
*Saprinus acuminatus* F.: MÜLLER, 1955: 2 (sub *S. subnitidus* Marsh.);  
*Saprinus tenuistrius* ssp. *sparsutus* Solsky: MÜLLER, 1955: 2.  
*Saprinus calatravensis* Fuente: MÜLLER, 1955: 2 (sub *S. angoranus* Bickh.);  
*Saprinus politus* Brahm.: MÜLLER, 1955: 3; Vacquarro, r., VII;  
*Saprinus veris. immundus* Gyll.: MÜLLER, 1955: 3;

- Saprinus incognitus* Dahl.: VIENNA, 1971: 279; Piano Ruggio, 1 ex., VII.  
*Kissister minimus* Aubé: Duglia, r., V; Piano delle Mandre, r., VI.  
*Carcinops pumilio* Er.: Piano Ruggio, r., VII.  
*Platylomalus complanatus* Panz.: Duglia, r., VII.  
*Paromalus flavicornis* Herbst: MÜLLER, 1955: 3; Colle dell'Impiso, c., VI;  
Valle Malvento, c., VIII;  
*Paromalus parallelepipedus* Herbst: VIENNA, 1980: 227; Terranova, P., r., IX.  
*Epielus comptus* Ill.: Duglia, r., IX; Pantano Grande, 1 ex., VI;  
*Epielus italicus* Payk.: Coppola di Paola, pendici nord-est, p.c., VI-VII.  
*Onthophilus striatus* Först.: Duglia, r., V-VII; Cugno Ruggeri, 1 ex., VI.  
*Pachylister inaequalis* Ol.: MÜLLER, 1955: 4 (sub *Hister inaequalis* Ol.); Vac-  
quarro, r., VII.  
*Hister quadrimaculatus* L.: MÜLLER, 1955: 5; Piano Ruggio, r., VI-VII;  
*Hister teter* Truqui\*: Piano Ruggio, 1 ex., VII;  
*Hister uncinatus* Ill.: MÜLLER, 1955: 5; Vacquarro, c., VI; Colle Gaudolino,  
r., VII.  
*Margarinotus succicola* Thoms.: MÜLLER, 1955: 5 (sub *Hister striola* Sahlb.);  
*Margarinotus purpurascens* Herbst: strada Terranova P.-Duglia, r., VI;  
*Margarinotus neglectus* Germ.: MÜLLER, 1955: 6 (sub *Hister neglectus* Germ.);  
Duglia, r., VII, leg. MONTEMURRO;  
*Margarinotus ventralis* Marsh.: MÜLLER, 1955: 6 (sub *Hister ventralis* Marsh.);  
*Margarinotus ignobilis* Marsh.\*: Campotenese, 1 ex., VI; (M);  
*Margarinotus stigmaticus* Marsh.\*: Campotenese, 1 ex., VI.  
*Atholus duodecimstriatus* Schrnk.: MÜLLER, 1955: 6 (sub *Hister duodecim-*  
*striatus* Schrnk.).  
*Platysoma frontale* Payk.: MÜLLER, 1955: 4; Coppola di Paola, r., VII;  
*Platysoma compressum* Herbst: MÜLLER, 1955: 4.  
*Cylister oblongus* F.: Anticristo, 1 ex., VII; Campotenese, r., VI-VII.  
*Hetaerius ferrugineus* Ol.: Campotenese, 1 ex., VII.

#### SILPHIDAE

- Ablattaria laevigata* F.: TAMANINI, 1955: 18; Terranova P., r., VI-VII.  
*Aclypea undata* Müll.\*: Duglia, 1 ex., VII; Colle del Dragone, 1 ex., VII.  
*Necrophorus interruptus* Steph.: TAMANINI, 1955: 17; Coppola di Paola, pen-  
dici nord-est, m.c., VII.  
*Silpha olivieri* Bedel: TAMANINI, 1955: 18; Valloncello di Viggianello, 1 ex.,  
VI;

*Silpha tristis* Ill.: TAMANINI, 1955: 18.

*Thanatophilus rugosus* ssp. *tubercolosus* Dep.: TAMANINI, 1955: 18; Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VI-VII; Colle del Dragone, c., VII.

*Xylodrepa quadripunctata* Schreb.\*: Duglia, r., VI; Campotere, r., VI.

#### LEPTINIDAE

*Leptinus testaceus* Müll.: Piano Ruggio, r., VII; vaglio in nido di topo sotto un tronco abbattuto.

#### CATOPIDAE

*Anemadus strigosus* ssp. *pollinensis* Tam.: TAMANINI, 1955: 1; Colle del Dragone, r., VII; Valle Malvento, c., VI; (E).

*Bathysciola* (Salfia) *ruffoi* Tam.: TAMANINI, 1955: 6; (E).

*Catops fuliginosus* f. *inermis* Jeannel: TAMANINI, 1955: 4; Valle Malvento, c., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII;

*Catops kirbyi* Spence\*: Vacquarro, 1 ex., VII; noto di Trentino A. Adige, Toscana, Lazio, Abruzzo (LUIGIONI, 1929: 334);

*Catops nigricans* Spence: Colle del Dragone, r., VI;

*Catops tristis* Panz.\*: Piano Ruggio, 1 ex., VII; (M).

*Choleva cisteloides* Fröl.: TAMANINI, 1955: 4; Serra del Prete, pendici ovest, 1 ex., VI.

*Nargus badius* Sturm: Colle Gaudolino, c., VII; Valle Malvento, 1 ex., VIII; Piano Ruggio, c., V-VIII; Coppola di Paola, pendici sud, c., VII; Colle del Dragone, p.c., V-VII;

*Nargus velox* Spence: Serra del Prete, pendici nord-est, r., VI-VIII; Valle Malvento, r., VIII; Colle del Dragone, c., V-VIII;

*Nargus wilkini* Spence\*: Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, p.c., VI-VIII.

*Sciodrepoides watsoni* Spence: Fontana Rummo, 1 ex., VII.

#### COLONIDAE

*Colon griseum* Czwal.: TAMANINI, 1955: 11.

#### LEIODIDAE

*Agaricophagus cephalotes* Schmidt: Duglia, 1 ex., VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII; (M).



- Leiodes badia* Sturm: Piano Ruggio, 1 ex., VI;  
*Leiodes longipes* Schmidt \*: Piano Ruggio, r., VI; LUIGIONI (1929: 344) lo cita del Veneto sub *L. curta* Fairm.; (M);  
*Leiodes polita* Marsh.: Piano Ruggio, 1 ex., VIII.  
*Anisotoma castanea* Herbst \*: Duglia, r., VI; Colle del Dragone, p.c., VII;  
*Anisotoma glabra* F.: TAMANINI, 1955: 12; Colle del Dragone, r., VII;  
*Anisotoma humeralis* F.\* Duglia, p.c., VI;  
*Anisotoma orbicularis* Herbst \*: Duglia, c., VI; Piano Ruggio, p.c., VII.  
*Amphycillis globus* F.: TAMANINI, 1955: 12; Piano Ruggio, r., VI-VII.  
*Agathidium badium* Er.: Vacquarro, c., VIII; Piano Ruggio, c., VI-VII;  
*Agathidium italicum* Hlism.\*: Duglia, 1 ex., IX; Vacquarro, p.c., VI-VII; Piano Ruggio, c., VII-VIII; (M);  
*Agathidium mandibulare* Sturm \*: Duglia, p.c., IX; Cugno Ruggeri, r., VII; Colle Gaudolino, r., VII; Piano Ruggio, ec., VII;  
*Agathidium marginatum* Sturm \*: Valle Malvento, 1 ex., VI; noto di App. Ligure, Piemonte, Trentino A. Adige (LUIGIONI, 1929: 347);  
*Agathidium montemurroi* Ang. & Dmz.\*\*\*: Duglia, r., IX; specie nuova per la scienza descritta su exx. del Pollino e di altre località italiane ed estere (ANGELINI & DE MARZO, 1985: 172);  
*Agathidium nigrinum* Sturm \*: Piano Ruggio, p.c., VI;  
*Agathidium nigripenne* F.: Coppola di Paola, pendici nord-est, p.c., VI-VII;  
*Agathidium nudum* Hampe: M. Pollino, 1 ex., VII, coll. Mus. Milano;  
*Agathidium obenbergeri* Hlism.: Vacquarro, c., VI; Colle Gaudolino, p.c., VII; Colle del Dragone, p.c., VI;  
*Agathidium pisanum* Bris.: SCHATZMAYR, 1943: 96; Terranova P., c., V-VII; Piano Ruggio, c., VI-VII; Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VIII; Colle del Dragone, r., VI-VII;  
*Agathidium plagiatum* Gyll.: Duglia, p.c., IV;  
*Agathidium rotundatum* ssp. *paganettii* Reitt.\*: Valle Malvento, c., VIII; Piano Ruggio, c., VII-VIII;  
*Agathidium seminulum* L.\*: Duglia, c., VIII; Timpa del Demonio, p.c., VI.

#### CLAMBIDAE

- Clambus pallidulus* Reitt.\*: Colle Gaudolino, r., VII; Piano Ruggio, r., VI; LUIGIONI (1929: 349) lo segnala di Sardegna, ENDRÖDY-YOUNGA (1960: 278) anche di I. Elba, Toscana, Calabria, Sicilia.  
*Loricaster testaceus* ssp. *pumilus* Reitt.\*: Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, c., VI-VIII.

SCYDMAENIDAE

- Cephennum apicale* Reitt.\*: Piano Ruggio, 1 ex., VII.  
*Euthicomus conicicollis* Fairm.\*: Serra del Prete, pendici nord-est, 1 ex., VII;  
noto nel Lazio (LUIGIONI, 1929: 316); (M).  
*Mastigus heydeni* Rottbg.: BORDONI & CASTELLINI, 1973: 312; Terranova P.,  
r., VI-VII;  
*Mastigus pilifer* Kr.: BORDONI & CASTELLINI, 1973: 314; Terranova Pollino,  
c., V-IX.  
*Microscydmus nanus* Shaum \*: Terranova P., 1 ex., VII; (M).  
*Neuraphes angulatus* Müll. & Kunze \*\*: Piano Ruggio, 1 ex., VII; noto di  
Piemonte, Veneto, Emilia, Toscana, Umbria (LUIGIONI, 1929: 319);  
*Neuraphes planiceps* Reitt.\*: Colle del Dragone, 1 ex., VI.  
*Scydmaenus hellwigi* Herbst: Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VII.  
*Stenichnus egrepius* Holdh.\*: Piano Ruggio, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO.

CORYLOPHIDAE

- Sacium nanum* Muls.\*: Campotinese, 1 ex., VII.  
*Sericoderus revelierei* Reitt.\*: Campotinese, p.c., VI-VII.

PTILIIDAE

- Acrotrichis montandoni* Allib.: Duglia, 1 ex., VIII;  
*Acrotrichis sitkaensis* Motsch. (= *fratercula* auct.) \*\*\*: Terranova P., 1 ex.,  
16.VI.1985; specie nuova per la fauna italiana; SUNDT (in *Die Käfer Mitt.*,  
1971: 342) ne definisce « poco chiara » (Verbreitung noch unklar) la dif-  
fusione in Europa, sub *fratercula* Rossk.); (M).  
*Ptenidium laevigatum* Er.: Duglia, c., VIII; Vacquarro, c., VI; Valle Malvento,  
r., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII;  
*Ptenidium turgidum* Thoms.: Duglia, c., VIII; LUIGIONI (1929: 1016) lo in-  
serisce nel capitolo « specie dubbie »; ANGELINI & MONTEMURRO (1986:  
in stampa) lo indicano di Policoro; (M).  
*Pterix suturalis* Heer \*: Piano Ruggio, 1 ex., VII.  
*Ptiliolum marginatum* Aubé \*\*: Terranova P., 1 ex., VII; noto di Liguria,  
Piemonte e Sicilia (LUIGIONI, 1929: 352);

*Ptiliolum schwarzi* Flach \*\*: Terranova P., 1 ex., VII; noto di Piemonte, Toscana e Lazio (LUIGIONI, 1929: 353); (M).

SCAPHIDIIDAE

*Scaphidium quadrimaculatum* Ol.: TAMANINI, 1955: 12; Coppola di Paola, pendici sud, r., VI-VII.

*Scaphium immaculatum* Ol.: Acqua Tremola, r., VI.

*Scaphosoma boleti* Panz.: Piano Ruggio, 1 ex., VII; (M);

*Scaphosoma boreale* Lundbl.: LOBL, 1970: 774;

*Scaphosoma italicum* Tam.: TAMANINI, 1955: 15; Terranova P., c., V-IX; Duglia, r., IX; Vacquarro, c., VI-VIII; Valle Malvento, c., VI-VIII; Piano Ruggio, c., V-VIII; Anticristo, c., VI-VII;

*Scaphosoma subalpinum* Reitt.: TAMANINI, 1955: 13; Piano Ruggio, 1 ex., VII.

STAPHYLINIDAE

*Acrolocha amabilis* Heer: ZANETTI, 1978: 548; Duglia, r., IX; (M).

*Acrotona sordida* Marsh.: Valle Malvento, 1 ex., VII.

*Aleochara albovillosa* Bernh.: Colle Gaudolino, 1 ex., VII;

*Aleochara bipustulata* L.: GRIDELLI, 1956 a: 29; Anticristo, r., VII;

*Aleochara curtula* Goeze: Colle Gaudolino, r., VII;

*Aleochara intricata* Mannh.: GRIDELLI, 1956 a: 29; Coppola di Paola, pendici sud, r., VII;

*Aleochara ripicola* Rey \*: Duglia, 1 ex., VII;

*Aleochara sparsa* Heer \*: Piano Ruggio, 1 ex., VII;

*Aleochara tristis* Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 29.

*Amphicroum canaliculatum* Er.: GRIDELLI, 1956 a: 6 (sub *A. albanicum* Bernh. sensu SCHEERPELTZ).

*Anotylus inustus* Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 8 (sub *Oxytelus inustus* Gravh.); Piano Ruggio, r., VII-VIII;

*Anotylus nitidulus* Gravh.: Colle del Dragone, 1 ex., VI;

*Anotylus rugosus* F.: Duglia, r., VIII;

*Anotylus sculpturatus* Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 8 (sub *Oxytelus sculpturatus* Gravh.).

*Anthophagus alpestris* ssp. *kochi* Bern.\*\*: Vallone Zaperna, 2 exx., VI; Valle Malvento, 2 exx., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; (M);

- Anthophagus bicornis* Block: KOCH, 1934: 146;  
*Anthophagus fauveli* ssp. *caprai* Koch: GRIDELLI, 1956 a: 8; Duglia, 1 ex., VIII; Piano Ruggio, r., VI;  
*Anthophagus torretassoi* ssp. *pollinensis* Koch: KOCH, 1934: 188; GRIDELLI, 1956 a: 7; Vacquarro, p.c., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, c., VI; Coppola di Paola, pendici sud-est, r., I; Anticristo, 1 ex., VI; (E).  
*Arpedium platyophthalmum* Koch: KOCH, 1937: 84; (E).  
*Astilbus italicus* Bernh.: GRIDELLI, 1956 a: 28.  
*Atheta britanniae* S.B.: Valle Malvento, 1 ex., VIII;  
*Atheta castanoptera* Mannh.: GRIDELLI, 1956 a: 26;  
*Atheta fulvipennis* Muls. & Rey: GRIDELLI, 1956 a: 26;  
*Atheta hygrotopora* Kr.: SCHEERPELTZ, 1956: 24; GRIDELLI, 1956 a: 26 (sub *Atheta salfii* Scheerp.);  
*Atheta leonhardi* Bernh.: GRIDELLI, 1956 a: 27;  
*Atheta longiuscula* Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 27;  
*Atheta pallidicornis* Thoms.: Valle Malvento, 1 ex., VIII;  
*Atheta pollinensis* Scheerp.: SCHEERPELTZ, 1956: 26; GRIDELLI, 1956 a: 27; (E);  
*Atheta rey* Kiesw.: GRIDELLI, 1956 a: 27;  
*Atheta sulcifrons* Steph.: GRIDELLI, 1956 a: 26.  
*Autalia ? impressa* Ol.: Pantano Grande, 1 ex., VI.  
*Baptolinus affinis* Payk.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 68; GRIDELLI, 1956 a: 11; molto comune ovunque, sotto cortecce, IV-X.  
*Bledius fossor* Er.: Campotinese, 1 ex., VII.  
*Bolitobius exoletus* Er.: Duglia, p.c., IX;  
*Bolitobius lunulatus* L.: GRIDELLI, 1956 a: 22; Duglia, r., IX; Valle Malvento, c., VIII;  
*Bolitobius thoracicus* F.: Cugno Ruggeri, r., VI-VIII.  
*Bolitochara lucida* Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 25; Valle Malvento, 1 ex., VIII;  
*Bolitochara obliqua* Er.: GRIDELLI, 1956 a: 25; Valle Malvento, c., VIII.  
*Bryocharis inclinans* Gravh.\*: Valle Malvento, 1 ex., VI; noto di A. Marittime, App. Emiliano e Toscano, Lazio (LUIGIONI, 1929: 245).  
*Bryoporus rufus* Er.: GRIDELLI, 1956 a: 22; Piano Ruggio, r., VI.  
*Caloderina hierosolymitana* Saulcy: GRIDELLI, 1956 a: 24.  
*Crataraea suturalis* Mannh.\*: Cozzo di Visitone, r., VI.  
*Creophilus maxillosus* L.: GRIDELLI, 1956 a: 18; Terranova P., 1 ex., VI.  
*Deleaster dichrous* Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 8; Duglia, r., VIII, leg. DE MARZO.  
*Deliphrosoma platyophthalmum* Koch: KOCH, 1937: 233; GRIDELLI, 1956 a:

- 6 (sub *Arpedium platyophthalmum* Koch); ZANETTI, 1978: 175-181; (M).  
*Euryusa optabilis* Heer\*: Acqua Tremola, r., VI.  
*Eusphalerum bargaglii* Luze: GRIDELLI, 1956 a: 4 (sub *Anthobium sorbi* Gyll.);  
ZANETTI, 1982: 124; Vallone Zaperna, 1 ex., VI; (M);  
*Eusphalerum baudii* Fiori: GRIDELLI, 1956 a: 3 (sub *Anthobium baudii* Fiori);  
Piano Ruggio, p.c., VI; Anticristo, r., VI;  
*Eusphalerum bivittatum* Epp.\*\*: Piano Ruggio, 1 ex., VII;  
*Eusphalerum cribellum* Fauv.: GRIDELLI, 1956 a: 4 (sub *Anthobium cribellum*  
Fauv.);  
*Eusphalerum rectangulum* Fauv.\*: Valle Malvento, 1 ex., VI;  
*Eusphalerum ruffoi* Scheerp.: SCHEERPELTZ, 1956: 3; GRIDELLI, 1956 a: 4  
(sub *Anthobium ruffoi* Scheerp.); ZANETTI, 1982: 134; Duglia, 1 ex., V,  
leg. MONTEMURRO; Piano Ruggio, 1 ex., VI; (M);  
*Eusphalerum schatzmayri* Koch: KOCH, 1938: 138; GRIDELLI, 1956 a: 5 (sub  
*Anthobium schatzmayri* Koch); SCHEERPELTZ (1956) e GRIDELLI (1956 a:  
5) citano questa specie anche sub *Anthobium alutaceum* Scheerp.; (E);  
*Eusphalerum signatum* ssp. *angulatum* Luze: GRIDELLI, 1956 a: 4 (sub *Anthobium signatum*  
Märk.); ZANETTI, 1982: 136; Vacquarro, r., VI; Piano  
Ruggio, 1 ex., VI;  
*Eusphalerum stussineri* Bernh.: ZANETTI, 1982: 131; Vacquarro, r., VI; Valle  
Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI.  
*Gabruis doderoi* Grid.: Duglia, r., VIII;  
*Gabruis nigrifulus* Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 15; Duglia, 1 ex., VIII;  
*Gabruis sexualis* Smet.: PORTA, 1959: 79 (sec. GRIDELLI), 1956 a: 15, nota 1,  
potrebbe trattarsi del *G. pennatus* Sharp); (M);  
*Gabruis splendidulus* Gravh.: SMETANA, 1954: 40; GRIDELLI, 1956 a: 15.  
*Gyrobypnus angustatus* Steph.: Pedarreto, 1 ex., VII;  
*Gyrobypnus fracticornis* Müll.: Pantano Grande, r., VI;  
*Gyrobypnus punctulatus* Payk.: GRIDELLI, 1956 a: 11.  
*Gyrophana congrua* Er.: GRIDELLI, 1956 a: 24.  
*Habrocerus capillaricornis* Gravh.: Madonna di Pollino, p.c., VII; Piano Ruggio,  
r., VI-VII; Coppola di Paola, pendici sud, r., VI.  
*Hetethops ? dissimilis* Gravh.: Campotenese, 1 ex., VI.  
*Lathrimaeum atrocephalum* Gyll.\*: Piano Pollino, 1 ex., VIII, leg. DE MARZO;  
*Lathrimaeum melanocephalum* Ill.: Vacquarro, r., VI.  
*Lathrobium multipunctum* Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 10; Duglia, r., IX; Colle  
dell'Impiso, r., VI.  
*Leptusa kochiana* Bernh.: BERNHAUER, 1936: 245; GRIDELLI, 1956 a: 24; (E);  
*Leptusa pollinensis* Pace: PACE, 1977: 161; (E);

- Leptusa pulchella* Mannh.: GRIDELLI, 1956 a: 24; Vacquarro, 1 ex., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII.
- Lesteva luctuosa* Fauv.: GRIDELLI, 1956 a: 7 (sub *Lesteva graeca* Scheerp. sensu SCHEERPELTZ);
- Lesteva monticola* Kiesw.: Vacquarro, r., VI; Vallone Zaperna, r., VI.
- Leucoparyphus silphoides* L.: Campotenese, 1 ex., VI.
- Liogluta nitidula* Kr.\*: Valle Malvento, 1 ex., VI; (M).
- Medon apicalis* Kr.: Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII.
- Meotica exilis* Er.: GRIDELLI, 1956 a: 28.
- Metopsia clipeata* Müll.: Duglia, p.c., VIII, leg. DE MARZO.
- Micropeplus latus* Hampe\*\*\*: Duglia, 1 ex., VIII, leg. DE MARZO; specie nuova per la fauna italiana.
- Mycetoporus brucki* Pand.: GRIDELLI, 1956 a: 21;
- Mycetoporus ? longulus* Mannh.\*\*: Valle Malvento, 1 ex., VI; A. Marittime, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino A. Adige, Toscana (LUIGIONI, 1929: 241); (M);
- Mycetoporus mulsanti* Ganglb.: GRIDELLI, 1956 a: 21;
- Mycetoporus pollinensis* Scheerp.: SCHEERPELTZ, 1956: 16; GRIDELLI, 1956 a: 21; (E);
- Mycetoporus punctus* Gyll.: Piano Ruggio, 1 ex., VI;
- Mycetoporus rufescens* Steph.\*: Valle Malvento, 1 ex., VIII.
- Ocalea pollinensis* Scheerp.: SCHEERPELTZ, 1956: 16; GRIDELLI, 1956 a: 28; (E).
- Ocypus compressus* Marsh.: GRIDELLI, 1956 a: 17; Campotenese, r., VI;
- Ocypus confusus* Baudi: GRIDELLI, 1956 a: 17;
- Ocypus globulifer* Geoffr.: Cugno dell'Acero, 1 ex., VII;
- Ocypus italicus* Arag.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 68; GRIDELLI, 1956 a: 16 (sub *Staphylinus italicus* Arag.); Duglia, r., IX; Anticristo, 1 ex., VI;
- Ocypus olens* Müll.: Canale Malvento, r., VII; Colle del Dragone, p.c., VI-VII;
- Ocypus ophthalmicus* Scop.: GRIDELLI, 1956 a: 16 (sub *Staphylinus ophthalmicus* Scop.); Colle del Dragone, r., VI;
- Ocypus picipennis aprutianus* Müll.: GRIDELLI, 1956 a: 17;
- Ocypus similis* F.: GRIDELLI, 1956 a: 16 (sub *Staphylinus similis* F.); Terranova P., r., IX.
- Omalium excavatum* Steph.: GRIDELLI, 1956 a: 5; Vallone Zaperna, 1 ex., VI;
- Omalium rivulare* Payk.: Timpa del Demonio, 1 ex., VI.
- Ontholestes murinus* L.: GRIDELLI, 1956 a: 18; Duglia, c., VI-VIII; Vacquarro, c., VI-VII; Piano Ruggio, r., VI; Anticristo, p.c., VI.

- Othius laeviusculus* Steph.: Lago Fondo, 1 ex., VII; Valle Malvento, r., VI;  
*Othius lapidicola* Steph.\*: Valle Malvento, 1 ex., VIII; Coppola di Paola, pendici sud, r., VII.  
*Oxypoda alternans* Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 29; Valle Malvento, c., VIII;  
*Oxypoda formosa* Er.: GRIDELLI, 1956 a: 29;  
*Oxypoda lividipennis* Mannh.: GRIDELLI, 1956 a: 28;  
*Oxypoda umbrata* Gyll.: GRIDELLI, 1956 a: 28.  
*Oxyporus rufus* L.: Piano Ruggio, 1 ex., VI.  
*Oxytelus piceus* L.: Campotenese, r., VI.  
*Paederus baudii* Fairm.\*: Lago Ricciardule, 1 ex., VII;  
*Paederus rubrothoracicus* Goeze: Duglia, p.c., VI-VII; Fontana Rummo, r., VI; Vacquarro, p.c., VI-VII; Valloncello di Viggianello, p.c., VII.  
*Phalacrolinus glaber* Nordm.\*: Coppola di Paola, pendici sud, r., VII.  
*Philonthus aeneus* Rossi: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 68;  
*Philonthus atratus* Gravh.: Duglia, 1 ex., VI;  
*Philonthus cognatus* Steph.: SMETANA, 1954: 40; GRIDELLI, 1956 a: 13; (sub *P. fuscipennis* Mannh.); PACE & ZANETTI, 1977: 293; Valle Malvento, r., VIII; Piano Ruggio, c., VI; Fosso Mauro, r., VII;  
*Philonthus coprophilus* Jarr.\*: Cugno Ruggeri, 1 ex., VII;  
*Philonthus coruscus* Gravh.: SMETANA, 1954: 40; GRIDELLI, 1956 a: 12; PACE & ZANETTI, 1977: 250;  
*Philonthus ebeninus* Gravh.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 68;  
*Philonthus decorus* Gravh.: SMETANA, 1954: 40; PACE & ZANETTI, 1977: 292; Piano Ruggio, 1 ex., VI;  
*Philonthus fenestratus* Fauv.\*: Campotenese, 1 ex., VI;  
*Philonthus frigidus* Kiesw.: GRIDELLI, 1956 a: 14; PACE & ZANETTI, 1977: 294; Vacquarro, 1 ex., VII;  
*Philonthus fumarius* Gravh.: SMETANA, 1954: 40;  
*Philonthus intermedius* Boisd. & Lac.: SMETANA, 1954: 40; GRIDELLI, 1956 a: 12; PACE & ZANETTI, 1977: 288; Serra del Prete, pendici ovest, r., VII;  
*Philonthus jurgans* Tott.: GRIDELLI, 1956 a: 14; PACE & ZANETTI, 1977: 296; Campotenese, 1 ex., VII;  
*Philonthus laminatus* Creutz.: Cugno dell'Acero, r., VII;  
*Philonthus nitidicollis* Boisd. & Lac.: GRIDELLI, 1956 a: 14 (sub *P. concinnus* Gravh.); PACE & ZANETTI, 1977: 291; molto comune ovunque, V-X;  
*Philonthus ochropus* Gravh.: PACE & ZANETTI, 1977: 291; Vallone Zaperna, r., VI;  
*Philonthus politus* L.: Pedarreto, r., X;  
*Philonthus rectangulus* Sharp: Anticristo, p.c., VI-VII; Campotenese, r., VI;  
*Philonthus rigidicornis* Gravh.: SMETANA, 1954: 40; GRIDELLI, 1956 a: 15

- (sub *P. fimetarius* Gravh.); PACE & ZANETTI, 1977: 296; Duglia, 1 ex., IX; Vallone Zaperna, r., VI;
- Philonthus sordidus* Gravh.: SMETANA, 1954: 40;
- Philonthus varians* Payk.: Cozzo di Visitone, 1 ex., X.
- Pbloeonomus pusillus* Gravh.\*: Cugno Ruggeri, 1 ex., VI.
- Pbloeopora angustiformis* Baudi \*: Anticristo, 1 ex., VI.
- Phyllodrepa floralis* Payk.: Vallone Zaperna, 1 ex., V; Valle Malvento, 1 ex., VI;
- Phyllodrepa melanocephala* ssp. *pollinensis* Scheerp.: SCHEERPELTZ, 1956: 8; GRIDELLI, 1956 a: 5; specie citata da tali Autori anche sub *Phyllodrepa rufotestacea* Scheerp.
- Platystethus nitens* Sahlb.: Vacquarro, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI.
- Proteinus atomarius* Er.: Duglia p.c., IX; Pantano Grande, r., VI;
- Proteinus brachypterus* F.: Duglia, c., IX; Cugno Ruggeri, r., IX; Lago Fondo, c., IX; Cugno dell'Acero, c., IX; Piano Ruggio, r., VII.
- Pseudopsis sulcata* Newm.\*: Valle Malvento, 1 ex., VIII; Piano Ruggio, 1 ex., VIII.
- Quedius abietum* Kiesw.: Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII; Colle del Dragone, r., VII;
- Quedius aspromontanus* Bernh.: Campotenese, 1 ex., VI;
- Quedius boops* Gravh.: Valle Malvento, p.c., VIII;
- Quedius bruttius* Zan.: ZANETTI, 1977: 309; Duglia, 1 ex., VIII; Piano Ruggio, 1 ex., VII;
- Quedius cinctus* Payk.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 67 (sub *Q. impressus* Panz.); GRIDELLI, 1956 a: 20; Pantano Grande, 1 ex., IX;
- Quedius collaris italicus* Grid.: GRIDELLI, 1956 a: 21; Vacquarro, 1 ex., VI;
- Quedius cruentus* Ol.: GRIDELLI, 1956 a: 19; Duglia, r., IX; Pendici sud-est di Serra delle Ciavole, 1 ex., VII; Valle Malvento, p.c., VI; Anticristo, r., VI-VII;
- Quedius curtus* Er.: GRIDELLI, 1956 a: 18;
- Quedius dubius* Heer \*: Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VI; noto di Alpi, App. Toscano e Abruzzese (LUIGIONI, 1929: 237);
- Quedius fulgidus* F.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 67;
- Quedius latialis* Grid.\*: Duglia, 1 ex., VI; Canale di Malevento, 1 ex., VII; Valle Malvento, 1 ex., VI;
- Quedius latinus* Grid.: GRIDELLI, 1956 a: 19; molto comune ovunque, V-IX;
- Quedius mesomelinus silensis* Fiori: GRIDELLI, 1956 a: 19 (sub *Q. mesomelinus* Marsh.); Duglia, c., IX; Piano Pollino, p.c., VIII;
- Quedius nemoralis* Baudi: GRIDELLI, 1956 a: 20; Colle Gaudolino, r., VII;



- Timpa del Demonio, 1 ex., VI; Valle Malvento, 1 ex., VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VI-VIII;
- Quedius nigrocoeruleus* Fauv.: Duglia, 1 ex., VIII; Colle dell'Impiso, r., VII; Piano Zaperna, r., VI;
- Quedius oblitteratus* Er.: Acqua Tremola, r., VI; Duglia, 1 ex., IX; Canale di Malevento, c., VI; Valle Malvento, r., VII; Piano Ruggio, c., VI;
- Quedius obscuripennis* Bernh.: GRIDELLI, 1956 a: 20; Vacquarro, p.c., IV; Valle Malvento, r., VIII; Anticristo, r., VIII; Campotenesse, r., VII;
- Quedius ochripennis* Mén.: GRIDELLI, 1956 a: 19; Piano Pollino, r., VII; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII; Pedarreto, c., VI;
- Quedius ochropterus* Er.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 67; Piano Ruggio, r., VI;
- Quedius paradisianus* Heer \*: Valle Malvento, 1 ex., VIII; (M);
- Quedius picipes* Mannh.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 67;
- Quedius scintillans* Gravh.: Valloncello di Viggianello, 1 ex., VII;
- Quedius semiaeneus* Steph.: Colle Gaudolino, r., VII; Valle Malvento, 1 ex., VIII;
- Quedius tristis* Gravh.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 67; GRIDELLI, 1956 a: 20;
- Quedius ventralis* Arag.\*: Duglia, 1 ex., VIII.
- Sepedophilus lusitanicum* Ham.: Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VII; Anticristo, r., VI-VII;
- Sepedophilus bipustulatum* Gravh.: Piano Ruggio, 1 ex., VI.
- Sipalia focarilei* Scheerp.: SCHEERPELTZ, 1956: 18; GRIDELLI, 1956 a: 26; (E);
- Sipalia tamaninii* Scheerp.: SCHEERPELTZ, 1956: 21; GRIDELLI, 1956 a: 26; (E).
- Stenus aceris* Steph.: GRIDELLI, 1956 a: 8; Campotenesse, r., VI-VII;
- Stenus asphaltinus* Er.: Vacquarro, 1 ex., VI; Valle Malvento, r., VI;
- Stenus assequens* Rey: Vallone di Zaperna, 1 ex., VI;
- Stenus binaghii* Puthz: a questa specie vanno molto probabilmente riferiti gli exx. citati da KOCH (1937: 86) sub *S. ganglbaueri* Bernh.; GRIDELLI, (1956 a: 10) si limitò a riportare la citazione di KOCH;
- Stenus caligicola* Puthz: Duglia, r., VIII;
- Stenus cordatus* Gravh.: Duglia, c., IX; Pantano Grande, 1 ex., VI; Fontana Rummo, r., VII; Vacquarro, r., VI-VII; Valle Malvento, p.c., VI;
- Stenus elegans* Rosh.: Vallone Zaperna, c., VI; Valle Malvento, p.c., VI; Anticristo, r., VI-VII;
- Stenus hospes* Heer: GRIDELLI, 1956 a: 9; Lago Fondo, 1 ex., VI;
- Stenus junco* Payk.: Cugno Ruggeri, 1 ex., VII; Vacquarro, r., VI;

- Stenus ochropus* Kiesw.: Fontana Rummo, 1 ex., VII;  
*Stenus ossium* Steph.\*: Valle Malvento, 1 ex., VI;  
*Stenus picipes* Steph.: GRIDELLI, 1956 a: 10; Vallone Zaperna, 1 ex., VI;  
Piano Ruggio, r., VI-VII; Campotenese, 1 ex., VII;  
*Stenus subaeneus* Er.: GRIDELLI, 1956 a: 9; Duglia, r., VIII; Valle Malvento,  
c., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII; Anticristo, 1 ex., VI;  
*Stenus umbricus* Baudi \*: Piano delle Mandre, 1 ex., VI.  
*Tachinus humeralis* Gravh.\*: Duglia, c., IX; Pantano Grande, c., VI; Piano  
Toscano, r., VI; Madonna di Pollino, r., VI; Cozzo Dimoniello, Fosso  
Mauro, 1 ex., VII;  
*Tachinus marginellus* F.: Canale di Malevento, 1 ex., VII;  
*Tachinus subterraneus* L.: Serra delle Ciavole, pendici sud-est, 1 ex., VI; Piano  
Ruggio, 1 ex., VI.  
*Tachyporus chrysomelinus* L.: Fontana Rummo, 1 ex., VII; Vacquarro, r., VI-  
VII; Vallone Zaperna, c., VI;  
*Tachyporus hypnorum* F.: GRIDELLI, 1956 a: 23; Madonna di Pollino, 1 ex.,  
VIII; Valloccello di Viggianello, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VII;  
*Tachyporus macropterus* Steph.: GRIDELLI, 1956 a: 22;  
*Tachyporus nitidulus* F.: GRIDELLI, 1956 a: 22; molto comune ovunque, V-X;  
*Tachyporus solutus* Er.: GRIDELLI, 1956 a: 23; Cugno dell'Acero, 1 ex., VII.  
*Tachyusa objecta* Rey \*: Campotenese, 1 ex., VII.  
*Trichophya pilicornis* Gyll.\*: Vallone Zaperna, 1 ex., VI.  
*Xantholinus apennincola* Steel.: GRIDELLI, 1956 a: 11 (sub *X. raffrayi* Dev.);  
Piano Toscano, 1 ex., VI;  
*Xantholinus jarrigei* Coiff.: Colle del Dragone, 1 ex., VI.  
*Xylodromus affinis* Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 6;  
*Xylodromus depressus* Gravh.\*: Piano Pollino, 1 ex., VIII, *leg.* DE MARZO.

PSELAPHIDAE

- Batrissodes adnexus* Hampe: Colle del Dragone, 1 ex., VII; Coppola di Paola,  
pendici nord-est, 1 ex., VII;  
*Batrissodes venustus* Reichb.: POGGI, 1984: 90; Duglia, 1 ex., VIII; Piano Rug-  
gio, 1 ex., VIII.  
*Biploporus bicolor* ssp. *meridionalis* Megg.: MEGGIOLARO, 1966: 163;  
*Biploporus ultimus* Guill.\*\*: Duglia, r., VIII; noto di Corsica (LUIGIONI, 1929:  
302); (M).  
*Brachygluta appennina* Saulcy: MEGGIOLARO, 1960: 83;  
*Brachygluta helferi* Schmd. & Goeb.: Piano Zaperna, c., VII; Valle Malvento,  
c., VI;

- Brachygluta ragusae* Saulcy: Duglia, 1 ex., VII;  
*Brachygluta schueppeli* Aubé: Serra del Prete, pendici nord-est, 1 ex., VII;  
Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VI.  
*Bryaxis curtisi* ssp. *orientalis* Kar.\*: Piano Ruggio, 1 ex., VI;  
*Bryaxis forianus* Reitt.\*: Piano Pollino, r., VII; Vacquarro, c., VI; Valle  
Malvento, c., VI; Colle del Dragone, r., VI;  
*Bryaxis italicus* Baudi: Duglia, c., VIII; Pantano Grande, r., VI; Vacquarro,  
p.c., VII; Valle Malvento, c., VI;  
*Bryaxis paganettii* Blattny: Duglia, c., VI-IX; Colle Gaudolino, r., VII; Valle  
Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII;  
*Bryaxis pedator* m. *calabricus* Reitt.: Vacquarro, 1 ex., VI; Timpa del Demonio,  
r., VII;  
*Bryaxis picteti* ssp. *meridionalis* Mach.: MEGGIOLARO, 1960: 81 (sub *Arcopagus*  
*picteti* Tourn.); Duglia, r., IX; Cozzo di Visitone, r., VI.  
*Euplectus brunneus* Grimm.: Duglia, p.c., VIII; Cugno Ruggeri, r., VI;  
*Euplectus karsteni* Reichb.: Duglia, c., VIII; Coppola di Paola, pendici nord-  
est, r., VI-VIII; (M);  
*Euplectus kirbyi* ssp. *hummleri* Reitt.: Vacquarro, c., VI; Colle Gaudolino, 1  
ex., VII; Piano Ruggio, r., VII.

#### LYCIDAE

- Lygisterus anorachilus* Rag.: PARDO-ALCAIDE, 1961: 2; Duglia, p.c., VI-  
VIII; Piano Ruggio, 1 ex., VII; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII;  
*Lygisterus sanguineus* L.: PARDO-ALCAIDE, 1961: 1.  
*Platycis minuta* F.: GOBBI, 1973: 36.  
*Pyropterus nigroruber* Deg.: Serra Dolcedorme, pendici nord-ovest, c., VII;  
Piano Pollino, 1 ex., VIII; Piano Toscano, r., VI; Piano Ruggio, p.c.,  
VIII; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII.

#### LAMPYRIDAE

- Phausis splendidula* L.: WITTMER, 1935: 72.  
*Lampyrus noctiluca* v. *bellieri* Reiche: WITTMER, 1935: 72; Duglia, r., VI-VII.  
*Luciola italica* L.: WITTMER, 1935: 72.

#### CANTHARIDAE

- Cantharis decipiens* Baudi \*: Duglia, r., VI; Vacquarro, c., VI;

- Cantharis falzonii* Fiori: MOSCARDINI, 1968: 72; Valle Malvento, 1 ex., VI;  
*Cantharis fulvicollis* F.: WITTMER, 1935: 74; MOSCARDINI, 1968: 66; Piano Toscano, 1 ex., VI;  
*Cantharis fusca* L.: WITTMER, 1935: 72; MOSCARDINI, 1968: 55; Vacquarro, r., VI-VII; Colle dell'Impiso, r., VII;  
*Cantharis haemorrhoidalis* F.: MOSCARDINI, 1968: 80; Duglia, p.c., VI; Timpa del Demonio, r., VI; Valle Malvento, c., VI-VII; Piano Ruggio, r., VI; Fosso Mauro, p.c., VI;  
*Cantharis italica* Fiori: WITTMER, 1935: 72; MOSCARDINI, 1968: 71; Vacquarro, r., VI; Timpa del Demonio, 1 ex., VI-VII; Valle Malvento, p.c., VI; Piano Ruggio, c., VI; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII;  
*Cantharis livida* f. *sicula* Bourg.: Timpa del Demonio, c., VI; Vallone Zaperna, c., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Colle del Dragone, r., VI; Anticristo, r., VI;  
*Cantharis lucens* Mosc.: WITTMER, 1935: 72 (sub *C. erichsoni* Bach); MOSCARDINI, 1968: 55;  
*Cantharis merula* Mosc.: MOSCARDINI, 1968: 59; Madonna di Pollino, 1 ex., VI; Vacquarro, c., VI-VII; Piano Ruggio, r., VI;  
*Cantharis nigricans* f. *immaculata* Schil.\*: Cozzo di Visitone, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI;  
*Cantharis obscura* ab. *morio* Baudi: WITTMER, 1935: 72;  
*Cantharis paganettii* Flach.: Duglia, 1 ex., VI;  
*Cantharis pallida* Goeze: MOSCARDINI, 1968: 79;  
*Cantharis pellucida* f. *reuterbergi* Reitt.: Duglia, 1 ex., VI;  
*Cantharis peninsularis* Fiori: Cugno dell'Acerò, 1 ex., VI; Vacquarro, 1 ex., VI, leg. MONTEMURRO;  
*Cantharis rustica* L.: MOSCARDINI, 1968: 56; Vallone Zaperna, r., VI; Timpa del Demonio, p.c., VI; Valle Malvento, c., VI-VII; Piano Ruggio, r., VI;  
*Cantharis torretassoi* Wittm.: WITTMER, 1935: 72; MOSCARDINI, 1968: 80;  
*Cantharis violacea* Payk.: MOSCARDINI, 1968: 53; Vacquarro, r., VI; Colle dell'Impiso, 1 ex., VI.  
*Cratosilis denticollis* Schumm.: Piano Ruggio, 1 ex., VII;  
*Cratosilis laeta* f. *discolor* Baudi \*: Piano Ruggio, c., VI;  
*Cratosilis sicula* Marsh.: MOSCARDINI, 1968: 88; pendici sud-est di Serra delle Ciavole, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI.  
*Podabrus procerulus* Kiesw.: Cozzo di Visitone, r., VI; Piano Ruggio, c., VI; Pedarreto, p.c., VI.  
*Rhagonycha banatica* Rosh.: WITTMER, 1935: 74 (citazione e dato non ripreso da MOSCARDINI, 1968, l.c.);  
*Rhagonycha femoralis* Brullé: Canale di Malevento, r., VII; Vacquarro, 1 ex.,

- VI; Timpa del Demonio, c., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI;
- Rbagonycha fulva* Scop.: MOSCARDINI, 1958: 85; Anticristo, c., VII; Campotenese, r., VII;
- Rbagonycha lignosa* Müll.: WITTMER, 1935: 74; MOSCARDINI, 1968: 87; Vacquarro, r., VI; Valle Zaperna, c., VI; Valle Malvento, r., VI; Anticristo, c., VI-VII;
- Rbagonycha lutea* Müll.: MOSCARDINI, 1968: 86;
- Rbagonycha nigrosuta* Fiori: MOSCARDINI, 1968: 83; Lago Fondo, r., VI; Timpa del Demonio, 1 ex., VII; Vallone Zaperna, c., VI; Valle Malvento, p.c., VI-VII.
- Malthinus balteatus* Suffr.: WITTMER, 1935: 74; Anticristo, 1 ex., VI;
- Malthinus devillei* Ab.: WITTMER, 1935: 74; (M);
- Malthinus flaveolus* Payk.: WITTMER, 1935: 74;
- Malthinus insignipes* Pic: WITTMER, 1935: 74; (M);
- Malthinus striatulus* Marsh.: WITTMER, 1935: 74; (M).
- Malthodes facetus* Kiesw.: WITTMER, 1935: 74;
- Malthodes hexacanthus* Kiesw.: WITTMER, 1935: 74; (M);
- Malthodes parthenias* Kiesw.: WITTMER, 1935: 74;
- Malthodes solarii* Pic: WITTMER, 1935: 74;
- Malthodes sparthifer* Kiesw.: WITTMER, 1935: 74; (M).

#### DRYLIDAE

- Drylus flavescens* Ol.: Cozzo di Visitone, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Cozzo Dimoniello, 1 ex., VI; Pedarreto, p.c., VI-VIII.

#### MELYRIDAE

- Anthocomus coccineus* Schall.: Duglia, 1 ex., VI.
- Attalus amictus* Er.: PARDO-ALCAIDE, 1961: 5;
- Attalus analis* Panz.: WITTMER, 1935: 74; Piano Ruggio, r., VII;
- Attalus nourricheli* Cast.: WITTMER, 1935: 74; Duglia, c., VIII.
- Axinotarsus italicus* Escal.: PARDO-ALCAIDE, 1961: 5;
- Axinotarsus ruficollis* Ol.: WITTMER, 1935: 74; Valle Malvento, r., VII; Anticristo, p.c., VII.
- Charopus docilis* Kiesw.: WITTMER, 1935: 74;
- Charopus pallipes* Ol.\*: Anticristo, p.c., VI.
- Colotes maculatus* Cast.: Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, r., VII.
- Cyrtosus ovalis* Cast.: WITTMER, 1935: 74; PARDO-ALCAIDE, 1961: 7.

- Ebaeus ater* Kiesw.: WITTMER, 1935: 74; (M).  
*Hypebaeus flavipes* F.: WITTMER, 1935: 74; (M).  
*Malachius aeneus* L.: Terranova P., 1 ex., VI;  
*Malachius arnaizi* Pardo-Alc.: FOCARILE, 1975: 30; (M);  
*Malachius australis* Rey: PARDO-ALCAIDE, 1961: 6;  
*Malachius bipustulatus* L.: PARDO-ALCAIDE, 1961: 5;  
*Malachius calabrus* Ab.: Valle Malvento, r., VI;  
*Malachius falcifer* Ab.: PARDO-ALCAIDE, 1961: 6;  
*Malachius italicus* Pardo-Alc.: PARDO-ALCAIDE, 1967: 97-104;  
*Malachius lusitanicus* ab. *australis* Rey: WITTMER, 1935: 74; Cozzo di Visitone, r., VI;  
*Malachius parilis* Er.: WITTMER, 1935: 74; PARDO-ALCAIDE, 1961: 7; Piano Ruggio, p.c., VII; Anticristo, 1 ex., VI;  
*Malachius spinipennis* Germ.: PARDO-ALCAIDE, 1961: 6; Campotinese, c., VII;  
*Malachius viridis* F.: PARDO-ALCAIDE, 1961: 6; Duglia, r., VI.  
*Sphinginus lobatus* Ol.\*: Duglia, 1 ex., VI, *leg. e coll.* MONTEMURRO.  
*Danacaea ambigua* Muls.: Terranova P., *leg.* SCHATZMAYR & KOCH, *coll.* Museo di Milano (LIBERTI i.l.);  
*Danacaea aurichalcea* Küst.: LIBERTI, 1978: 39; Vacquarro, 1 ex., VI; Vallone Zaperna, 1 ex., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, 1 ex., VI;  
*Danacaea concii* Lib.: Terranova P., *leg.* SCHATZMAYR & KOCH, *coll.* Museo di Milano (LIBERTI i.l.);  
*Danacaea cusanensis* Costa: WITTMER, 1935: 75; molto comune ovunque, V-VI;  
*Danacaea denticollis* Baudi: WITTMER, 1935: 75;  
*Danacaea nigratarsis* ssp. *brunneipes* Pic: WITTMER, 1935: 75 (sub *D. nigratarsis* Küst.); Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, 1 ex., VI.  
*Dasytes aeneiventris* Küst.: Duglia, r., VI; Vacquarro, 1 ex., VI; Timpa del Demonio, 1 ex., VI;  
*Dasytes aerosus* Kiesw.: WITTMER, 1935: 75; Piano Ruggio, 1 ex., VII;  
*Dasytes coeruleus* Deg.: GOBBI, 1973: 37; (M);  
*Dasytes flavipes* Ol.: WITTMER, 1935: 75; Vallone Zaperna, 1 ex., VI; Valle Malvento, r., VI;  
*Dasytes lucanus* Wittm.: WITTMER, 1935: 75;  
*Dasytes plumbeus* Müll.: Duglia, r., VI; Vacquarro, p.c., VI; Piano Ruggio, r., VII; Anticristo, p.c., VI-VII; Campotinese, *leg. e coll.* LIBERTI (LIBERTI i.l.);  
*Dasytes* sp. (gr. *apenninus*): Campotinese e Colle dell'Impiso, *leg. e coll.* LIBERTI (LIBERTI i.l.);

- Dasytes (Hapalogluta)* sp.: Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI.  
*Divales bipustulatus* F.: WITTMER, 1935: 75; Duglia, 1 ex., VIII; Piano Ruggio, c., VI;  
*Divales communimacula* ab. *ater* Schils.: WITTMER, 1935: 75.  
*Haplocnemus nigricornis* F.: WITTMER, 1935: 74;  
*Haplocnemus* sp.: dint. Rotonda, 900 m, *leg. e coll.* LIBERTI (LIBERTI i.l.).  
*Henicopus falculifer* Fairm.: WITTMER, 1935: 74; Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, r., VI;  
*Henicopus pilosus* Scop.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 72.  
*Psilothrix aureolus* Kiesw.: WITTMER, 1935: 75; Piano Ruggio, 1 ex., VII; Anticristo, c., VI-VII;  
*Psilothrix cyaneus* Ol.: WITTMER, 1935: 75; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI;  
*Psilothrix viridicoeruleus* Geoffr. (= *cyaneus* Ol.): Duglia, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI; Anticristo, 1 ex., VI.

#### CLERIDAE

- Clerus mutillarius* F.: Duglia, 1 ex., VI; Pantano Grande, r., VI.  
*Necrobia rufipes* Deg.: Campotenese, r., VII.  
*Opilio mollis* L.: Campotenese, 1 ex., VII;  
*Opilio taeniatus* var. *torretassoi* Wittm.: WITTMER, 1935: 76; Campotenese, p.c., VII; (E);  
*Thanasimus formicarius* L.: WITTMER, 1935: 76; GOBBI, 1983: 58; Cugno Ruggeri, r., VI.  
*Tillus transversalis* Charp.: Terranova P., r., VI;  
*Tillus elongatus* L.: WITTMER, 1935: 75.  
*Trichodes alvearius* F.: WITTMER, 1935: 76; Cugno dell'Acero, 1 ex., VII; Piano Ruggio, c., VI-VII; Campotenese, c., VII;  
*Trichodes apiarius* L.: WITTMER, 1935: 76; Duglia, 1 ex., VI;  
*Trichodes leucopsideus* Ol.: WITTMER, 1935: 76; GOBBI, 1973: 37; Pantano Grande, 1 ex., VI.

#### LYMEXYLONIDAE

- Hylecoetus dermestoides* L.\*: Coppola di Paola, rif. Rotonda, 1 ex., VI.

CEBRIONIDAE

- Cebrio dubius* Rossi \*: Piano Ruggio, 1 ex., VIII;  
*Cebrio nigricornis* Leoni \*: Piano Ruggio, c., VII; (M).

ELATERIDAE

- Adrastus rachifer* ab. *humeropictus* Buys.: BINAGHI, 1955: 17; Piano Ruggio, 1 ex., V; Campotinese, c., VII.  
*Agriotes acuminatus* Steph.: Duglia, r., VI, leg. MONTEMURRO;  
*Agriotes brevis* Cand.\*: Valle Malvento, 1 ex., VI; (M);  
*Agriotes grandini* Cand.: BINAGHI, 1955: 15;  
*Agriotes infuscatus* Desbr. et ab. *elegans* Schw.: BINAGHI, 1955: 16; Vacquarro, c., VI; Timpa del Demonio, c., VI; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, 1 ex., VI;  
*Agriotes lineatus* F.: Campotinese, 1 ex., VII;  
*Agriotes litigiosus* ab. *laichartingi* Gredl.: BINAGHI, 1955: 16; Valle Malvento, 1 ex., VI.  
*Agrypnus murinus* L.: BINAGHI, 1955: 1 (sub *Adelocera murina* L.); Piano Pollino, r., VI; Piano Toscano, p.c., VI; Timpa del Demonio, r., VI; Piano Ruggio, c., VI.  
*Ampedus cinnabarinus* Eschh.\*: Piano Ruggio, r., VI;  
*Ampedus elegantulus* Schönh.: BINAGHI, 1955: 3; GOBBI, 1973: 35;  
*Ampedus melanurus* Muls.\*\*: Duglia, 1 ex., IX; noto di A. Marittime e Piemonte (LUIGIONI, 1929: 551); (M);  
*Ampedus pomorum* Herbst: BINAGHI, 1955: 2; Vacquarro, 1 ex., VI; Timpa del Demonio, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI;  
*Ampedus rufipennis* Steph.: BINAGHI, 1955: 2; Piano Ruggio, 1 ex., VII;  
*Ampedus sanguineus* L.\*: Coppola di Paola, rif. Rotonda, p.c., VI;  
*Ampedus sinuatus* Germ.: Timpa del Demonio, 1 ex., VI; Cozzo di Visitone, r., VI.  
*Anostirus purpureus* Poda: BINAGHI, 1955: 13; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII; (M).  
*Athous haemorrhoidalis* F.: BINAGHI, 1955: 11; Timpa del Demonio, 1 ex., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI;  
*Athous ineptus* Cand.: BINAGHI, 1955: 12; Valle Malvento, 1 ex., VI;  
*Athous niger* L.: Vacquarro, 1 ex., VII;  
*Athous puncticollis* Kiesw.: Vacquarro, r., VI;



- Athous subfuscus* Müll.: BINAGHI, 1955: 13; Vacquarro, 1 ex., VI; Valle Zaperna, c., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI;
- Athous villosus* Fourcr.: BINAGHI, 1955: 11; GOBBI, 1973: 35;
- Athous vittatus* F. et ab. *impallens* Buyss.: BINAGHI, 1955: 12; Vallone Zaperna, c., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI.
- Cardiophorus collaris* Er.: BINAGHI, 1955: 4; Timpa del Demonio, c., VI; Anticristo, p.c., VI;
- Cardiophorus ebeninus* Germ.: BINAGHI, 1955: 7;
- Cardiophorus incanus* Er.: BINAGHI, 1955: 7;
- Cardiophorus melampus* Stierl.: BINAGHI, 1955: 5;
- Cardiophorus rufipes* Er.: BINAGHI, 1955: 7; Timpa del Demonio, 1 ex., VI;
- Cardiophorus ulcerosus* Gené ab.: BINAGHI, 1955: 4; Pantano Grande, 1 ex., VI;
- Cardiophorus vestigialis* Er.: Terranova P., 1 ex., VI.
- Cidnopus minutus* L.: Valloncello di Viggianello, 1 ex., VII; Piano Ruggio, r., VI;
- Cidnopus parvulus* Panz.: BINAGHI, 1955: 9; Piano Toscano, r., VI;
- Cidnopus pseudopilosus* Platia: BINAGHI, 1955: 9 (sub *C. pilosus* Leske); Timpa del Demonio, c., V; Vallone Zaperna, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI; Anticristo, p.c., VI-VII.
- Compsolacon crenicollis* Mén.: Piano Pollino, p.c., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, 1 ex., VI.
- Ctenicera pectinicornis* L.: BINAGHI, 1955: 13; Coppola di Paola, pendici sud, p.c., VII; (M).
- Denticollis rubens* Piller: BINAGHI, 1955: 17; GOBBI, 1973: 35; Fosso Mauro, r., VI; Coppola di Paola, pendici sud, c., VII; (M).
- Dicronychus cinereus* Herbst: Duglia, r., VII; Campotenese, 1 ex., VI;
- Dicronychus equiseti* Herbst: Vallone della Caballa, 1 ex., VI.
- Dolopius marginatus* L.: BINAGHI, 1955: 16.
- Drasterius bimaculatus* ab. *variegatus* Küst.: BINAGHI, 1955: 2; Anticristo, r., VI-VII.
- Harminius castaneus* Fairm.: BINAGHI, 1955: 10.
- Hemicrepidius hirtus* Herbst: BINAGHI, 1955: 11 (sub *Athous hirtus* Herbst); Piano Pollino, c., VI-VII; Piano Toscano, r., VI; Piano Ruggio, p.c., VI-VII.
- Hypolithus dermestoides* ab. *submaculatus* Reitt.: BINAGHI, 1955: 4.
- Idolus anatolicus* Cand.\*: Piano Ruggio, 1 ex., VI;
- Idolus picipennis* Bach: BINAGHI, 1955: 3; Vacquarro, 1 ex., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, p.c., VI-VII; Anticristo, r., VI.
- Lacon punctatus* Herbst: BINAGHI, 1955: 1.

- Limonius quercus* ab. *candezei* Buys.: BINAGHI, 1955: 9; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, r., VI.
- Melanotus castaneipes* Payk.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 71; BINAGHI, 1955: 8; Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI; Coppola di Paola, r., VI; Anticristo, 1 ex., VI;
- Melanotus crassicollis* Er.: BINAGHI, 1955: 8; Piano Ruggio, 1 ex., VII, *leg.* MONTEMURRO;
- Melanotus rufipes* var. *punctaticollis* Bris.: BINAGHI, 1955: 8; Vacquarro, r., VI;
- Melanotus tenebrosus* Er.: BINAGHI, 1955: 9; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, p.c., VII.
- Prosternon tessellatum* L.: BINAGHI, 1955: 15; Canale di Malevento, p.c., VII; Piano Pollino, c., VI; Piano Toscano, c., VI.
- Quasimus minutissimus* Germ.: BINAGHI, 1955: 4; Duglia, 1 ex., VI; Campotenese, r., VI.
- Selatosomus amplicollis* ssp. ? *montenegrinus* Reitt.: BINAGHI, 1955: 14; Piano Pollino, r., VI; Piano Toscano, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI;
- Selatosomus impressus* F.\*\*: Piano Toscano, r., VI; Vacquarro, 1 ex., VI; Colle dell'Impiso, 1 ex., VI; noto di Alpi, Veneto e Trentino A. Adige (LUGIONI, 1929: 567); (M);
- Selatosomus latus* var. *pasticus* Mén.: BINAGHI, 1955: 14; Vacquarro, r., VII; Serra del Prete, pendici ovest, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI; Anticristo. 1 ex., VI; Campotenese, 1 ex., VII;
- Selatosomus melancholicus* F.: BINAGHI, 1955: 15; (M).
- Synaptus filiformis* F.: Campotenese, r., VI.

#### EUCNEMIDAE

- Farsus dubius* Pill.: Terranova P., p.c., VI-VII.
- Isorhipis melasoides* Lap.: GOBBI, 1973: 36; (M).
- Melasis buprestoides* L.: BINAGHI, 1955: 17; GOBBI, 1973: 36; Coppola di Paola, rif. Rotonda, r., VI.
- Xylobius corticalis* Payk.: GOBBI, 1973: 36.

#### THROSCIDAE

- Drapetes biguttatus* Pill. et ab. *mordelloides* Host.: BINAGHI, 1955: 17;
- Drapetes cinctus* Panz.: Campotenese, 1 ex., X.

BUPRESTIDAE

- Acmaeodera bipunctata* Ol.: GOBBI, 1971: 41; Coppola di Paola, rif. Rotonda, 1 ex., VI;
- Acmaeodera pilosellae* Bon.: GERINI, 1955: 1; GOBBI, 1971: 41; Colle del Dragone, 1 ex., VII;
- Acmaeodera quadrifasciata* Rossi \*: Terranova P., r., VII; Campotenese, r., VI; (M);
- Acmaeodera tassii* Schaef.: SAMA, 1979: 16; GOBBI, 1981: 33; Cozzo di Dimoniello, 2 exx., VI.
- Acmaeoderella flavofasciata* Pill.: GERINI, 1955: 1; GOBBI, 1971: 42 (sub *Acmaeodera flavofasciata* Pill.); Vacquarro, r., VI; Colle del Dragone, c., VII.
- Agrilus angustulus* Ill.: GERINI, 1955: 5; Anticristo, 1 ex., VI;
- Agrilus aurichalceus* Redtb.: GERINI, 1955: 6; GOBBI, 1971: 4;
- Agrilus calcicola* Obenb.: GOBBI, 1971: 54; Campotenese, r., VII;
- Agrilus convexicollis* ssp. *mancinii* Obenb.: GERINI, 1955: 5; (M);
- Agrilus graminis* Cast. & Gory: GOBBI, 1971: 53;
- Agrilus hastulifer* Ratzb.\*\*: Piano Ruggio, 1 ex., VII; noto di Lombardia, Friuli V. Giulia, Toscana, Lazio e Sardegna (LUIGIONI, 1929: 592); Piemonte e Sicilia (CURLETTI i.l.);
- Agrilus hyperici* Creutz.: GERINI, 1955: 6; GOBBI, 1971: 57;
- Agrilus integerrimus* Ratzb.: GOBBI, 1971: 55;
- Agrilus viridicaerulans* ssp. *rubi* Schaef.: GERINI, 1955: 6; Duglia, 1 ex., VI;
- Agrilus viridis* L.: GERINI, 1955: 5; GOBBI, 1971: 54; Coppola di Paola, rif. Rotonda, 1 ex., VI; Anticristo, r., VII.
- Anthaxia cichorii* Ol.: GERINI, 1955: 3; Campotenese, r., VI;
- Anthaxia cyanescens* Gory: GOBBI, 1981: 36;
- Anthaxia domina* ssp. *aprutiana* Ger.: GERINI, 1955: 3;
- Anthaxia fulgurans* Schrnk.: GOBBI, 1971: 48; (M);
- Anthaxia funerula* Ill.: GERINI, 1955: 4;
- Anthaxia godeti* Cast.: GERINI, 1952: 90; 1955: 4; GOBBI, 1971: 50; Valle Malvento, 1 ex., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VI; Anticristo, 1 ex., VI;
- Anthaxia helvetica* ssp. *apennina* Obenb.: GOBBI, 1971: 49; Duglia, r., VI;
- Anthaxia hungarica* Scop.: GERINI, 1955: 2; Piano Ruggio, c., VI-VII;
- Anthaxia hypomelaena* Ill.: GERINI, 1955: 4; Terranova P., 1 ex., VI;
- Anthaxia kochi* Obenb.: PORTA, 1949: 245; TASSI, 1966 a: 20; GOBBI, 1971: 49;

- Anthaxia millefolii* ssp. *polichloros* Ab.: GERINI, 1955: 2; Duglia, c., VI-VII; Piano Pollino, p.c., VI; Cozzo di Dimoniello, r., VI; Colle del Dragone, r., VI;
- Anthaxia nitidula* L.: GOBBI, 1971: 49; Pantano Grande, r., VI;
- Anthaxia scutellaris* Gené: Pantano Grande, 1 ex., VI;
- Anthaxia semicuprea* Küst.: GERINI, 1955: 3; GOBBI, 1971: 48;
- Anthaxia thalassophila* Ab.: GERINI, 1955: 3; GOBBI, 1971: 48.
- Aphanisticus elegantus* Villa: GERINI, 1955: 7.
- Buprestis haemorrhoidalis* Herbst: GOBBI, 1971: 44;
- Buprestis novemmaculata* L.: GOBBI, 1971: 45;
- Buprestis octoguttata* L.: GOBBI, 1971: 45; (M);
- Buprestis splendens* F.: GOBBI, 1971: 45; (M).
- Chrysobothris affinis* F.: GOBBI, 1971: 51; Duglia, 1 ex., V; Timpa del Demonio, c., VI; Piano Ruggio, p.c., VII; Coppola di Paola, r., VI; Anticristo, c., VI-VIII;
- Chrysobothris chrysostigma* L.: GOBBI, 1971: 50.
- Coroebus elatus* F.: GERINI, 1955: 5; GOBBI, 1971: 51; Pantano Grande, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI;
- Coroebus rubi* L.: GERINI, 1955: 4; GOBBI, 1971: 51; Duglia, c., VI-VIII; Acqua Tremola, r., VI; Valle di Malvento, r., VI; Madonna di Pollino, p.c., VII; Pedarreto, r., VI; Anticristo, 1 ex., VI.
- Dicerca alni* Fisch.: GERINI, 1955: 2; GOBBI, 1971: 43; Terranova P., 1 ex., VI; Colle Gaudolino, 1 ex., VII; Campotenesse, r., VI.
- Eurythyrea austriaca* L.: PORTA, 1949: 360; TASSI, 1966 a: 20; GOBBI, 1971: 44; Terranova P., 1 ex., VI.
- Meliboeus violaceus* Kiesw.: GERINI, 1955: 5; Duglia, 1 ex., VII.
- Phaenops knoteki* ssp. *ochsi* Schaef.: GOBBI, 1971: 47.
- Ptosima undecimmaculata* Herbst: GERINI, 1955: 1.
- Sphenoptera antiqua* ab. *aridiventris* Cast.: GERINI, 1955: 2;
- Sphenoptera laportei* Saund.: GERINI, 1955: 2; Piano Ruggio, 1 ex., VII.
- Trachys minutus* L.: Duglia, r., VI; Pantano Grande, 1 ex., VI;
- Trachys scrobiculatus* Kiesw.: GERINI, 1955: 7; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII.

#### DASCILLIDAE

- Dascillus cervinus* L.: BINAGHI, 1955: 18; Piano Ruggio, p.c., VI-VII; Coppola di Paola, pendici sud, p.c., VII.

HELODIDAE

- Cyphon palmi* Nyholm: PORTA, 1949: 359; (E);  
*Cyphon palustris* Thoms.: FOCARILE, 1960 b: 119;  
*Cyphon unguiculatus* Nyholm: FOCARILE, 1961: 267.  
*Microcara pilosula* Reitt.: FOCARILE, 1960 b: 115.

EUCINETIDAE

- Eucinetus meridionalis* Cast.: Coppola di Paola, pendici nord-est, r., VIII.

DRYOPIDAE

- Dryops luridus* Er.: Duglia, r., VI;  
*Dryops sulcipennis* Costa: Duglia, 1 ex., VII; L. Fondo, 1 ex., VI.

ELMIDIDAE

- Limnius perrisi* Duf.\*: Duglia, r., VII;  
*Limnius opacus* Müll.\*: Duglia, r., VI-VII.  
*Riolus subviolaceus* Müll.\*: Vacquarro, r., VI.

HETEROCERIDAE

- Heterocerus fenestratus* Thunb.: Campotinese, r., VII;  
*Heterocerus flavidus* Rossi: Campotinese, c., VII.

DERMESTIDAE

- Anthrenus fuscus* Ol.: Terranova P., 1 ex., VIII;  
*Anthrenus munroi* Hint.\*: Campotinese, 1 ex., 10.VII.1985; ANGELINI & MONTEMURRO (1986: in stampa) lo segnalano di Policoro (Basilicata) come nuovo per la fauna italiana;  
*Anthrenus pimpinellae* ssp. *mroczkowskii* Kal.\*: Terranova P., ex., VII/1977; ANGELINI & MONTEMURRO (1986: in stampa) lo segnalano di Policoro (Basilicata) come nuovo per la fauna italiana; (M);

- Anthrenus signatus* Er.\*\*: Terranova P., 1 ex., V; noto di Friuli V. Giulia, Sicilia e Sardegna (LUIGIONI, 1929: 541);  
*Anthrenus verbasci* L.: Terranova P., r., VI.  
*Attagenus calabricus* Reitt.: Terranova P., r., VI;  
*Attagenus pellio* v. *pilosissimus* Roub.: Campotinese, 1 ex., VIII;  
*Attagenus punctatus* Scop.: Terranova P., 1 ex., V;  
*Attagenus unicolor* Br.\*: Pedarreto, a., VII.  
*Ctesias serra* F.\*: Campotinese, r., VI-VII.  
*Dermestes frischii* Kug.: Duglia, r. VI;  
*Dermestes lanarius* Ill.\*: Campotinese, 1 ex., VII;  
*Dermestes olivieri* Lep.: Cugno dell'Acero, r., VIII; Fontana Rummo 1 ex., VII; Valle Malvento, p.c., VIII.  
*Globicornis marginata* Payk.\*\*: Duglia, c., VI; nota di Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino A. Adige, Toscana (LUIGIONI, 1929: 539); (M);  
*Globicornis picta* Küst.\*: Anticristo, p.c., VI;  
*Globicornis ? sulcata* Bris.: Campotinese, r., VI-VII;  
*Globicornis variegata* Küst.: Anticristo, p.c., VI.  
*Orphilus niger* Rossi: Terranova P., r., VI; Campotinese, p.c., V-VII.

#### BYRRHIDAE

- Byrrhus numidicus* Norm. (= *grandii* Fiori): PORTA, 1949: 174; Piano Polino, 1 ex., VI;  
*Byrrhus pustulatus* Först.: PORTA, 1959: 174.

#### TROGOSITIDAE

- Nemosoma elongatum* L.: Piano Ruggio, 1 ex., VII, *leg.* MONTEMURRO.  
*Ostoma ferruginea* L.\*: Cugno Ruggeri, r., VI-VII.  
*Temnochila coerulea* Ol.: GOBBI, 1983: 51.  
*Tenebroides mauritanicus* L.: Duglia, r., VII; Piano Ruggio, r., VII, *leg.* MONTEMURRO.  
*Thymalus limbatus* F.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 69; Cugno Ruggeri, p.c., VI-VII.  
*Zimioma grossum* L.: GOBBI, 1973: 36.

BYTURIDAE

- Byturus tomentosus* F.: GOBBI, 1973: 37.  
*Diplocoelus fagi* Guér.: Duglia, r., VIII.

NITIDULIDAE

- Brachypterolus linariae* Corn.\*: Piano Ruggio, 1 ex., VI; (M);  
*Brachypterolus urticae* F.: MAREK, 1961: 1; Duglia, r., VI.  
*Cryptarca strigata* F.\*: Terranova P., r., VIII;  
*Cryptarca undata* Ol.\*: Terranova P., 1 ex., VIII.  
*Epuraea aestiva* L.: Timpa del Demonio, 1 ex., VI; Terranova P., r., V;  
*Epuraea fuscicollis* Steph.: MAREK, 1961: 2;  
*Epuraea guttata* Ol.: AUDISIO, 1976: 96; Terranova P., 1 ex., VI; (M);  
*Epuraea longula* Er.\*: Piano Ruggio, 1 ex., VI, leg. MONTEMURRO;  
*Epuraea melina* Er.\*: Piano Ruggio, c., VI;  
*Epuraea obsoleta* F.: MAREK, 1961: 2;  
*Epuraea pallescens* Steph.\*: Campotenese, r., VII;  
*Epuraea silacea* Herbst: MAREK, 1961: 2; Piano Ruggio, 1 ex., VII, leg. MONTEMURRO; (M);  
*Epuraea unicolor* Ol.: Piano Ruggio, 1 ex., VII, leg. MONTEMURRO.  
*Ipidia quadrimaculata* Quens.: MAREK, 1961: 2.  
*Meligetes aeneus* F.: Piano Ruggio, c., VI;  
*Meligetes angustatus* Küst.\*: Piano Ruggio, r., VI, leg. MONTEMURRO; (M);  
*Meligetes anthracinus* Bris.\*: Piano Ruggio, 1 ex., VII; (M);  
*Meligetes atratus* Ol.: Terranova P., p.c., V;  
*Meligetes brevis* Sturm\*: Campotenese, p.c., VIII;  
*Meligetes erichsoni* Bris.\*: Piano Ruggio, 1 ex., VI;  
*Meligetes erythropus* Marsh.: Piano Ruggio, c., VI; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VI;  
*Meligetes flavimanus* Steph.: Terranova P., 1 ex., VII;  
*Meligetes fumatus* Er.\*: Terranova P., 1 ex., VI; (M);  
*Meligetes lepidii* Mill.\*: Terranova P., r., VI; Campotenese, r., VI;  
*Meligetes nigrescens* Steph.: Duglia, 1 ex., V; Anticristo, p.c., VI;  
*Meligetes paschalis* Sporn.\*: Piano Ruggio, 1 ex., VI, leg. MONTEMURRO;  
*Meligetes planiusculus* Heer: Cugno dell'Acero, p.c., IV;  
*Meligetes punctatus* Bris.: Duglia, p.c., VI; Piano Ruggio, c., VI;  
*Meligetes reyi* Guill.: AUDISIO, 1975: 2; (M);

- Meligetes sordidus* Kug.: AUDISIO, 1975: 2; (M);  
*Meligetes subrugosus* Gyll.: Campotense, 1 ex., VII;  
*Meligetes umbrosus* Sturm: Duglia, r., V; Piano Ruggio, c., VI;  
*Meligetes viridiscens* F.: Acqua Tremola, p.c., VI; pendici nord-ovest di Serra  
Dolcedorme, 1 ex., VI; Vacquarro, r., VI; Vallone Zaperna, 1 ex., VI;  
Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, p.c., VI.  
*Nitidula carnaria* Schall.: Piano Ruggio, p.c., VI.  
*Pocadius ferrugineus* F. ab. *thoracicus* Reitt.: MAREK, 1961: 3; Piano Toscano,  
r., VI; Colle dell'Impiso, 1 ex., VII; Piano Ruggio, r., VI-VIII.  
*Soronia oblonga* Bris.: MAREK, 1961: 2.

#### RHIZOPHAGIDAE

- Rhizophagus bipustulatus* F.: MAREK, 1961: 3; Duglia, c., V-VII; Coppola di  
Paola, rif. Rotonda, c., VI-VIII;  
*Rhizophagus dispar* Payk.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 69; Coppola  
di Paola, rif. Rotonda, c., VI;  
*Rhizophagus nitidulus* F.: MAREK, 1961: 3.

#### CUCUJIDAE

- Abasversus advena* Waltl.: Campotense, c., VI.  
*Cryptolestes ferrugineus* Steph.: Duglia, p.c., V-VII; Acqua Tremola, 1 ex., VI;  
Colle Gaudolino, r., VII;  
*Cryptolestes spartii* Curt.: Colle del Dragone, p.c., VII; Anticristo, c., VI.  
*Laemophloeus monilis* F.: Piano Ruggio, p.c., V-VII; Coppola di Paola, pen-  
dici sud, 1 ex., VI.  
*Monotoma longicollis* Gyll.: Terranova P., r., VI.  
*Oryzaephilus surinamensis* L.: Campotense, r., VI.  
*Pediacus dermestoides* F.\*: Piano Ruggio, r., VI.  
*Placonotus testaceus* F.: Campotense, c., VI-VIII.  
*Psammoecus bipunctatus* F.\*: Campotense, 1 ex., VI; (M).  
*Silvanus unidentatus* F.: Terranova P., c., V-VIII.  
*Uleiota planata* L.: Piano delle Mandre, r., VI; Coppola di Paola, pendici sud,  
1 ex., VII.



EROTYLIDAE

- Dacne pontica* Bed.: ZAMPETTI, 1979: 96; Piano Ruggio, c., VII;  
*Dacne rufifrons* F.\*: Duglia, c., VII; Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c.,  
V-IX; Anticristo, p.c., VI; (M).  
*Triplax aenea* Schall.: Duglia, 1 ex., VIII, leg. MONTEMURRO;  
*Triplax lacordairei* Crot.: GOBBI, 1973: 37; Duglia, r., VIII; Vallone di Vigi-  
gianello, r., VII; Valle Malvento, 1 ex., VI; Pedarreto, p.c., VI-VII;  
*Triplax marseuli* Bed.: Cugno dell'Acero, c., VI-IX; (M);  
*Triplax russica* L.: Duglia, p.c., VII-IX.  
*Tritoma bipustulata* F.: Terranova P., r., VI.

CRYPTOPHAGIDAE

- Antherophagus nigricornis* F.: OTERO & ANGELINI, 1984: 90; Valle Malvento,  
1 ex., VI, leg. MONTEMURRO; (M).  
*Atomaria pusilla* Payk.: OTERO & ANGELINI, 1984: 91; Rotonda, 1 ex., IX;  
*Atomaria ruficornis* Marsh.: OTERO & ANGELINI, 1984: 93; Duglia, 1 ex.,  
VII, leg. DE MARZO; Rotonda, c., IX;  
*Atomaria slavonica* Johns.: OTERO & ANGELINI, 1984: 91; Duglia, 1 ex., VIII,  
leg. DE MARZO; (M).  
*Cryptophagus badius* Sturm: OTERO & ANGELINI, 1984: 83; Duglia, c., VII,  
leg. DE MARZO;  
*Cryptophagus dentatus* Herbst: OTERO & ANGELINI, 1981: 97; 1984: 86;  
Duglia, r., IX; leg. ANGELINI & MONTEMURRO; Piano Ruggio, 1 ex., VII;  
*Cryptophagus pilosus* Gyll.: OTERO & ANGELINI, 1984: 89; Coppola di Paola,  
pendici nord-est, 1 ex., VII;  
*Cryptophagus scanicus* L.: OTERO & ANGELINI, 1981: 99; 1984: 87; Duglia,  
1 ex., VIII, leg. DE MARZO; Piano Ruggio, p.c., VI-VIII, leg. ANGELINI  
& MONTEMURRO.  
*Sternodea baudii* Reitt.: OTERO & ANGELINI, 1984: 91; Valle Malvento, 1 ex.,  
VIII.

PHALACRIDAE

- Olibrus bisignatus* Mén.: PORTA, 1959: 165.  
*Tolyphus punctatostriatus* Kraatz: Terranova P., p.c., VI.

MEROPHYSIIDAE

*Holopamecus caularum* Aubé \*: Campotinese, r., VI-VII.

LATHRIDIIDAE

*Aridius nodifer* Westw.: Piano Ruggio, 1 ex., VI; Colle del Dragone, r., VII.

*Corticaria fulva* Com.: Acqua Tremola, 1 ex., VI;

*Corticaria obscura* Bris.\*: Anticristo, r., VII;

*Corticaria serrata* Payk.: Duglia, c., VIII, *leg.* DE MARZO; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII.

*Corticaria gibbosa* Herbst: Piano Ruggio, 1 ex., VIII; Campotinese, r., VII.

*Dienerella elongata* Curt.: Duglia, c., VIII, *leg.* DE MARZO; Piano Ruggio, r., X;

*Dienerella parilis* Rey \*: Piano Ruggio, 1 ex., VI.

*Enicmus brevicornis* Mannh.: Serra del Prete, pendici nord-est, r., VI;

*Enicmus histrio* Joi & Tomlin: Piano Ruggio, 1 ex., VI; (M);

*Enicmus rugosus* Herbst: Cugno dell'Acero, r., VII; Piano Ruggio, 1 ex., VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VII;

*Enicmus transversus* Ol.: Serra del Prete, pendici nord-est, r., VI-VII.

*Latridius anthracinus* Mannh.\*\*: Piano Ruggio, 1 ex., VI, *leg.* e *coll.* MONTMURRO; noto di A. Marittime, Trentino A. Adige, Piemonte (LUIGIONI, 1929: 532); (M);

*Latridius brevicollis* Thoms.: Colle dell'Impiso, r., VII;

*Latridius consimilis* Mannh.\*: Colle del Dragone, r., VI; (M);

*Latridius minutus* L.: Duglia, r., VIII, *leg.* DE MARZO, *coll.* ANGELINI.

*Melanophthalma fuscipennis* Mannh.: Serra delle Ciavole, pendici sud-est, r., VII; Piano Ruggio, p.c., VII;

*Melanophthalma taurica* Mannh.: Vacquarro, p.c., VII; Piano Ruggio, c., VII; Campotinese, c., VII;

DASYCERIDAE

*Dasycerus sulcatus* Broung.\*: Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII.

MYCETOPHAGIDAE

*Litargus connexus* Geoffr.: Pantano Grande, p.c., VI-VII.

*Micetophagus quadripustulatus* L.: Duglia, 1 ex., VIII, *leg.* DE MARZO.

- Mycetoporus atomarius* F.: Duglia, c., VI; Valle Malvento, c., VIII; Piano Ruggio, p.c., VI-IX; Fosso Mauro, r., VI-VII; Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VI; Campotenese, r., VII.
- Trypbillus bicolor* F.: Duglia, p.c., VI; Colle dell'Impiso, r., VII; Vacquarro, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI.
- Typhaea stercorea* L.: Piano delle Mandre, c., VI; Cugno Ruggeri, r., VIII; Valloncello di Viggianello, c., VII.

#### COLYDIIDAE

- Aglenus brunneus* Gyll.: Campotenese, 1 ex., VI.
- Bothrideres contractus* F.: GOBBI, 1973: 38; Terranova P., r., VI-VII.
- Cerophachis celtis* Germ.: Duglia, c., VII; Coppola di Paola, pendici sud, r., VII.
- Cicones variegatus* Hellw.: Duglia, r., VIII; leg. DE MARZO; Vacquarro, 1 ex., VI; Vallone Zaperna, r., VI; Valle Malvento, p.c., VIII; Piano Ruggio, p.c., VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VII.
- Colobicus hirtus* Rossi: Cugno Ruggeri, 1 ex., VI; Coppola di Paola, pendici sud, r., VII.
- Coxelus pictus* Sturm: GOBBI, 1973: 38; Vacquarro, 1 ex., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, p.c., VI-VII.
- Ditoma crenata* F.: Duglia, p.c., V-IX; Piano delle Mandre, 1 ex., VI; Cozzo Dimoniello, Fosso Mauro, r., V.
- Endophloeus markovickianus* Pill.: Duglia, 1 ex., IX.
- Oxylaemus cylindricus* Panz.\*\*: Duglia, 1 ex., V; noto di Emilia, Abruzzo, Sardegna (LUIGIONI, 1929: 491).
- Pycnomerus tenebrans* Ol.: GOBBI, 1973: 38.
- Tarphius gibbulus* Germ.\*: Coppola di Paola, pendici nord-est, r., VII.
- Teredrus cylindricus* Ol.: Terranova P., r., VI-VIII.

#### CERYLONIDAE

- Cerylon fagi* Bris.: Duglia, c., V-IX; Colle dell'Impiso, 1 ex., VI; Timpa del Demonio, r., VI; Valle Malvento, c., VIII; Piano Ruggio, c., VI-VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est, e sud, c., VI-VIII;
- Cerylon ferrugineum* Steph.: Duglia, c., V-VIII; Serra del Prete, pendici ovest, c., VI; Piano Ruggio, c., VI;
- Cerylon histeroides* F.: Duglia, p.c., VI; Vacquarro, r., VI; Coppola di Paola, rif. Rotonda, c., VI.

- Philothermus evanescens* Reitt.\*: Duglia, c., VI-VIII;  
*Philothermus semistriatus* Perr.: Acqua Tremola, 1 ex., VI; (M).

ENDOMYCHIDAE

- Endomychus coccineus* L.: Terranova P., c., V; Colle Gaudolino, r., VII.  
*Lycoperdina bovistae* F.: Colle dell'Impiso, p.c., VIII; Valle Malvento, p.c., VI;  
*Lycoperdina validicornis* Gerst.: Vacquarro, 1 ex., VII; noto di Toscana, Lazio  
e Sardegna (LUIGIONI, 1929: 502).  
*Mycetina cruciata* Schall.: GOBBI, 1973: 38; Acqua Tremola, r., VI.  
*Mycetaea hirta* Marsh.: Vacquarro, 1 ex., VII.

COCCINELLIDAE

- Adalia bipunctata* L.: Piano delle Mandre, c., VI; Valle Malvento, c., VIII;  
Campotense, p.c., VI-VIII;  
*Adalia decempunctata* L.: Duglia, c., VI-VIII; Vacquarro, 1 ex., VII; Piano  
Ruggio, 1 ex., VII; Campotense, r., VII.  
*Anisosticta novemdecimpunctata* L.: Cugno Ruggeri, 1 ex., VII.  
*Calvia quatuordecimguttata* L.\*: Terranova P., r., VI-VII; Piano Ruggio, 1 ex.,  
VI.  
*Chilocorus bipustulatus* L.: Terranova P., p.c., VI-VII; Campotense, r., VI.  
*Coccinella septempunctata* L.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 81; molto  
comune ovunque, IV-VIII.  
*Coccinula quatuordecimpustulata* L.: Duglia, r., VI.  
*Exochomus quadripustulatus* L.: Colle dell'Impiso, 1 ex., VII.  
*Halyzia sedecimguttata* L.: Campotense, 1 ex., VI.  
*Harmonia quadripunctata* Pont.\*: Duglia, p.c., VI; Valle Malvento, 1 ex., VII;  
Anticristo, r., V-VII.  
*Hippodamia variegata* Goeze: strada Terranova P.-Duglia, 1 ex., VI; Duglia, c.,  
VI-VII; Campotense, r., VI-VII.  
*Lindorus lophantae* Blaisd.\*: Terranova P., 1 ex., V; (M).  
*Myrrha octodecimguttata* L.\*: Duglia, c., VII; Valle Malvento, c., VIII; Piano  
Ruggio, r., VI-VII; Anticristo, c., VI.  
*Nephus bipunctatus* Kug.: Piano Ruggio, 1 ex., VI;  
*Nephus nigricans* Weise \*: Terranova P., r., VI; Anticristo, r., VI.  
*Nephus quadrimaculatus* Herbst: Duglia, r., VI.

- Oenopia conglobata* L.: Terranova P., 1 ex., VII;  
*Oenopia lyncea* Ol.: Campotenesse, p.c., VI.  
*Platinaspis luteorubra* Goeze: Canale di Malevento, r., VII; Piano Pollino, r., VII.  
*Propylaea quatuordecimpunctata* v. *leopardina* Weise \*: Madonna di Pollino, r., VII; Piano Ruggio, p.c., VII.  
*Psyllobora vigintiduopunctata* L.: Cugno dell'Acero, r., VI; Serra delle Ciavole, pendici sud-est, 1 ex., VII; Piano Pollino, r., VII; Colle Gaudolino, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Colle del Dragone, c., VI-VII.  
*Rhizobius litura* F.: Colle Gaudolino, r., VII; Valle Malvento, c., VIII.  
*Scymnus (Pullus) auritus* Thunbg.: SCHATZMAYR, 1943: 135 (sub *Pullus auritus* Thunbg.); Vacquarro, 1 ex., VI;  
*Scymnus (Pullus) mediterraneus* Khnz.: Duglia, r., VI-VII; Valle Malvento, 1 ex., VI;  
*Scymnus (Pullus) subvillosus* Goeze: Terranova P., r., VI-VII; Cozzo di Visitone, r., VI; Anticristo, r., VII;  
*Scymnus (Pullus) suturalis* Thunbg.: Valle Malvento, 1 ex., VIII;  
*Scymnus apetzi* Muls.: Pantano Grande, r., VI; Valle Malvento, r., VI; Coppola di Paola, pendici sud e vetta, r., VII;  
*Scymnus frontalis immaculatus* Suffr.: Duglia, 1 ex., VII;  
*Scymnus marginalis* Rossi \*: Vallone Zaperna, r., VI; Anticristo, r., VI; (M);  
*Scymnus rubromaculatus* Goeze: Piano Pollino, r., VII; Valle Malvento, r., VI.  
*Sospita vigintiguttata* L.\*: Piano Ruggio, r., VI.  
*Stethorus punctillum* Weise: Duglia, 1 ex., VI.  
*Subcoccinella vigintiquatuoropunctata* L.: Colle dell'Impiso, p.c., VI-VII; Vacquarro, r., VI; Vallone e Piano Zaperna, r., VI-VII; Valle Malvento, p.c., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII; Anticristo, 1 ex., VII.  
*Vibidia duodecimguttata* Poda: Fontana Rummo, 1 ex., VI; Vacquarro, p.c., VI-VII; Piano Ruggio, 1 ex., VII.

#### SPHINDIDAE

- Sphindus dubius* Gyll.: Piano Ruggio, p.c., V-IX.

#### ASPIDIPHORIDAE

- Aspidiphorus orbiculatus* Gyll.: Duglia, r., VIII; Piano delle Mandre, r., VI.

CISIDAE

- Cis boleti* Scop.: Acqua Tremola, r., VI; Piano delle Mandre, c., VI; Serra del Prete, pendici nord-est, c., VI-VII; Timpa del Demonio, r., VI; Valle Malvento, c., VIII; Piano Ruggio, c., VI-VIII; Cozzo Dimoniello, c., VI-VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est e sud, c., VI-VII; Vallone della Caballa, c., VII;
- Cis castaneus* Mellié \*: Duglia, r., VI;
- Cis comptus* Gyll.: Campotinese, p.c., VIII;
- Cis dentatus* Mellié \*\*: Duglia, c., IX; noto di Piemonte, Ticino, Appennino Romagnolo (LUIGIONI, 1929: 498); (M);
- Cis hispidus* Gyll.: Duglia, c., VIII; Serra del Prete, pendici ovest, c., VI-VIII; Valle Malvento, c., VIII;
- Cis lineatocribatus* Mellié \*: Duglia, r., VII; Serra Dolcedorme, pendici nord-ovest, c., VII; Vacquarro, c., VI; Piano Ruggio, c., VII; Coppola di Paola, pendici nord-est, r., VII;
- Cis micans* F.: Duglia, 1 ex., VIII; Serra delle Ciavole, pendici sud-est, c., VII; Colle dell'Impiso, r., VI;
- Cis nitidus* Herbst: Terranova P., c., IX; Duglia, c., VI-IX; Cugno dell'Acero, c., VI-VIII; Pantano Grande, r., VI; Piano Pillino, r., VIII; Colle dell'Impiso, c., VI; Vacquarro, c., VI; Piano Ruggio, c., VIII; Anticristo, r., VI;
- Cis setiger* Mellié: Duglia, 1 ex., VIII.
- Ennearthron affine* Gyll.\*: Duglia, 1 ex., VII;
- Ennearthron cornutum* Gyll.\*: Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII; (M).
- Octotemnus glabriculus* Gyll.: Serra del Prete, pendici ovest, c., VI-VIII.
- Rhopalodontus perforatus* Gyll.: Piano Ruggio, 1 ex., VI.
- Sulcaxis bicornis* Mellié \*: Valloncello di Viggianello, r., VI; Piano Ruggio, r., VI; Anticristo, 1 ex., VI.
- Xylographus bostrychoides* Duft.\*: Campotinese, r., VII.

LYCTIDAE

- Trogoxylon impressus* Com.: Terranova P., p.c., VI-VII.

BOSTRYCHIDAE

- Bostrychus capucinus* L.: Cozzo di Visitone, 1 ex., VI.
- Rhizoperta dominica* F.: Duglia, c., V; Piano delle Mandre, 1 ex., VI; Cugno Ruggeri, 1 ex., V.

- Scobicia chevrieri* Villa: Terranova P., 1 ex., VII; Piano Ruggio, c., VII.  
*Sinoxylon sextentatum* OL.: Campotenese, 1 ex., VII.  
*Stephanopachys quadricollis* Mars.\*\*: Cugno Ruggeri, 1 ex., VI; noto di Liguria, Piemonte, Sicilia e Corsica (LUIGIONI, 1929: 640).

ANOBIIDAE

- Anobius punctatus* Deg.: Piano Pollino, 1 ex., VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VI.  
*Caenochara subglobosa* Muls.: Acqua Tremola, r., VI; Duglia, c., IX; (M).  
*Dendrophilus rugicollis* Muls.\*: Anticristo, 1 ex., VII.  
*Ernobius longicornis* Sturm: Piano Ruggio, r., VI, *leg.* MONTEMURRO;  
*Ernobius nigrinus* Sturm \*\*: Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, c., VI; noto di Piemonte, Trentino A. Adige, Friuli V. Giulia (LUIGIONI, 1929: 645).  
*Lasioderma apicatum* Muls.\*: Cugno Ruggeri, 1 ex., VII;  
*Lasioderma baudii* Schils.: Piano Ruggio, 1 ex., VI;  
*Lasioderma obscurum* Solsky \*\*: Madonna di Pollino, c., VI; Anticristo, c., VI; noto di Toscana, Lazio e Sicilia (LUIGIONI, 1929: 650);  
*Lasioderma serricorne* F.: Terranova P., r., VI; Duglia, 1 ex., VI.  
*Ochina latreillei* Bon.\*\*: Piano Ruggio, 1 ex., VI; noto di Piemonte e Trentino A. Adige (LUIGIONI, 1929: 644); (M).  
*Oligomerus ptilinoides* Woll.: Piano Ruggio, 1 ex., VII; Cozzo di Dimoniello, r., VI.  
*Ptilinus pecticornis* L.: Cugno Ruggeri, 1 ex., VI.  
*Ptinomorphus imperialis* L.: Vacquarro, 1 ex., VII; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Coppola di Paola, rif. Rotonda, 1 ex., VI; Fosso Mauro, r., VI;  
*Ptinomorphus regalis* Duft.\*: Anticristo, 1 ex., VII.  
*Stegobium paniceum* L.: Piano delle Mandre, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI.  
*Xestobium rufovillosum* Deg.: Campotenese, 1 ex., VI.  
*Xyletinus laticollis* Duft.: Serra del Prete, pendici ovest, 1 ex., VII; Timpa del Demonio, 1 ex., VI;  
*Xyletinus subrotundatus* Larey \*: Piano Ruggio, r., VI.

PTINIDAE

- Ptinus aubei* Boield.: Cugno Ruggeri, r., VI;  
*Ptinus calcaratus* Kiesw.\*: Campotenese, 1 ex., X;

- Ptinus clavipes* Panz.: Duglia, 1 ex., VI; Pantano Grande, r., VII;  
*Ptinus fur* L.: Terranova P., c., VI-VII;  
*Ptinus moori* Khnz. (= *latro* auct.): Terranova P., 1 ex., IX; Duglia, r., VIII;  
*Ptinus obesus* Lucas: Vacquarro, r., VI-VII; Piano Ruggio, c., VII;  
*Ptinus pilosus* Muls.\*: Colle dell'Impiso, 1 ex., VI;  
*Ptinus tarsalis* Reitt.: Campotinese, 1 ex., 9.VI.1979; ANGELINI & MONTE-  
MURRO (1986, in stampa) lo citano di Policoro (Basilicata) come nuovo per  
la fauna italiana.

OEDEMERIDAE

- Chrysanthia viridissima* L.: BOLOGNA, 1976: 29; Valle Malvento, p.c., VI.  
*Ischnomera cinerascens* Pand.: MAGISTRETTI, 1955 b: 1 (sub *Asclera cinera-*  
*scens* Pand.); Timpa del Demonio, c., VI;  
*Ischnomera coerulea* L.: MAGISTRETTI, 1967: 189 (sub *Asclera coerulea* L.);  
Timpa del Demonio, 1 ex., VI;  
*Ischnomera sanguinicollis* F.: Duglia, 1 ex., VI; Timpa del Demonio, c., VI.  
*Oedemera atrata* Schmd.: MAGISTRETTI, 1955 b: 2; Valle Malvento, r., VI;  
Piano Ruggio, 1 ex., VI;  
*Oedemera brevicollis* Schmd.: Terranova P., 1 ex., VI;  
*Oedemera caudata* Seidl.: Campotinese, r., VI-VII;  
*Oedemera femorata* Scop.\*: Vallone della Caballa, 1 ex., VII;  
*Oedemera flavescens* L.: Cugno Ruggeri, 1 ex., VI; Pantano Grande, 1 ex., VI;  
*Oedemera flavipes* Ol.: MAGISTRETTI, 1955 b: 2; Valle Malvento, r., VI-VII;  
Piano Ruggio, r., VI-VII; Anticristo, 1 ex., VI; Campotinese, 1 ex., VII;  
*Oedemera lurida* Marsh.: MAGISTRETTI, 1955 b: 2;  
*Oedemera melanopyga* Schmd.: MAGISTRETTI, 1955 b: 1; Piano Ruggio, 1 ex.,  
VII, leg. MONTEMURRO;  
*Oedemera nobilis* Scop.: MAGISTRETTI, 1955 b: 2; Piano Ruggio, c., VI-VII;  
Anticristo, c., VI-VII; Campotinese, c., VII;  
*Oedemera podagrariae* L.: MAGISTRETTI, 1955 b: 2; Valle Malvento, c., VI;  
Piano Ruggio, r., VI; Anticristo, 1 ex., VI; Campotinese, p.c., VI;  
*Oedemera subulata* Ol.: MAGISTRETTI, 1955 b: 2; Vacquarro, 1 ex., VI; Valle  
Malvento, c., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VII; Anticristo, c., VI.  
*Nacerda ruficollis* F.: MAGISTRETTI, 1955 b: 1.  
*Oncomera femorata* F.: Acqua Tremola, 1 ex., VI; nota di Piemonte, Veneto,  
Trentino A. Adige, Friuli V. Giulia, Lazio (MAGISTRETTI, 1967: 100),  
Sicilia (LUIGIONI, 1929: 661).



PYTHIDAE

- Mycterus tibialis* Küst.: Duglia, r., VI-VII.  
*Rhinosimus planirostris* F.: Valle Malvento, 1 ex., VI;  
*Rhinosimus ruficollis* L.\*: Piano Ruggio, c., VII; (M).  
*Vincenzellus viridipennis* Latr.: GOBBI, 1973: 38; Duglia, p.c., VI-IX.

PYROCHROIDAE

- Pyrochroa coccinea* L.: Fosso Mauro, 1 ex., VI;  
*Pyrochroa serraticornis* ssp. *kiesenwetteri* Fairm.\*: Duglia, r., VI, leg. MONTMURRO.

SCRAPTIIDAE

- Scaptia bifoveolata* Küst.: Duglia, r., VI;  
*Scaptia dubia* Ol.: Vacquarro, r., VII; Piano Ruggio, r., VI-VII; Anticristo, r., VI.

ADERIDAE

- Phytobaeus amabilis* Sahlb.\*\*: Coppola di Paola, pendici nord-est, Rifugio Rotonda, 1 ex., VI; LUIGIONI (1929: 667) lo cita di Piemonte.

ANTHICIDAE

- Notoxus miles* ssp. *italicus* Bucc.: Campotenese, 1 ex., VI;  
*Notoxus trifasciatus* Rossi: strada Terranova P.-Duglia, r., VI; Campotenese, c., VII.  
*Endomia tenuicollis* Rossi: Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII.  
*Anthicus niger* Ol.: Piano Ruggio, p.c., VI; Anticristo, r., VI-VII;  
*Anthicus bifasciatus* Rossi: Vacquarro, 1 ex., VII;  
*Anthicus laeviceps* Baudi: strada Terranova P.-Duglia, r., VII;  
*Anthicus antherinus* L.: BUCCIARELLI, 1961: 124.  
*Hirticomus quadriguttatus* Rossi: Campotenese, r., VII;

- Hirticomus hispidus* Rossi: Acqua Tremola, c., VI; Cugno dell'Acero, 1 ex., V.  
*Omonadus floralis* L.: Cozzo di Dimoniello, c., VI-VIII; Pedarreto, r., VI;  
Anticristo, c., VI.  
*Stricticomus tobias* Mars.\*: Campotenese, 1 ex., VI.  
*Formicomus pedestris* Rossi: strada Terranova P.-Duglia, r., VI; Pedarreto,  
r., VI.  
*Microhoria fasciata* Chevr.: Colle dell'Impiso, r., VI; Valle Malvento, c., VI;  
Piano Ruggio, c., VI-VII; Fosso Mauro, r., VI-VII; Vallone della Caballa,  
c., VII;  
*Microhoria terminata* Schmd.: Acqua Tremola, r., VI;  
*Microhoria raveli* Pic.: BUCCIARELLI, 1980: 215; Valle Malvento, 1 ex., VI;  
Piano Ruggio, 1 ex., VI.

#### MELOIDAE

- Cerocoma schaefferi* L.: Campotenese, r., VI.  
*Lytta vesicatoria* L.: MAGISTRETTI, 1955 b: 3.  
*Meloe brevicollis* Panz.: MAGISTRETTI, 1955 b: 3.  
*Mylabris fabricii* Sum.: MAGISTRETTI, 1955 b: 3 (sub *M. decempunctata* F.);  
Piano Pollino, c., VI; Vacquarro, p.c., VI-VII; Colle Gaudolino, c., VII;  
Piano Ruggio, r., VII; Coppola di Paola, pendici sud, c., VII; Colle del  
Dragone, r., VII; Anticristo, 1 ex., VII;  
*Mylabris flexuosa* Ol.: MAGISTRETTI, 1953: 39; Colle del Dragone, r., VII;  
*Mylabris variabilis* Pall.: MAGISTRETTI, 1953: 43; Colle Gaudolino, r., VII;  
Anticristo, 1 ex., VII.  
*Zonitis immaculata* Ol.: MAGISTRETTI, 1955 b: 4; Anticristo, 1 ex., VII;  
*Zonitis nana* Rag.: MAGISTRETTI, 1955 b: 4;  
*Zonitis praeusta* F.: MAGISTRETTI, 1955 b: 4.

#### MORDELLIDAE

- Anaspis flava* L.: FRANCISCOLO, 1956: 7; Cozzo Dimoniello, p.c., VI;  
*Anaspis frontalis* L.: Piano Ruggio, r., VII;  
*Anaspis lurida* Steph.: Anticristo, c., VI; Campotenese, r., VII;  
*Anaspis maculata* Fourcr.: Cugno dell'Acero, r., VI-VII;  
*Anaspis melanostoma* Costa: FRANCISCOLO, 1956: 6;  
*Anaspis nigripes* Bris.: Valle Malvento, r., VII;  
*Anaspis pulicaria* Costa: FRANCISCOLO, 1956: 5; Piano Ruggio, c., VI; Cam-  
potenese, 1 ex., VII;

- Anaspis ruficollis* F.: FRANCISCOLO, 1956: 5;  
*Anaspis serbica* Apfelb.\*: Valle Malvento, r., VI-VII; Piano Ruggio, c., VI;  
*Anaspis subtestacea* Steph.: FRANCISCOLO, 1956: 6;  
*Anaspis thoracica* L.: FRANCISCOLO, 1956: 6; Valle Malvento, r., VI;  
*Anaspis varians* Muls.: FRANCISCOLO, 1956: 7; Pendici nord-ovest di Serra Dolcedorme, r., VII; Piano Ruggio, 1 ex., VII; Anticristo, 1 ex., VII;  
*Anaspis viennensis* Schilsky: PORTA, 1959: 218; (M).  
*Mediimorda bipunctata* Germ.: FRANCISCOLO, 1956: 3 (sub *Mordella bipunctata* Germ.); Terranova P., 1 ex., VI.  
*Mordella holomelaena* Apfelb.\*\*: Duglia, 1 ex., VII; Colle Gaudolino, r., VII; Serra del Prete, pendici nord-est, r., VII; PORTA (1959: 208) la cita del Veneto (Venezia);  
*Mordella leucaspis* Küst.\*: Anticristo, r., VII; Campotenese, c., VII;  
*Mordella meridionalis* Méq.: FRANCISCOLO, 1956: 2;  
*Mordella purpurascens* Apfelb.: FRANCISCOLO, 1956: 3.  
*Mordellistena brevicauda* Boh.: FRANCISCOLO, 1956: 3;  
*Mordellistena emeryi* Schl.: FRANCISCOLO, 1956: 4 (sub *M. confinis* var. *emeryi* Schl.); Acqua Tremola, r., VII; Anticristo, 1 ex., VII;  
*Mordellistena episternalis* Muls.: FRANCISCOLO, 1956: 5;  
*Mordellistena micans* Germ.: FRANCISCOLO, 1956: 4;  
*Mordellistena micantoides* Erm.\*\*: Campotenese, 1 ex., VI; PORTA (1959: 214) la cita di Alto Adige;  
*Mordellistena minima* Costa: Cozzo di Visitone, c., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Fosso Mauro, Coppola di Paola, c., VI-VII;  
*Mordellistena parvula* Gyll.: FRANCISCOLO, 1956: 5;  
*Mordellistena pseudohirtipes* Erm.\*\*: Piano Ruggio, c., VI; ANGELINI & MONTMURRO (1986, in stampa) lo citano di Policoro (Basilicata) come presumibilmente nuovo per la fauna italiana.  
*Mordellistena pumila* Gyll.: FRANCISCOLO, 1956: 4; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Colle del Dragone, r., VI;  
*Mordellistena stenidea* Muls.: FRANCISCOLO, 1956: 4.  
*Mordellistenula perrisi* Muls.\*\*: Campotenese, 1 ex., VII; LUIGIONI (1929: 688) lo cita di Campania e Sicilia, PORTA (1959: 208) di Toscana, I. Giglio e Sardegna.  
*Tomoxia biguttata* Gyll.: FRANCISCOLO, 1956: 2.  
*Variimorda fasciata* F.: FRANCISCOLO, 1956: 3 (sub *Mordella fasciata* F.); Terranova P., c., VII; Duglia, p.c., VI; Piano Toscano, r., VI; Cozzo Dimoniello, r., VII; Pedareto, c., VIII; Anticristo, c., VII-VIII; Campotenese, r., VII.

MELANDRYIDAE

- Abdera quadrifasciata* Curt.\*: Campotinese, c., VII.  
*Orchesia undulata* Kr.: GOBBI, 1973: 39; Coppola di Paola, rif. Rotonda, pendici nord-est, 1 ex., VI.  
*Osphya bipunctata* F.: Timpa del Demonio, c., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI; Cozzo Dimoniello, p.c., VI; Fosso Mauro, r., VI; Pedarreto, r., VI; Anticristo, c., VI.  
*Phloeotrya vaudoueri* Muls.\*: Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VIII; Anticristo, 1 ex., VII.  
*Serropalpus barbatus* Schall.: GOBBI, 1973: 39; Serra del Prete, pendici nord-est, 1 ex., VII.

LAGRIIDAE

- Lagria atripes* Muls.: Piano Ruggio, p.c., VI-VIII;  
*Lagria hirta* L.: Duglia, p.c., VI-VIII; Piano Pollino, c., VIII; Cozzo di Visitone, c., V; Valle Malvento, r., VI-VII; Piano Ruggio, c., VI-VIII; Cozzo Dimoniello, r., VI; Campotinese, c., VI-VII.

ALLECULIDAE

- Cteniopus flavus* Scop.: Duglia, r., VII; Anticristo, c., VI.  
*Gonodera luperus* Herbst: MAGISTRETTI, 1955 b: 4; Piano Pollino, c., VI-VII; Timpa del Demonio, p.c., VI; Anticristo, p.c., VI; Campotinese, p.c., VII;  
*Gonodera luperus* f. *ferruginea* F.: Piano Pollino, c., VI; Fontana di Rummo, r., VI; Vacquarro, r., VI; Timpa del Demonio, c., VI; Piano Ruggio, r., VI; Fosso Mauro, r., VI; Campotinese, c., VI-VII;  
*Gonodera metallica* Küst.: Timpa del Demonio, c., VI; Anticristo, c., VI; Campotinese, c., VI.  
*Isomira icteropa* Küst.\*\*: Piano Pollino, c., VII; Timpa del Demonio, c., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, r., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est; noto di Trentino A. Adige (LUIGIONI, 1929: 700);  
*Isomira marcida* Kiesw.: Piano Toscano, p.c., VI; Vacquarro, r., VI; Timpa del Demonio, c., VI; Fosso Mauro, c., VI;  
*Isomira murina* L.: MAGISTRETTI, 1955 b: 5;  
*Isomira testacea* Seidl.: Anticristo, r., V-VII.

- Megischia curvipes* Brullé: MAGISTRETTI, 1955 b: 5.  
*Megischina armillata* Brullé: MAGISTRETTI, 1955 b: 5.  
*Odontomophlus flavipennis* Küst.\*: Campotenese, 1 ex., VII;  
*Odontomophlus lepturoides* F.: MAGISTRETTI, 1955 b: 5 (sub *Omophlus lepturoides* F.); Acqua Tremola, c., VI; Pantano Grande, r., VI; Valle Malvento, c., VI-VII; Piano Ruggio, c., VI-VII.  
*Omophlus dispar* Costa: MAGISTRETTI, 1955 b: 5;  
*Omophlus picipes* F.: MAGISTRETTI, 1955 b: 5; Valle Malvento, 1 ex., VI;  
*Omophlus rufitarsis* Leske: Piani Ruggio, 1 ex., VI; Fosso Mauro, 1 ex., VI.  
*Podonta italica* Baudi: MAGISTRETTI, 1962: 89; Terranova P., 1 ex., VI.  
*Pseudocistela ceramboides* L.: MAGISTRETTI, 1955 b: 4; Cozzo di Dimoniello, 1 ex., VI.

#### TENEBRIONIDAE

- Alphitobius diaperinus* Panz.: Piano Ruggio, 1 ex., VII, *leg. e coll.* MONTEMURRO.  
*Asida bayardi* Sol.: GRIDELLI, 1956 b: 1; Vacquarro, r., VII; (M).  
*Blaps gibba* Cast.: GRIDELLI, 1956 b: 1; Campotenese, 1 ex., VI;  
*Blaps lethifera* Marsh.: GRIDELLI, 1956 b: 2.  
*Bolitophagus interruptus* Ill.: Duglia, c., V-IX; Canale di Malevento, r., VII; Piano Ruggio, c., V-VIII; Fosso di Mauro, r., VI; Coppo di Paola, pendici sud e nord-est, c., VII;  
*Bolitophagus reticulatus* L.: GRIDELLI, 1956 b: 3; Duglia, c., V-IX; Cugno dell'Acero, r., VI-VII; Colle Gaudolino, r., VI; Vacquarro, c., VI; Valle Malvento, c., VI-VIII.  
*Colpotus strigosus* Costa: GARDINI, 1975 b: 677.  
*Dendarus lugens* Muls.: GRIDELLI, 1956 b: 2;  
*Dendarus dalmatinus* Germ.: CANZONERI, 1977: 242.  
*Diaperis boleti* L.: GRIDELLI, 1956 b: 3; Piano delle Mandre, 1 ex., VII; Cozzo di Dimoniello, 1 ex., VI.  
*Enoplopus dentipes* Rossi: GRIDELLI, 1956 b: 4; Duglia, c., IX; Serra del Prete, pendici nord-est, p.c., VI.  
*Gnathocerus cornutus* F.: Terranova P., 1 ex., VI.  
*Gonocephalum pusillum* F.: Piano Ruggio, c., VII; Pedarreto, r., VII; Anticristo, c., VI-VII.  
*Helops coeruleus* L.: GRIDELLI, 1956 b: 5 (sub *Anteros coeruleus* L.); Duglia, p.c., IX.  
*Hoplocephala haemorrhoidalis* F.: GRIDELLI, 1956 b: 3; Duglia, c., VI-IX; Pedarreto, p.c., VI-VII.

- Hypophloeus bicolor* Ol.: strada Terranova P.-Duglia, r., VI;  
*Hypophloeus fasciatus* F.\*: Acqua Tremola, 1 ex., VI;  
*Hypophloeus unicolor* Piller: Duglia, c., VI-VIII; Cugno Ruggeri, p.c., VI-IX;  
Vacquarro, c., VI-VII; Valle Malvento, p.c., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VI-VII; Anticristo, c., VI.  
*Ipbthimus italicus* Truqui \*: Valle Malvento, 1 ex., VII.  
*Menepbilus cylindricus* Herbst \*: Terranova P., r., VII.  
*Nalassus dryadophilus* Muls.: GRIDELLI, 1956 b: 5; Duglia, c., IX; Pantano Grande, r., VI; Fontana di Rummo, r., VI;  
*Nalassus planipennis* Küst.: Campotenese, r., VII.  
*Neatus noctivagus* Muls.: CANZONERI, 1977: 243.  
*Opatrum sabulosum* L.: Duglia, 1 ex., V, leg. MONTEMURRO;  
*Opatrum verrucosum* Germ.: GRIDELLI, 1956 b: 2; Piano Ruggio, 1 ex., VI.  
*Palorus depressus* F.: Piano Ruggio, c., VI-VII; Coppola di Paola, pendici sud, r., VII.  
*Pedinus meridianus* Muls.: GRIDELLI, 1956 b: 2; Piano Pollino, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VII; Anticristo, c., VI.  
*Scaphidema metallicum* F.: Duglia, c., VIII, leg. DE MARZO; Serra del Prete, pendici nord-est, r., VII.  
*Stenomax lanipes* L.\*: Duglia, p.c., V; Piano delle Mandre, 1 ex., VI.  
*Stenosis brentoides* Rossi: GRIDELLI, 1956 b: 1 (sub *S. intermedia sicula* Sol.).  
*Tenebrio molitor* L.: Campotenese, p.c., VI;  
*Tenebrio obscurus* F.: GRIDELLI, 1956 b: 4.  
*Uloma culinaria* L.: GRIDELLI, 1956 b: 4; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Coppola di Paola, pendici sud, r., VI-VII.

SCARABAEIDAE

- Amphimallon fuscum* Scop.\*: MIKSIC, 1959: 15 (sub *Rhizotrogus fuscus* Scop.); Duglia, 1 ex., VI;  
*Amphimallon solstitiale* L.\*: Anticristo, r., VII.  
*Anoxia scutellaris* Muls.: ALIQUÒ & MASSA, 1976: 154.  
*Anisoplia monticola* ssp. *neapolitana* Reitt.: MIKSIC, 1959: 16; Pedarreto, 1 ex., VI; Campotenese, r., VII;  
*Anisoplia tempestiva* Er.: MIKSIC, 1959: 18.  
*Aphodius beduinus* Reitt.: Valle Malvento, r., VIII;  
*Aphodius borealis* Gyll.: CARPANETO, 1974 b: 39; PIEROTTI, 1977: 188;  
*Aphodius carpelanus* ssp. *siculus* Har.: CARPANETO, 1974 a: 11 (sub *A. siculus* Har.); PIEROTTI, 1977: 178;

- Aphodius conjugatus* Panz.: PIEROTTI, 1977: 188; Duglia, r., IX; Piano Polino, p.c., VIII; Piano Ruggio, 1 ex., IX;
- Aphodius corvinus* Er.: PIEROTTI, 1977: 191; (M);
- Aphodius conspurcatus* L.: PITTINO, 1979: 34; (M);
- Aphodius consputus* Creutz.: Duglia, r., V;
- Aphodius contaminatus* Herbst: PIEROTTI, 1977: 183; Duglia, r., IX; Piano delle Mandre, p.c., IX; Pantano Grande, c., IX;
- Aphodius depressus* Kug.: MARIANI, 1971: 233; (M);
- Aphodius erraticus* L.: MIKSIC, 1959: 8; PIEROTTI, 1977: 174; Colle Gaudolino, r., VI; Piano Ruggio, p.c., VI;
- Aphodius fasciatus* Ol.\*: Anticristo, r., VII;
- Aphodius fimetarius* L.: MIKSIC, 1959: 9; PIEROTTI, 1977: 187; Duglia, c., IX;
- Aphodius foetidus* Herbst: MIKSIC, 1959: 9; PIEROTTI, 1977: 188 (sub *A. scybalarius* F.);
- Aphodius fossor* L.: MIKSIC, 1959: 8; MARIANI, 1971: 230; PIEROTTI, 1977: 175; Piano Ruggio, 1 ex., VII; Anticristo, r., VII;
- Aphodius granarius* L.: MIKSIC, 1959: 19; PIEROTTI, 1977: 192; Duglia, r., VI; Colle Gaudolino, p.c., VI; Serra del Prete, pendici nord-est, r., VI;
- Aphodius haemorrhoidalis* L.: PIEROTTI, 1977: 176; Piano Ruggio, 1 ex., VII;
- Aphodius ictericus* Laich: PIEROTTI, 1977: 189 (sub *A. nitidulus* F.); Colle Gaudolino, r., VII;
- Aphodius immundus* Creutz.: PIEROTTI, 1977: 190; Duglia, 1 ex., VIII, *leg. DE MARZO*;
- Aphodius laticollis* Baudi: MARIANI, 1971: 233;
- Aphodius lugens* Creutz.: CARPANETO, 1974 b: 42; PIEROTTI, 1977: 189;
- Aphodius niger* Panz.: MIKSIC, 1959: 10; PIEROTTI, 1977: 191;
- Aphodius obscurus* F.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 70; MIKSIC, 1959: 9; MARIANI, 1971: 242; PIEROTTI, 1977: 184; Piano Ruggio, r., VI-VII;
- Aphodius porcus* F.: PIEROTTI, 1977: 185;
- Aphodius pusillus* Herbst: PIEROTTI, 1977: 186; Campotenese, 1 ex., IX;
- Aphodius ragusae* Reitt.: PIEROTTI, 1976: 37; 1977: 185; Duglia, 1 ex., IX;
- Aphodius rufipes* L.: MARIANI, 1971: 231; PIEROTTI, 1977: 177; Piano Polino, r., VII; Colle Gaudolino, p.c., VII; Timpa del Demonio, 1 ex., VI;
- Aphodius scybalarius* F.: MIKSIC, 1959: 9; PIEROTTI, 1977: 190 (sub *A. rufus* Moll.); Duglia, c., IX;
- Aphodius schlumbergeri* ssp. *samniticus* J. Dan.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 70 (sub *A. discus* Schmdt.); MIKSIC, 1959: 8 (sub *A. mixtus* Vill.); MARIANI, 1971: 235; PIEROTTI, 1977: 180; (M);

- Aphodius scrutator* Herbst: MIKSIC, 1959: 8; PIEROTTI, 1977: 174; Colle Gaudolino, c., VII; Pedarreto, r., VII;
- Aphodius sphaclatus* Panz.\*: Duglia, 1 ex., V;
- Aphodius sticticus* Panz.: MARIANI, 1971: 241;
- Aphodius sturmi* Har.: Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII;
- Aphodius zenkeri* Germ.: MIKSIC, 1959: 9.
- Caccobius schreberi* L.: MIKSIC, 1959: 5; Terranova P., r., VI-VII; Campotenese, 1 ex., VII.
- Cetonia aurata* ssp. *pisana* Curt.: MIKSIC, 1959: 21; Duglia, p.c., VII; Piano Pollino, r., VII; Colle Gaudolino, p.c., VII; Serra del Prete, pendici ovest, r., VI-VII; Anticristo, c., VI-VII.
- Chironitis furcifer* Rossi: MIKSIC, 1959: 4.
- Copris lunaris* L.: MIKSIC, 1959: 4;
- Copris umbilicatus* Ab.: MIKSIC, 1959: 4; (M).
- Epicometis hirta* Poda: MIKSIC, 1959: 20; Valle Malvento, c., VII; Piano Ruggio, p.c., VI-VII; Anticristo, c., VII.
- Euheptaulacus carinatus* ssp. *brutius* Luig.: MIKSIC, 1959: 10; MARIANI, 1971: 250; Piano Ruggio, r., VII; Anticristo, r., VIII.
- Euoniticellus fulvus* Goeze: MIKSIC, 1959: 4; Piano Ruggio, 1 ex., VII.
- Geotrupes niger* Marsh.: MIKSIC, 1959: 7; Anticristo, 1 ex., VII;
- Geotrupes spiniger* Marsh.: MIKSIC, 1959: 6; Pedarreto, p.c., VI;
- Geotrupes stercorosus* Scriba: MIKSIC, 1959: 7; Valle Malvento, c., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII;
- Geotrupes vernalis* ssp. *apenninicus* Mar.: MARIANI, 1958: 31.
- Gnorimus nobilis* L.: MIKSIC, 1959: 19; Serra del Prete, pendici ovest, r., VII; Piano Ruggio, c., VII; Colle del Dragone, r., VII; Anticristo, m.c., VII.
- Gymnopleurus geoffroyi* Fuessl.: MIKSIC, 1959: 2; (M);
- Gymnopleurus mopsus* Pall.: MIKSIC, 1959: 2;
- Gymnopleurus sturmi* M. Leay: MIKSIC, 1959: 2; Duglia, r., VI.
- Haplidia* sp.?: MIKSIC, 1959: 11.
- Homaloplia marginata* Fuessl.: MIKSIC, 1959: 11;
- Homaloplia nicolasi* Bar.\*: Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, 1 ex., VII; (M).
- Hoplia argentea* Poda: MIKSIC, 1959: 18; Timpa del Demonio, c., VI; Anticristo, r., VI;
- Hoplia minuta* Panz.: Anticristo, 1 ex., VI.
- Mimela junii* n. *calabrica* Machat: MIKSIC, 1959: 15; Anticristo, r., VII.
- Onthophagus amyntas* Ol.: MIKSIC, 1959: 5;
- Onthophagus fracticornis* Preys.: MIKSIC, 1959: 6; MARIANI, 1971: 229;
- Onthophagus furcatus* F.: Duglia, 1 ex., IX; Piano delle Mandre, p.c., VIII;
- Onthophagus grossepunctatus* Reitt.: MIKSIC, 1959: 5;



- Onthophagus illyricus* Scop.: MIKSIC, 1959: 5;  
*Onthophagus joannae* Golj.: BINAGHI & A. A., 1969: 38;  
*Onthophagus lemur* F.: MIKSIC, 1959: 6; Piano delle Mandre, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VII;  
*Onthophagus maki* Ill.: CARPANETO, 1974 b: 46;  
*Onthophagus opacicollis* Reitt.: Terranova P., 1 ex., X; Duglia, r., X;  
*Onthophagus ruficapillus* Brullé: BINAGHI & A. A., 1969: 40;  
*Onthophagus taurus* Schreb.: MIKSIC, 1959: 5; Duglia, r., VI-VII;  
*Onthophagus vacca* L.: MIKSIC, 1959: 6; Piano Ruggio, 1 ex., VII; Colle del Dragone, r., VII; Anticristo, p.c., VII;  
*Onthophagus verticicornis* Laich: MIKSIC, 1959: 6; Anticristo, r., VI.  
*Oryctes nasicornis* v. *laevigatus* Heer: Terranova P., 1 ex., VII.  
*Oxythyrea funesta* Poda: MIKSIC, 1959: 20; Duglia, p.c., VII; Pantano Grande, 1 ex., VII; Pedarreto, c., VII.  
*Pentodon bidens* ssp. *punctatum* Vill.: MIKSIC, 1959: 18 (sub *P. punctatus* Vill.); Campotenese, 1 ex., VII.  
*Pleurophorus caesus* Creutz.: Duglia, c., VIII, *leg.* DE MARZO; Cugno Ruggeri, c., VI-VII.  
*Polyphilla fullo* ssp. *macrocera* Reitt.: MAGRONE & PAPINI, 1966: 38; (M).  
*Protaelia cuprea* F.: MIKSIC, 1959: 21 (sub *Potosia cuprea* F.); Anticristo, p.c., VII;  
*Protaelia morio* F.: MIKSIC, 1959: 22 (sub *Potosia morio* F.); Campotenese, r., VII.  
*Rhizotrogus aestivus* Ol.: MIKSIC, 1959: 14; Colle dell'Impiso, 1 ex., VI;  
*Rhizotrogus marginipes* Muls.: Piano Pollino, 1 ex., VI.  
*Scarabaeus semipunctatus* F.: Coppola di Paola, rif. Rotonda, 1 ex., VI;  
*Scarabaeus typhon* Fish.: MIKSIC, 1959: 1 (sub *S. affinis* Brullé); Campotenese, 1 ex., VII;  
*Scarabaeus variolosus* F.: MIKSIC, 1959: 2; Anticristo, 1 ex., VII.  
*Sisypbus schaefferi* L.: MIKSIC, 1959: 4; Piano Ruggio, r., VII.  
*Trichius fasciatus* L.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 70; MIKSIC, 1959: 19; Duglia, c., VIII; Piano Pollino, r., VIII; Colle Gaudolino, 1 ex., VII; Vacquarro, c., VII; Piano Ruggio, c., VII; Anticristo, c., VII;  
*Trichius sexualis* Bed.: MIKSIC, 1959: 20; (M);  
*Trichius zonatus* Germ.: MIKSIC, 1959: 19; Timpa del Demonio, r., VI-VII; Piano Ruggio, c., VII; Coppola di Paola, pendici nord-est, r., VII; Anticristo, c., VII.  
*Tropinota squalida* Scop.: MIKSIC, 1959: 20.  
*Trox hispidus* Pont.: MIKSIC, 1959: 11.  
*Typhoeus typhoeus* L.: Campotenese, 1 ex., VI.

*Valgus hemipterus* L.: MIKSIC, 1959: 19; Piano Ruggio, r., VI; Anticristo, c., VI-VII.

#### LUCANIDAE

*Dorcus parallelepipedus* L.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 69; MIKSIC, 1959: 22; Cugno Ruggeri, r., VI.

*Lucanus tetraodon* Thunbg.: MIKSIC, 1959: 22; Campotinese, 1 ex., VII.

*Platycerus caprea* Deg.: MIKSIC, 1959: 22;

*Platycerus caraboides* L.: MIKSIC, 1959: 23; Piano Pollino, r., VI; Serra del Prete, pendici nord-est, p.c., VI-VII.

*Sinodendron cylindricum* L.: MIKSIC, 1959: 23; Pantano Grande, p.c., VI-VIII; Vacquarro, c., VI; Valle Malvento, c., VIII; Piano Ruggio, p.c., VI-VIII.

#### CERAMBYCIDAE

*Acanthocinus reticulatus* Razoum: TASSI, 1966 b: 40; Piano Ruggio, 1 ex., VII, leg. MONTEMURRO; (M);

*Acanthocinus xanthonurus* Muls.: TASSI, 1966 b: 42; Piano Ruggio, 1 ex., VII, leg. PARENZAN; Anticristo, p.c., VI.

*Acanthoderes clavipes* Schrank: TASSI, 1966 b: 40; Terranova P., 1 ex., VII.

*Acmaeops collaris* L.: TASSI, 1966 b: 9; Duglia, c., VI; Cugno dell'Acerò, c., VI; Timpa del Demonio, p.c., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI.

*Agapanthia cardui* L.: TASSI, 1966 b: 46; Terranova P., r., VI; Anticristo, p.c., VI; Campotinese, c., VI-VII;

*Agapanthia cynarae* Germ.: TASSI, 1959: 45; Terranova P., 1 ex., VI;

*Agapanthia villosoviridiscens* Deg.: TASSI, 1966 b: 45; Vacquarro, 1 ex., VII; Anticristo, 1 ex., VII;

*Agapanthia violacea* F.: TASSI, 1966 b: 44.

*Anaestetis testacea* F.: TASSI, 1966 b: 38; Campotinese, c., VII.

*Anaglyptus gibbosus* F.: TASSI, 1966 b: 32; Timpa del Demonio, 1 ex., VI; Valle Zaperna, 1 ex., VI;

*Anaglyptus mysticus* L.: TASSI, 1959: 32; Timpa del Demonio, 1 ex., VI.

*Aromia moscata* ssp. *ambrosiaca* Stev.: TASSI, 1966 b: 20.

*Asemum striatum* L.: TASSI, 1966 b: 14.

*Axinopalpis gracilis* Kr.\*\*: Campotinese, 1 ex., VII; noto di Toscana, Romagna e Gargano (LUIGIONI, 1929: 737).

- Brachypteroma ottomanum* Heyd.: TASSI, 1966 b: 19; Pantano Grande, r., VI; Duglia, 1 ex., VI, leg. MONTEMURRO.
- Calamobius filum* Rossi: TASSI, 1966 b: 39; Terranova P., r., VI.
- Callidium aeneum* Deg.: TASSI, 1966 b: 24.
- Cerambix cerdo* L.: TASSI, 1966 b: 16;
- Cerambix scopoli* Füssly: Terranova P., r., VI;
- Cerambix velutinus* Brullé: Terranova P., r., VII.
- Chlorophorus figuratus* Scop.: TASSI, 1966 b: 30; Anticristo, 1 ex., VII;
- Chlorophorus sartor* ssp. *infensus* Plav.: TASSI, 1966 b: 30; Duglia, r., VI-VII; Pantano Grande, p.c., VI-VII; Timpa del Demonio, p.c., VI;
- Chlorophorus trifasciatus* F.: TASSI, 1966 b: 31.
- Clytus arietis* L.: TASSI, 1966 b: 27; Vacquarro, 1 ex., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, c., VI; Fosso Mauro, p.c., VI; Coppola di Paola, rif. Rotonda, p.c., VI; Anticristo, 1 ex., VII;
- Clytus rhamni* ssp. *bellieri* Gautier: TASSI, 1966 b: 27; Campotenese, 1 ex., VI.
- Cortodera aspromontana* Müll.: TASSI, 1966 b: 9; Timpa del Demonio, 1 ex., VI.
- Criocephalus fesus* Muls.: Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VI.
- Deilus fugax* Ol.: TASSI, 1966 b: 20; Terranova P., c., VI; Campotenese, 1 ex., VII.
- Dorcadion etruscum* Rossi: TASSI, 1966 b: 35; Terranova P., 1 ex., VI.
- Dorcatypus tristis* L.: TASSI, 1966 b: 38.
- Ergates faber* Serv.: TASSI, 1972: 386.
- Gracilia minuta* F.: Anticristo, 1 ex., VII; Campotenese, r., VII.
- Grammoptera ruficornis* F.: TASSI, 1966 b: 10; Terranova P., c., VI; Anticristo, p.c., VI; Campotenese, 1 ex., VII;
- Grammoptera ustulata* Schall.: TASSI, 1966 b: 10.
- Hylotrupes bajulus* L.: TASSI, 1966 b: 23; Pantano Grande, 1 ex., VII.
- Judolia erratica* Dalm.: TASSI, 1966 b: 12; Cugno Ruggeri, c., VI; Campotenese, 1 ex., VII.
- Leptura cordigera* Füssly: TASSI, 1966 b: 11; Campotenese, c., VII;
- Leptura dubia* Scop.: TASSI, 1970: 103; (M);
- Leptura fulva* Dej.: TASSI, 1966 b: 11;
- Leptura livida* ssp. *pecta* J. & K. Dan: TASSI, 1966 b: 12; Terranova P., p.c., VI; Pantano Grande, p.c., VI; Timpa del Demonio, p.c., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII; Anticristo, c., VI-VIII; Campotenese, c., VII;
- Leptura rubra* L.\*: Duglia, 1 ex., VII; Anticristo, p.c., VI;
- Leptura sanguinolenta* L.: TASSI, 1972: 387;
- Leptura scutellata* F.: TASSI, 1966 b: 11; Duglia, 1 ex., VII.

- Liopus nebulosus* L.: TASSI, 1966 b: 44; Campotenese, c., VII.
- Molorchus umbellatarum* Schreb.: TASSI, 1966 b: 19.
- Morimus asper* Sulz.: Acqua Tremola, 1 ex., VI; Duglia, p.c., VI-VII; Cugno Ruggeri, r., VII; Fontana di Rummo, p.c., VI-VII; Colle dell'Impiso, r., VII; Vacquarro, c., VI-VII; Valle Malvento, c., VII; Piano Ruggio, c., VI-VII; Coppola di Paola, pendici sud e nord-est, p.c., VI-VIII; Anticristo, c., VII.
- Oberea oculata* L.: TASSI, 1966 b: 46.
- Phymatodes alni* L.: TASSI, 1966 b: 25; Duglia, p.c., VI;
- Phymatodes testaceus* L.: TASSI, 1966 b: 24; Campotenese, p.c., VI-VII.
- Phytoecia coerulea* Scop.: Valle Malvento, r., VI; Fosso Mauro, 1 ex., VI;
- Phytoecia coerulescens* Scop.: TASSI, 1966 b: 47.
- Pidonia lurida* F.\*: Duglia, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO; (M).
- Plagionotus arcuatus* L.: TASSI, 1966 b: 29; Pedarreto, 1 ex., VI; Anticristo, 1 ex., VII;
- Plagionotus scalaris* Brullé: TASSI, 1966 b: 30; Terranova P., r., VI.
- Pogonocherus eugeniae* Ganglb.: TASSI, 1966 b: 38; Piano Ruggio, 1 ex., VIII, *leg.* PARENZAN; (M).
- Prionus coriarius* L.: TASSI, 1966 b: 2; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII; Anticristo, r., VII.
- Purpuricenus kaehleri* L.: TASSI, 1966 b: 33; Terranova P., 1 ex., VI.
- Rhagium bifasciatum* F.: TASSI, 1966 b: 3; Duglia, r., VI-VII; Valle di Malevento, 1 ex., VI;
- Rhagium inquisitor* L.: TASSI, 1966 b: 4; Duglia, c., IX; Valle di Malevento, 1 ex., VI;
- Rhagium mordax* Dej.: TASSI, 1966 b: 3; Piano Pollino, 1 ex., VI; Coppola di Paola, rif. Rotonda, pendici nord-est, r., VII;
- Rhagium sycophanta* Schrank: Piano Pollino, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO.
- Rhannusium graecum* ssp. *italicum* Müll.: TASSI, 1966 b: 4; Duglia, 1 ex., VI, *leg. e coll.* MONTEMURRO; (E).
- Rosalia alpina* L.: TASSI, 1966 b: 21; Cugno Ruggeri, r., VIII; Piano delle Mandre, 1 ex., VIII.
- Stenochorus meridianus* L.: Piano Ruggio, 1 ex., VII, *leg. e coll.* MONTEMURRO.
- Stenopterus ater* L.: TASSI, 1966 b: 18; Acqua Tremola, r., VI; Pantano Grande, 1 ex., VII; Anticristo, r., VI-VII;
- Stenopterus flavicornis* Küst.: TASSI, 1966 b: 18;
- Stenopterus rufus* L.: TASSI, 1966 b: 17; Terranova P., c., VI; Pantano Grande, r., VI; Anticristo, c., VI-VII; Campotenese, r., VII.
- Strangalia aurulenta* F.: TASSI, 1966 b: 13;

- Strangalia bifasciata* Müll.: TASSI, 1966 b: 14; Terranova P., 1 ex., VI; Valle di Malevento, r., VI; Piano Ruggio, r., VI-VIII;
- Strangalia maculata* Poda: Cozzo Dimoniello, r., VII; Anticristo, r., VII;
- Strangalia melanura* L.: TASSI, 1966 b: 13; Duglia, c., VIII; Piano Ruggio, c., VI-VIII; Campotinese, c., VI-VII;
- Strangalia nigra* L.: TASSI, 1966 b: 14; Campotinese, 1 ex., VI.
- Stromatium fulvum* Vill.: TASSI, 1966 b: 16.
- Tetrops praeusta* L.: TASSI, 1966 b: 47.
- Trichoferus cinereus* Vill.: TASSI, 1966 b: 15;
- Trichoferus griseus* F.: TASSI, 1966 b: 15; Piano Ruggio, p.c., VII; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VI.
- Xylotrechus arvicola* Ol.: TASSI, 1966 b: 26; Acqua Tremola, 1 ex., VI;
- Xylotrechus rusticus* L.: TASSI, 1966 b: 26.

#### CHRYSOMELIDAE

- Antipa biguttata* Ol.\*: Duglia, 1 ex., VI; Anticristo, r., VI.
- Cassida prasima* Ill.: Piano Ruggio, p.c., VI; (M);
- Cassida vibex* L.: Vacquarro, r., VII; Fosso Mauro, 1 ex., VII.
- Chilotoma italica* Leoni \*: Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, c., VI; Campotinese, r., VI.
- Chrysolina cerealis* ssp. *mixta* Küst.: MAGISTRETTI & RUFFO, 1960: 156; Piano Pollino, r., VI; (M);
- Chrysolina cribrosa* ssp. *sirentensis* Meier: MAGISTRETTI & RUFFO, 1960: 152 (sub *Chrysomela cribrosa* ssp. *sirentensis* Meier);
- Chrysolina fastuosa* Scop.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 79; MAGISTRETTI & RUFFO, 1960: 163 (sub *Chrysomela fastuosa* Scop.); Piano Pollino, c., VI; Piano Toscano, c., VI; Serra del Prete, pendici nord-est, c., VI-VII; Coppola di Paola, pendici sud, c., VII; Colle del Dragone, c., VII;
- Chrysolina grossa* F.: Duglia, c., VII-IX; Pantano Grande, 1 ex., VIII; Lago Fondo, r., VIII;
- Chrysolina hyperici* Först.: Duglia, 1 ex., VII;
- Chrysolina lurida* L.: MAGISTRETTI & RUFFO, 1960: 158 (sub *Chrysomela lurida* L.); (M);
- Chrysolina lutea* Pet.: MAGISTRETTI & RUFFO, 1960: 160 (sub *Chrysomela lutea* Pet.); Terranova P., r., VI;
- Chrysolina rossia* Ill.: Acqua Tremola, p.c., VII;

- Chrysolina vernalis* ssp. *italica* Weise: MAGISTRETTI & RUFFO, 1960: 156 (sub *Chrysomela vernalis italica* Weise); Pantano Grande, 1 ex., VI.
- Chrysomela populi* L.: Duglia, c., VIII; Campotinese, c., VI-VII.
- Clytra laeviuscula* Ratzb.\*: Anticristo, 1 ex., VII; (M);
- Clytra quadripunctata* ssp. *appendicina* Lac.: Duglia, r., VI, leg. MONTEMURRO.
- Coptocephala unifasciata* Scop.: Piano Pollino, r., VI; Piano Toscano, c., VI-VII; Vacquarro, r., VI.
- Crioceris duodecimpunctata* L.: RUFFO, 1964 a: 80; Campotinese, r., VII;
- Crioceris macilenta* Rossi: RUFFO, 1964 a: 85;
- Crioceris paracenthensis* L.: RUFFO, 1964 a: 78; Terranova P., r., VI; Campotinese, 1 ex., VII.
- Cryptocephalus aureolus* Suffr.: BURLINI, 1955: 101; Piano Toscano, 1 ex., VII;
- Cryptocephalus connexus* Ol.\*: Vacquarro, r., VI;
- Cryptocephalus czwalinae* Weise: BURLINI, 1955: 190;
- Cryptocephalus flavipes* F.: BURLINI, 1955: 170; Timpa del Demonio, c., VI; Valle Malvento, r., VI;
- Cryptocephalus fulvus* Goeze: BURLINI, 1955: 210; Valle Malvento, c., VI-VII; Piano Ruggio, c., VII; Anticristo, c., VII;
- Cryptocephalus hypochoeridis* ssp. *falzonii* Burl.: BURLINI, 1955: 108; molto comune ovunque, V-VII;
- Cryptocephalus ilicis* Ol.: BURLINI, 1955: 74; Anticristo, r., VII;
- Cryptocephalus imperialis* Laich.: BURLINI, 1955: 80; (M);
- Cryptocephalus labiatus* L.: Acqua Tremola, r., VI; Duglia, 1 ex., VI; Pantano Grande, p.c., VI;
- Cryptocephalus leonhardi* Breit.: Piano Pollino, c., VI; Vacquarro, c., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, r., VI-VII; Fosso Mauro, r., VII; Anticristo, c., VI;
- Cryptocephalus macellus* Suffr.: BURLINI, 1955: 223;
- Cryptocephalus marginatus* F.: BURLINI, 1955: 138;
- Cryptocephalus moraei* L.: Piano Ruggio, 1 ex., VI, leg. MONTEMURRO;
- Cryptocephalus nitidus* L.: BURLINI, 1955: 127; Duglia, 1 ex., VI;
- Cryptocephalus ocellatus* Drap.: Fontana Rummo, 1 ex., VI; Vacquarro, c., VI; Colle dell'Impiso, p.c., VI-VII;
- Cryptocephalus rugicollis* Ol.: BURLINI, 1955: 96; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, c., VI;
- Cryptocephalus scapularis* Suffr.: BURLINI, 1955: 194; Piano Ruggio, c., VII; Coppola di Paola, pendici sud, r., VII;
- Cryptocephalus sericeus* ssp. *zambanellus* Mars.: Piano Ruggio, r., VI; Coppola di Paola, pendici sud, p.c., VI;

- Cryptocephalus tricolor* Rossi: BURLINI, 1955: 39; Timpa del Demonio, c., VI;
- Cryptocephalus trimaculatus* Rossi: BURLINI, 1955: 81; Terranova P., 1 ex., VII;
- Cryptocephalus vittula* Suffr.: FOCARILE, 1978: 59.
- Donacia simplex* F.: Fosso Mauro, r., VII; (M).
- Exosoma lusitanicum* L.: Terranova P., c., VI; Timpa del Demonio, r., VI; Pedarreto, c., VI-VIII; Anticristo, p.c., VI-VII; Campotenese, r., VI-VII.
- Galeruca tanacetii* L.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 80; Acqua Tremola, 1 ex., VII; Piano Ruggio, r., VI-VII; Anticristo, 1 ex., VII; Campotenese, r., VI-VII.
- Galerucella luteola* Müll.: Valle Malvento, c. VI; Fosso Mauro, r., VI;
- Galerucella solaris* Burl.\*: Duglia, c., VIII; Vacquarro, c., VII; Valle Malvento, c., VI; Fosso Mauro, r., VI.
- Gastrophysa polygoni* L.: Campotenese, p.c., VI-VII.
- Hypocassida subferruginea* Schrnk.: Cozzo di Dimoniello, 1 ex., VI.
- Labidostomis longimana* L.: REGALIN, 1980: 42; Campotenese, 1 ex., VII; Piano Ruggio, 1 ex., VI, leg. MONTEMURRO;
- Labidostomis pallidipennis* Gebl.: REGALIN, 1980: 45;
- Labidostomis taxicornis* F.: REGALIN, 1980: 40; Terranova P., c., VI.
- Lachnaea italica* Weise: Timpa del Demonio, r., VI; Cozzo Dimoniello, r., VII; Campotenese, c., VII.
- Lema melanopa* L.: RUFFO, 1964 a: 77; Timpa del Demonio, c., VI; Valle Zaperna, 1 ex., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, c., VII.
- Liliocercis lilii* Scop.: Campotenese, r., VII.
- Lochmaea crataegi* Först.: Acqua Tremola, c., VI; Vacquarro, c., VI; Timpa del Demonio, r., VI; Piano Ruggio, r., VI.
- Luperus biraghii* Rag.: FOGATO, 1978: 58;
- Luperus leonardii* Fog.: FOGATO, 1978: 46.
- Macrolenes dentipes* Ol.: Campotenese, c., VII.
- Oreina cacaliae* ssp. *magistrettii* Schatzm.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 80 (sub *Chrysomela cacaliae* var. *senecionis* Schum.); MAGISTRETTI & RUFFO, 1960: 165 (sub *Chrysochloa cacaliae* ssp. *magistrettii* Schatzm.); Piano Pollino, c., VI; Piano Toscano, r., VI; Fontana Rummo, c., VI-VII; Serra del Prete, pendici nord-est e ovest, c., VI-VII; Vacquarro, p.c., VI-VII; Valloncello di Viggianello, r., VII; Timpa del Demonio, 1 ex., VI; Valle Malvento, c., VI-VII; Piano Ruggio, p.c., VI; Anticristo, 1 ex., VI; (M);
- Oreina marsicana* Luig.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 79 (sub *Chrysomela gloriosa* F.); MAGISTRETTI & RUFFO, 1960: 164 (sub *Chrysochloa*

- marsicana* Luig.); Fontana Rummo, r., VI-VII; Vallone della Caballa, r., VII; (M).
- Orsodacne lineola* Panz.: Cozzo di Visitone, 1 ex., VI; Anticristo, r., VII.
- Pachybrachis exclusus* ssp. *etruscus* Weise: BURLINI, 1968: 72; Duglia, c., VI-VII; Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI;
- Pachybrachis fimbriolatus* Suffr.: BURLINI, 1968: 92; (M);
- Pachybrachis ruffoi* Burl.: BURLINI, 1956: 4; Duglia, 1 ex., VII;
- Pachybrachis salfi* Burl.: BURLINI, 1956: 1; (M).
- Phaedon cochleariae* F.: Campotinese, c., VI.
- Phratora vitellinae* L.\*: Acqua Tremola, r., VI; Duglia, c., VI-VIII; Lago Fondo, r., VI; Fontana Rummo, p.c., VI; Vacquarro, c., VI-VII; Piano Zaperna, p.c., VI-VII; Vallone della Caballa, r., VI; (M);
- Phratora laticollis* Suffr.\*: Duglia, r., VI; Vallone della Caballa, 1 ex., VI; Campotinese, c., VI-VII.
- Plagiodera versicolora* Laich.: Vacquarro, c., VI; Timpa del Demonio, c., VII; Piano Ruggio, r., VII.
- Sclerophaedon orbicularis* Suffr.\*: Vallone Zaperna, r., VII; Piano Ruggio, c., VI; Fosso Mauro, c., VI.
- Smaragdina affinis* Hellow: Duglia, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO;
- Smaragdina aurita* L.\*: Campotinese, r., VII;
- Smaragdina concolor* F.\*: Serra delle Ciavole, pendici sud-est, c., VI; Piano Toscano, r., VI; Timpa del Demonio, c., VI; Canale Malvento, c., VI; Piano Ruggio, r., VI; Fosso Mauro, p.c., VI; Anticristo, r., VI;
- Smaragdina cyanea* F.: Piano Ruggio, r., VI; Fosso Mauro, r., VI.
- Timarcha pimelioides* H.S.: Coppola di Paola, rif. Rotonda, 1 ex., VI;
- Timarcha tenebricosa* ssp. *nicaensis* Villa: MINELLI & VITTORELLI, 1976: 1-33; Duglia, 1 ex., VII.
- Altica oleracea* L.: Terranova P., r., V.
- Aphthona carbonaria* Rosenh.: Terranova P., r., VI-VII;
- Aphthona euphorbiae* Schrnk.: Anticristo, r., VI; Campotinese, r., VI;
- Aphthona nigriceps* Redtb.: Terranova P., 1 ex., VI;
- Aphthona venustula* Kutsch.: Piano Ruggio, 1 ex., VI.
- Argopus abrensi* Germ.: RUFFO, 1964 b: 102; (M).
- Chaetocnema hortensis* Geoffr.: Vallone Zaperna, c., VI; Fosso Mauro, p.c., VI;
- Chaetocnema tibialis* Ill.: Fontana Rummo, 1 ex., VII; Vacquarro, 1 ex., VI.
- Chalcoides aurata* Marsh.: strada Terranova P.-Duglia, r., VI-VII; Acqua Tremola, 1 ex., VI;
- Chalcoides aurea* Geoffr.: Duglia, 1 ex., VII.
- Crepidodera brevicollis* Dan.: Duglia, 1 ex., VI;



- Crepidodera ferruginea* Scop.: Fosso Mauro, p.c., VI;  
*Crepidodera transversa* Marsh.\*: Campotenesse, r., VI-VII; (M).  
*Dibolia cryptocephala* Koch: Duglia, r., VIII; (M).  
*Epithrix atropae* Foudr.\*: Piano Ruggio, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO; (M).  
*Longitarsus exoletus* L.: Valle Malvento, 1 ex., VI;  
*Longitarsus luridus* Scop.: Terranova P., p.c., V-VII;  
*Longitarsus nervosus* Woll.\*: Valle Malvento, 1 ex., VI;  
*Longitarsus parvulus* Payk.: Anticristo, c., VI; Campotenesse, c., VI;  
*Longitarsus pellucidus* Foudr.: Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI;  
*Longitarsus suturalis* Marsh.: Timpa del Demonio, c., VI; Piano Ruggio, c., VI;  
*Longitarsus suturellus* Duf.: Vacquarro, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO.  
*Ochrosia ventralis* Ill.: Piano Pollino, 1 ex., VII; Colle dell'Impiso, c., VI; Vacquarro, c., VI; Vallone Zaperna, p.c., VI; Valle Malvento, c., VI; Vallone dell'a Caballa, r., VI.  
*Phyllotreta nigripes* F.: Duglia, 1 ex., IX; Vallone e Piano Zaperna, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI.  
*Podagrica malvae* Ill.: Duglia, p.c., VI-VII.  
*Psylliodes chalcomera* Ill.: LEONARDI, 1975: 64; Terranova P., r., VII;  
*Psylliodes crysocephala* var. *collaris* Weise: LEONARDI, 1975: 57;  
*Psylliodes cuprea* Koch: LEONARDI, 1971: 532; 1975: 54; Anticristo, r., VII;  
*Psylliodes instabilis* Foudr.: Vacquarro, 1 ex., VI;  
*Psylliodes kiesenwetteri* Kütseh.: LEONARDI, 1975: 77; Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VII;  
*Psylliodes luteola* Müll.: LEONARDI, 1972: 145; 1975: 68;  
*Psylliodes napi* F.: LEONARDI, 1975: 52; Duglia, 1 ex., VII;  
*Psylliodes obsкуроaenea* Rosh.: LEONARDI, 1975: 68;  
*Psylliodes picina* ssp. *laevifrons* Kütseh.: LEONARDI, 1975: 67;  
*Psylliodes ruffoi* Leon.: LEONARDI, 1975: 77; Campotenesse, 1 ex., VI.  
*Sphaeroderma rubidum* Graells.: RUFFO, 1964 b: 97.

#### BRUCHIDAE

- Bruchidius canus* Gyll.: ZAMPETTI, 1982: 398; Piano Ruggio, 1 ex., V;  
*Bruchidius cisti* F.: Campotenesse, r., VII;  
*Bruchidius foveolatus* Gyll.: Vacquarro, c., VI-VII; Piano Ruggio, r., VI;  
*Bruchidius gilvus* Gyll.\*: Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Vallone della Caballa, c., VII;

- Bruchidius marginalis* F.\*: Duglia, 1 ex., VI; (M);  
*Bruchidius meleagrinus* Gené: Campotinese, r., VI;  
*Bruchidius murinus* Boh.: Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, r., VI;  
*Bruchidius nanus* Germ.: Fontana Rummo, c., VI; Madonna di Pollino, 1 ex., VI; Vacquarro, c., VI;  
• *Bruchidius pygmaeus* Boh.\*\*: Anticristo, c., VI; Campotinese, r., VII; noto di I. Ustica e Malta (LUIGIONI, 1929: 848);  
*Bruchidius seminarius* L.: Anticristo, c., VII; Campotinese, c., VI;  
*Bruchidius sericatus* Germ.: Acqua Tremola, c., VI; Duglia, 1 ex., VI;  
*Bruchidius tarsalis* Gyll.\*: Vallone di Zaperna, 1 ex., VI; Cozzo di Dimoniello, 1 ex., VI; noto di Liguria, Piemonte, Lazio e Sardegna (LUIGIONI, 1929: 847).  
*Bruchus brachialis* F.: Campotinese, r., VII;  
*Bruchus loti* Payk.\*: Piano Ruggio, 1 ex., VI;  
*Bruchus rufimanus* Boh.: Piano Ruggio, r., VII; Coppola di Paola, pendici nord-est, r., VII;  
*Bruchus rufipes* Herbst: strada Terranova P.-Duglia, r., VI; Anticristo, 1 ex., VI.  
*Spermophagus sericeus* Geoffr.: Duglia, 1 ex., VIII, *leg.* DE MARZO; Valle Malvento, r., VIII.

#### ANTHRIBIDAE

- Anthribus albinus* L.: GOBBI, 1973: 39; Duglia, 1 ex., VIII; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII.  
*Brachytarsus fasciatus* Först.\*: Campotinese, 1 ex., VII.  
*Phaenotherion fasciculatum* Reitt.: GOBBI, 1973: 39; Cugno Ruggeri, r., VII.  
*Platyrhinus resinusus* Scop.: GOBBI, 1973: 39; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII.  
*Tropideres niveirostris* F.\*: Duglia, 1 ex., VIII, *leg.* DE MARZO.

#### SCOLYTIDAE

- Crypturgus pusillus* Gyll.: MASUTTI, 1968: 218; (M).  
*Enoporus fagi* F.\*\*: Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI, *leg.* MONTEMURRO; App. Ligure, Piemonte, Alpi Venete, App. Emiliano, App. Toscano, App. Romano (LUIGIONI, 1929: 997).  
*Hylastes angustatus* Herbst\*: Piano Ruggio, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO.  
*Ips acuminatus* Gyll.: MASUTTI, 1968: 218; (M);  
*Ips sexdentatus* Börner: MASUTTI, 1968: 217; Cugno Ruggeri, r., VII.

- Orthotomicus laricis* F.: Coppola di Paola, pendici nord-est, rif. Rotonda, 1 ex., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI;  
*Orthotomicus suturalis* Gyll.\*\*: Duglia, p.c., IX; Piemonte, Lombardia, Trentino A. Adige, Toscana (LUIGIONI, 1929: 1002); (M).  
*Pityogenes bidentatus* Herbst: MASUTTI, 1968: 218;  
*Pityogenes bistridentatus* Eichh.: MASUTTI, 1968: 218;  
*Pityogenes trepanatus* Nördl.: MASUTTI, 1968: 218.  
*Pityokteines curvidens* Germ.\*\*: Duglia, 1 ex., IX; noto di Piemonte, Toscana (LUIGIONI, 1929: 1001); (M).  
*Pityophthorus lichtensteini* Ratzb.: MASUTTI, 1968: 218; (M).  
*Polygraphus grandiclava* Thoms.\*\*: Piano Pollino, c., VI, leg. MONTEMURRO; Trentino A. Adige (LUIGIONI, 1929: 995); (M).  
*Scolytus rugulosus* Müll.\*: Terranova P., 1 ex., VII.  
*Taphrorynchus bicolor* Herbst: GOBBI, 1973: 40; Duglia, m.c., V-IX; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, c., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VI; Anticristo, c., VI-VII.  
*Trypodendron lineatum* Ol.: GOBBI, 1973: 40; (M).  
*Xyleborus monographus* F.: Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VII.  
*Xylocleptes bispinus* Duft.: Piano Ruggio, r., VII, leg. MONTEMURRO.  
*Xyloterus domesticus* L.\*: Duglia, r., IX; Piano Ruggio, r., VII;  
*Xyloterus signatus* F.\*: Duglia, c., V-IX.

#### NEMONYCHIDAE

- Nemonyx lepturoides* F.\*: Campotinese, 1 ex., VI, leg. COLONNELLI (COLONNELLI i.l.); Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio (LUIGIONI, 1929: 989); (M).

#### ATTELABIDAE

- Apoderus coryli* L.: MAGNANO, 1957: 4; Duglia, r., VI.  
*Attelabus nitens* Scop.: MAGNANO, 1957: 4; Campotinese, 1 ex., VI.

#### RHYNCHITIDAE

- Auletobius politus* Serv.: MAGNANO, 1957: 2.  
*Byctiscus betulae* L.: COLONNELLI, 1974: 118; Piano delle Mandre, r., VI; Anticristo, p.c., VI;

- Byctiscus populi* L.: COLONNELLI, 1974: 119.  
*Coenorrhinus aequatus* L.: MAGNANO, 1957: 3; COLONNELLI, 1974: 118; Val-  
lone Zaperna, r., VI; Valle della Caballa, p.c., VI-VII;  
*Coenorrhinus pauxillus* Germ.: MAGNANO, 1957: 3; COLONNELLI, 1974: 118;  
Timpa del Demonio, 1 ex., VI.  
*Deporaus seminiger* Reitt.: MAGNANO, 1957: 4 (sub *Conostropheus tristis* F.);  
COLONNELLI, 1974: 119; Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI.  
*Involulus coeruleus* Deg.: MAGNANO, 1957: 3; COLONNELLI, 1974: 118.  
*Lasiorhynchites praeustus* Boh.: COLONNELLI, 1974: 117; Terranova P., r., VI;  
Anticristo, 1 ex., VI;  
*Lasiorhynchites sericeus* Herbst: MAGNANO, 1957: 2.  
*Pselaphorynchites nanus* Payk.: MAGNANO, 1957: 2;  
*Pselaphorynchites tomentosus* Gyll.: COLONNELLI, 1974: 117; Vacquarro, r.,  
VI; Valle della Caballa, r., VI.  
*Pseudocoenorrhinus germanicus* Herbst: MAGNANO, 1957: 2; COLONNELLI, 1974:  
117; Piano Ruggio, 1 ex., VI, leg. MONTEMURRO;  
*Pseudocoenorrhinus interpunctatus* Steph.: MAGNANO, 1957: 3.  
*Rhynchites bacchus* L.: MAGNANO, 1957: 3; COLONNELLI, 1974: 118; Piano  
Toscano, r., VI;  
*Rhynchites versicolor* Costa: Campotenese, 1 ex., VII.

APIONIDAE

- Apion aeneum* F.: MAGNANO, 1957: 6; COLONNELLI, 1957: 120; Coppola di  
Paola, pendici nord-est, p.c., VI;  
*Apion aethiops* Herbst: MAGNANO, 1957: 10;  
*Apion alcyoneum* Germ.\*\*: Piano Ruggio, 1 ex., VI; Duglia, 1 ex., VI, leg.  
COLONNELLI (COLONNELLI i.l.); citato di Sicilia da LUIGIONI (1929: 978);  
COLONNELLI (i.l.) lo ha reperito anche nel Veneto (Cadore, Pelos [BL],  
VIII.1972);  
*Apion antennale* Desbr.: MAGNANO, 1957: 11;  
*Apion apricans* Herbst: MAGNANO, 1957: 14; Valle Malvento, p.c., VI; Cozzo  
di Visitone, r., VI;  
*Apion assimile* Kirby: MAGNANO, 1957: 15;  
*Apion astragali* Payk.: COLONNELLI, 1974: 127; Cugno Ruggeri, r., VII; Pan-  
tano Grande, p.c., VI;  
*Apion atomarium* Kirby: COLONNELLI, 1974: 122 (sub *A. vicinum* Kirby);  
*Apion brevirostre* Gyll.: MAGNANO, 1957: 4; COLONNELLI, 1974: 119; Duglia,  
r., VII; Valle della Caballa, 1 ex., VI;  
*Apion carduorum* Kirby: MAGNANO, 1957: 9; COLONNELLI, 1974: 123; Piano

- Ruggio, p.c., VI; Valle della Caballa, 1 ex., VI; Colle del Dragone, c., VI-VII;
- Apion cerdo* Gerst.: COLONNELLI, 1974: 126;
- Apion cognatum* Hochh.\*: Vacquarro, p.c., VIII, *leg.* COLONNELLI (COLONNELLI i.l.);
- Apion cracca* L.: COLONNELLI, 1974: 126;
- Apion cruentatum* Waltl.\*: Duglia, p.c., VII;
- Apion curtirostre* Germ.: MAGNANO, 1957: 5; COLONNELLI, 1974: 120; Duglia, r., VI; Piano delle Mandre, 1 ex., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, p.c., VI-VII;
- Apion damryi* Desbr.: COLONNELLI, 1974: 123; (M);
- Apion dentipes* Gerst.: MAGNANO, 1957: 15; Colle Gaudolino, 1 ex., VI;
- Apion dichroum* Bed.: MAGNANO, 1957: 13; COLONNELLI, 1974: 127 (sub *flavipes* Payk.); Duglia, 1 ex., VIII; Piano delle Mandre, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VII; Valle della Caballa, 1 ex., VI;
- Apion dispar* Germ.: Terranova P., c., VI; Acqua Tremola, r., VI;
- Apion dissimile* Germ.: MAGNANO, 1957: 15; Campotense, 1 ex., VII;
- Apion elegantulum* Germ.: COLONNELLI, 1974: 127;
- Apion elongatum* Desbr.: COLONNELLI, 1974: 121; (M);
- Apion ervi* Kirby: COLONNELLI, 1974: 126;
- Apion facetum* Gyll.: Duglia, 1 ex., VI, *leg.* COLONNELLI (COLONNELLI i.l.);
- Apion fallens* Desbr.: COLONNELLI, 1974: 123;
- Apion filicorne* Wenck.: MAGNANO, 1957: 11; Valle Malvento, 1 ex., VIII;
- Apion flavifemoratum* Herbst: MAGNANO, 1957: 10; COLONNELLI, 1957: 124; Duglia, 1 ex., V; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, p.c., VI;
- Apion formaneki* Wagn.: COLONNELLI, 1974: 121; (M);
- Apion foveatoscutellatum* Wagn.: MAGNANO, 1957: 6;
- Apion fuscirostre* F.: COLONNELLI, 1974: 121;
- Apion gavoyi* Desbr.: COLONNELLI, 1974: 125; (M);
- Apion gracicolle* Gyll.: COLONNELLI, 1974: 124; Duglia, r., VI-VII;
- Apion gyllenbali* Kirby: MAGNANO, 1957: 10; COLONNELLI, 1974: 124; Duglia, 1 ex., VI; Piano Pollino, r., VI-VII;
- Apion haematodes* Kirby: MAGNANO, 1957: 7 (sub *frumentarium* Payk.); Campotense, c., VII;
- Apion hydrolapathi* Marsh.: MAGNANO, 1957: 5; Piano Pollino, r., VI;
- Apion ilvense* Wagn.: Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, c., VI-VII;
- Apion immune* Kirby: MAGNANO, 1957: 10; COLONNELLI, 1974: 124; Vacquarro, r., VI-VII;
- Apion interjectum* Desbr.: MAGNANO, 1957: 14; COLONNELLI, 1974: 128; Valle Malvento, r., VI; Anticristo, r., VII;

- Apion juniperi* Boh.: MAGNANO, 1957: 11; (M);  
*Apion laevicolle* Kirby: MAGNANO, 1957: 14;  
*Apion leucopheatum* Wenck.: MAGNANO, 1957: 7;  
*Apion loti* Kirby: Cugno Ruggeri, r., VI; Vacquarro, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, r., VI;  
*Apion malvae* F.: MAGNANO, 1957: 5; Anticristo, r., VI;  
*Apion melancholicum* Wenck.: COLONNELLI, 1974: 126;  
*Apion minimum* Herbst: MAGNANO, 1957: 7; COLONNELLI, 1974: 121; Duglia, 1 ex., VIII; Valle Malvento, p.c., VI;  
*Apion nigritarse* Kirby: MAGNANO, 1957: 13; COLONNELLI, 1974: 127; Piano delle Mandre, p.c., VI; Cozzo di Visitone, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI; Colle del Dragone, 1 ex., VII;  
*Apion ochropus* Germ.: COLONNELLI, 1974: 126; Piano Ruggio, 1 ex., VI;  
*Apion ononicola* Bach.: Terranova P., 1 ex., VI;  
*Apion ononis* Kirby: MAGNANO, 1957: 12;  
*Apion onopordi* Kirby: MAGNANO, 1957: 8; COLONNELLI, 1974: 123;  
*Apion opeticum* Bach.: MAGNANO, 1957: 12; (M);  
*Apion penetrans* Germ.: MAGNANO, 1957: 9;  
*Apion perraudieri* ssp. *falzonii* Schatzm.: MAGNANO, 1957: 9; Duglia, r., VI, leg. MONTEMURRO; Vacquarro, r., VI, leg. SACCO (COLONNELLI i.l.);  
*Apion pisi* F.: MAGNANO, 1957: 10; COLONNELLI, 1974: 124; Piano Toscano, r., VI; Timpa del Demonio, 1 ex., VI; Vacquarro, r., VI; Colle del Dragone, r., VI-VII; Anticristo, p.c., VI-VII;  
*Apion pomonae* F.: MAGNANO, 1957: 13; COLONNELLI, 1974: 126; Acqua Tremola, 1 ex., VI;  
*Apion pseudocerdo* Dieckm.: Duglia, 2 exx., VI, leg. COLONNELLI (COLONNELLI i.l.);  
*Apion pubescens* Kirby: Piano Ruggio, 1 ex., VII;  
*Apion punctigerum* Payk.: Piano Ruggio, 1 ex., VI;  
*Apion radiolus* Kirby: MAGNANO, 1957: 6; COLONNELLI, 1974: 120;  
*Apion reflexum* Gyll.: MAGNANO, 1957: 11; Valle Malvento, 1 ex., VI;  
*Apion ruficroides* Schatzm.: Fontana Rummo, r., VI; Fosso Mauro, r., VI-VII; Anticristo, c., VI;  
*Apion rufirostre* F.: MAGNANO, 1957: 5; Campotense, p.c., VI-VII;  
*Apion schoenherri* Boh.\*: Cugno Ruggeri, 1 ex., VII;  
*Apion semivittatum* Gyll.: MAGNANO, 1957: 7; COLONNELLI, 1974: 121;  
*Apion seniculum* Kirby: MAGNANO, 1957: 8; COLONNELLI, 1974: 122; Duglia, 1 ex., IX; Pantano Grande, r., VI; Piano Pollino, 1 ex., VI; Colle del Dragone, r., VI-VIII; Anticristo, 1 ex., VII;

- Apion seriatosetosulum* Wenck.: MAGNANO, 1957: 8; COLONNELLI, 1974: 122;  
*Apion simum* Germ.: COLONNELLI, 1974: 120;  
*Apion spencei* Kirby: MAGNANO, 1957: 11;  
*Apion stolidum* Germ.: MAGNANO, 1957: 8; Campotinese, 1 ex., VII; (M);  
*Apion tenue* Kirby: MAGNANO, 1957: 9; Acqua Tremola, 1 ex., VI; Campotinese, r., VI;  
*Apion trifolii* L.: MAGNANO, 1957: 14; COLONNELLI, 1974: 128 (sub *A. aestivum* Germ., COLONNELLI i.l.); Anticristo, r., VII; Campotinese, c., VII;  
*Apion urticarium* Herbst: MAGNANO, 1957: 7; COLONNELLI, 1974: 122;  
*Apion viciae* Payk.: MAGNANO, 1957: 12; COLONNELLI, 1974: 125; Valle Malvento, r., VI;  
*Apion violaceum* Kirby: COLONNELLI, 1974: 119; Piano Pollino, 1 ex., VII; Piano Toscano, r., VI; Colle Gaudolino, 1 ex., VI; Campotinese, c., VII;  
*Apion virens* Herbst: MAGNANO, 1957: 13; COLONNELLI, 1974: 127; Duglia, 1 ex., VIII;  
*Apion vorax* Herbst: MAGNANO, 1957: 12; COLONNELLI, 1974: 125; Duglia, r., VII; Piano delle Mandre, 1 ex., VI.  
*Nanophyes nitidulus* Gyll.: Terranova P., r., VI.

#### CURCULIONIDAE

- Acalles aubei* Boh.: COLONNELLI, 1974: 163;  
*Acalles camelus* F.: COLONNELLI, 1974: 164; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VI;  
*Acalles fausti* Meyer \*: Cugno dell'Acero, VI, leg. COLONNELLI; Vacquarro, VIII, leg. COLONNELLI (COLONNELLI i.l.); Emilia, Abruzzo, Lazio, Campania (LUIGIONI, 1929: 925); (M);  
*Acalles lemur* Germ.: COLONNELLI, 1974: 165; Duglia, 1 ex., VIII;  
*Acalles luigionii* Sol.: COLONNELLI, 1974: 163; Coppola di Paola, rif. Rotonda, pendici nord-est, 1 ex., VI; Vacquarro, r., VI; (M);  
*Acalles parvulus* Boh.: COLONNELLI, 1974: 165; (M);  
*Acalles saccoi* Col.: COLONNELLI, 1972: 25-30; COLONNELLI, 1974: 163; Piano Ruggio, 1 ex., VII, leg. MONTEMURRO; (E).  
*Acallocrates minutesquamosus* Reiche: COLONNELLI, 1974: 165 (sub *Acalles denticollis* Germ.); 1980: 12; Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VII.  
*Amalus haemorrhous* Herbst: MAGNANO, 1957: 49; (M);  
*Anthonomus chevrolati* Desbr.: MAGNANO, 1957: 42; (M);  
*Anthonomus kirschi* Desbr.: COLONNELLI, 1974: 154; (M);

- Anthonomus pedicularius* L.: MAGNANO, 1957: 42; COLONNELLI, 1974: 154; Valle della Caballa, r., VI;
- Anthonomus pomorum* L.: COLONNELLI, 1974: 155; strada Terranova P.-Duglia, 1 ex., VI;
- Anthonomus rubi* Herbst: MAGNANO, 1957: 42; COLONNELLI, 1974: 155; Fontana Rummo, r., VI; Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII.
- Argoptochus schwarzi* Reitt.: MAGNANO, 1957: 25; COLONNELLI, 1974: 136; Piano Ruggio, r., VI.
- Auchmerestes kiesenwetteri* Kraatz: MAGNANO, 1957: 38; COLONNELLI, 1974: 146.
- Baris kaufmanni* Reitt.: COLONNELLI, 1974: 166; Duglia, 1 ex., IX; (M);
- Baris timida* Rossi: MAGNANO, 1957: 45; Campotinese, r., VI-VII.
- Barynotus obscurus* F.: MAGNANO, 1957: 30; COLONNELLI, 1974: 141; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Colle del Dragone, r., VI;
- Barynotus solarii* Main.: MAGNANO, 1957: 30; COLONNELLI, 1974: 141; (M).
- Brachytemnus porcatus* Germ.: COLONNELLI, 1974: 149.
- Bradybatus creutzeri* Germ.: Campotinese, r., VI, su Acero, leg. COLONNELLI (COLONNELLI i.l.).
- Calosirus terminatus* Herbst: MAGNANO, 1957: 47.
- Camptorrhynchus statua* Rossi: COLONNELLI, 1974: 162; Terranova P., r., VI.
- Ceutorhynchus atomus* Boh.: COLONNELLI, 1974: 170; Valle Malvento, 1 ex., VI;
- Ceutorhynchus angustus* Dieckm. & Smrezc.\*\*\*: Serra delle Ciavole, VI, leg. e coll. COLONNELLI (COLONNELLI i.l.); specie nuova per la fauna d'Italia, nota di varie nazioni europee e Anatolia; COLONNELLI (i.l.) per l'Italia la conosce anche di Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Abruzzo; (M);
- Ceutorhynchus barbareae* Suffr.: MAGNANO, 1957: 48; COLONNELLI, 1974: 171; (M);
- Ceutorhynchus chalybaeus* Germ.: MAGNANO, 1957: 49 (sub *C. timidus* Weise); COLONNELLI, 1974: 171; Anticristo, 1 ex., VI;
- Ceutorhynchus consputus* Germ.: COLONNELLI, 1974: 169;
- Ceutorhynchus contractus* Marsh.: MAGNANO, 1957: 49; Acqua Tremola, r., VI; Piano Toscano, 1 ex., VII; Colle Gaudolino, r., VII;
- Ceutorhynchus distinctus* Bris.: MAGNANO, 1957: 48 (sub *C. marginatus* Payk.);
- Ceutorhynchus duvali* Bris.: MAGNANO, 1957: 48; COLONNELLI, 1974: 170; Valle di Malevento, 1 ex., VII;
- Ceutorhynchus erysimi* F.: MAGNANO, 1957: 48; Piano Ruggio, p.c., VI; Coppola di Paola, pendici sud, r., VII;
- Ceutorhynchus fallax* Boh.: Cugno Acero, 1 ex., VII, leg. COLONNELLI (COLONNELLI i.l.);



- Ceutorhynchus floralis* Payk.: MAGNANO, 1957: 47 (sub *Neocalosirus floralis* Payk.);
- Ceutorhynchus hirtulus* Germ.: COLONNELLI, 1974: 171 (sub sp. prope *chali-libaeus* Germ., COLONNELLI i.l.);
- Ceutorhynchus inaeffectatus* Gyll.: MAGNANO, 1957: 48; Valle Malvento, r., VI;
- Ceutorhynchus laetus* Rosh.: COLONNELLI, 1974: 171; (M);
- Ceutorhynchus maculaalba* Herbst: Campotinese, VI, leg. COLONNELLI (COLONNELLI i.l.);
- Ceutorhynchus pycitarsis* Gyll.: Colle del Dragone, 1 ex., VI; Vallone della Caballa, 1 ex., VI;
- Ceutorhynchus pleurostigma* Marsh.: COLONNELLI, 1974: 170; Anticristo, r., VI-VII; Campotinese, 1 ex., VII;
- Ceutorhynchus punctiger* Gyll.: dint. Torno, 1 ex., VII, leg. COLONNELLI (COLONNELLI i.l.);
- Ceutorhynchus sulcicollis* Payk.: COLONNELLI, 1974: 170; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, 1 ex., VI;
- Ceutorhynchus unguicularis* Thoms.: COLONNELLI, 1974: 170; (M).
- Cionus balianii* Sol.: MAGNANO, 1957: 51; (M);
- Cionus hortulanus* Geoffr.: MAGNANO, 1957: 51; COLONNELLI, 1974: 173; Colle del Dragone, r., VII; Anticristo, 1 ex., VI;
- Cionus longicollis* ssp. *montanus* Wingelm.: MAGNANO, 1957: 51; COLONNELLI, 1974: 173; Fontana Rummo, r., VII; Valle Zaperna, 1 ex., VII;
- Cionus olens* F.: MAGNANO, 1957: 52; COLONNELLI, 1974: 174;
- Cionus thapsi* F.: MAGNANO, 1957: 52; Campotinese, 1 ex., VII;
- Cionus schoenherri* Bris.: COLONNELLI, 1974: 173; (M);
- Cionus tuberosus* Scop.: MAGNANO, 1957: 51; COLONNELLI, 1974: 173; Piano Ruggio, r., VI; Colle del Dragone, 1 ex., VII.
- Cleonis pigra* Scop.: MAGNANO, 1957: 37; Piano Ruggio, c., VI.
- Cleopus solani* F.: MAGNANO, 1957: 52; (M).
- Cotaster uncipes* Boh.: COLONNELLI, 1974: 147; Vacquarro, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Coppola di Paola, rif. Rotonda, pendici nord-est, c., VI.
- Curculio crux* F.: COLONNELLI, 1974: 155; Duglia, 1 ex., VIII; (M);
- Curculio glandium* Marsh.: MAGNANO, 1957: 42; Terranova P., 1 ex., VI; Campotinese, r., VI;
- Curculio nucum* L.: Terranova P., 1 ex., VII;
- Curculio pellitus* Boh.: Duglia, 1 ex., VI;
- Curculio pyrrhoceras* Marsh.: MAGNANO, 1957: 42; COLONNELLI, 1974: 156; Campotinese, 1 ex., VII;
- Curculio salicivorus* Payk.: COLONNELLI, 1974: 156; Vacquarro, r., VI;

- Curculio villosus* F.: COLONNELLI, 1974: 155; (M).  
*Datonychus urticae* ssp. *stachydis* Faust.: MAGNANO, 1957: 47; dint. Torno, 1 ex., VII, leg. COLONNELLI (COLONNELLI i.l.); (M).  
*Dichotrachelus bensai* Sol.: COLONNELLI, 1974: 161; Colle del Dragone, p.c., VII.  
*Donus brucki* Cap.: Coppola di Paola, vetta, 1 ex., VII;  
*Donus crinitus* Boh.: Campotenesse, 1 ex., VI;  
*Donus salviae* Schrnk.: MAGNANO, 1957: 44; COLONNELLI, 1974: 160; Piano Ruggio, 1 ex., VII; Anticristo, 1 ex., VII.  
*Dorytomus melanophthalmus* Payk.: COLONNELLI, 1974: 149;  
*Dorytomus taeniatus* F.: MAGNANO, 1957: 39; Valle di Malevento, 1 ex., VII.  
*Dryophthorus corticalis* Payk.: COLONNELLI, 1974: 147.  
*Echinodera hypocrita* Boh.: MAGNANO, 1957: 45; COLONNELLI, 1974: 166; Acqua Tremola, p.c., VI; Cugno dell'Acero, r., VI-VII; Duglia, c., V-VII; Pantano Grande, r., VI; Piano Pollino, 1 ex., VII; Madonna di Pollino, r., VII; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, r., VI-VII;  
*Echinodera variegata* Boh.\*: Duglia, 1 ex., VI.  
*Gymnetron anthirrhini* Payk.: COLONNELLI, 1974: 172; Serra del Prete, pendici ovest, 1 ex., VII;  
*Gymnetron asellus* Gravh.: MAGNANO, 1957: 49;  
*Gymnetron bipustulatum* Rossi: MAGNANO, 1957: 50; COLONNELLI, 1974: 172; Piano Ruggio, r., VI; Anticristo, 1 ex., VI;  
*Gymnetron herbarum* Bris.: COLONNELLI, 1974: 172;  
*Gymnetron pascuorum* Gyll.: Anticristo, r., VI; Campotenesse, r., VI;  
*Gymnetron rostellum* Herbst \*\*: Cugno Ruggeri, r., VI; noto di Piemonte, Lombardia, Trentino A. Adige, Sicilia (LUIGIONI, 1929: 965);  
*Gymnetron tetrum* F.: MAGNANO, 1957: 50; COLONNELLI, 1974: 171;  
*Gymnetron veronicae* Germ.\*: Valle Malvento, 1 ex., VI.  
*Hadroplontus trimaculatus* F.: MAGNANO, 1957: 47; Campotenesse, 1 ex., VI.  
*Hylobius abietis* L.: MAGNANO, 1957: 43; COLONNELLI, 1974: 156; Duglia, r., VI-VII; Cugno Ruggeri, 1 ex., VI; Valle di Malevento, 1 ex., VII.  
*Hypera murina* F.: Terranova P., p.c., VI;  
*Hypera nigrirostris* F.: Colle dell'Impiso, r., VI; Vallone Zaperna, r., VI; Piano Ruggio, c., VI;  
*Hypera postica* Gyll.: COLONNELLI, 1974: 160; Anticristo, 1 ex., VII; Campotenesse, r., VI-VII;  
*Hypera venusta* F.: MAGNANO, 1957: 45 (sub *Phytonomus trilineatus* Marsh.); Anticristo, 1 ex., VI;  
*Hypera zoilus* Scop.: MAGNANO, 1957: 45; COLONNELLI, 1974: 160 (sub *Pby-*

- tonomus punctatus* F.); Piano Ruggio, r., VII; Colle del Dragone, 1 ex., VI; Valle della Caballa, 1 ex., VI; Vacquarro, 1 ex., VI.
- Larinus carinirostris* Gyll.: MAGNANO, 1957: 33;
- Larinus carlinae* Ol.: MAGNANO, 1957: 34;
- Larinus jaceae* F.: MAGNANO, 1957: 34; COLONNELLI, 1974: 145; Piano Toscano, r., VI; Valle Zaperna, 1 ex., VI;
- Larinus obtusus* Gyll.: MAGNANO, 1957: 35; Valle Malvento, 1 ex., VI;
- Larinus rusticanus* Gyll.: MAGNANO, 1957: 34;
- Larinus scolymi* Ol.: MAGNANO, 1957: 35;
- Larinus sturnus* Schall.: COLONNELLI, 1974: 144; Valle Zaperna, r., VII; Piano Ruggio, c., VII; Valle della Caballa, r., VII; Anticristo, c., VII-VIII;
- Larinus turbinatus* Gyll.: MAGNANO, 1957: 34; COLONNELLI, 1974: 145; Duglia, c., VIII; Vacquarro, 1 ex., VI; Fontana Rummo, 1 ex., VI; Timpa del Demonio, r., VI; Valle Malvento, c., VIII; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, r., VI-VIII;
- Larinus vulpes* Ol.: MAGNANO, 1957: 33.
- Leiosoma oblongulum* Boh.: MAGNANO, 1957: 43; COLONNELLI, 1974: 158; Anticristo, r., VII;
- Leiosoma scrobiferum* ssp. *baudii* Bed.: MAGNANO, 1957: 44; COLONNELLI, 1974: 158; Duglia, 1 ex., VIII, *leg.* DE MARZO.
- Limnobaris t-album* L.: COLONNELLI, 1974: 166.
- Limobius borealis* Payk.: COLONNELLI, 1974: 160; Piano Toscano, r., VI.
- Liparus coronatus* Goeze: COLONNELLI, 1974: 156.
- Lixus acicularis* Germ.: MAGNANO, 1957: 36;
- Lixus algirus* L.: MAGNANO, 1957: 36; Piano Ruggio, p.c., VII; Anticristo, r., VII; Campotenese, c., VII;
- Lixus ascanii* L.: Duglia, 1 ex., VI, *leg.* COLONNELLI (COLONNELLI i.l.);
- Lixus cardui* Ol.: MAGNANO, 1957: 36; Campotenese, 1 ex., VIII;
- Lixus curvirostris* Cap.: COLONNELLI, 1974: 145;
- Lixus elongatus* Germ.: MAGNANO, 1957: 36; Terranova P., r., VI; Anticristo, c., VII;
- Lixus iridis* Ol.: MAGNANO, 1957: 35;
- Lixus lateralis* Panz.: MAGNANO, 1957: 35;
- Lixus myagri* Ol.: Piano Ruggio, 1 ex., VII;
- Lixus punctiventris* Boh.: Acqua Tremola, 1 ex., VII;
- Lixus sanguineus* Rossi: MAGNANO, 1957: 36; COLONNELLI, 1974: 146; Terranova P., 1 ex., VII; Campotenese, r., VI-VII.
- Magdalis barbicornis* Latr.: MAGNANO, 1957: 42 (sub *M. mixta* Desbr.);
- Magdalis cerasi* L.: Cugno dell'Acero, p.c., VI;
- Magdalis exarata* Bris.: MAGNANO, 1957: 43;

- Magdalis frontalis* Gyll.: Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, c., VI;  
*Magdalis memnonia* Gyll.\*: Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, c., VI.  
*Mecaspis caesus* Gyll.: MAGNANO, 1957: 37; Valle di Malevento, r., VII;  
*Mecaspis emarginatus* F.: MAGNANO, 1957: 37; COLONNELLI, 1974: 146.  
*Mecinus janthinus* Germ.\*: Coppola di Paola, vetta, 1 ex., VII;  
*Mecinus pyraister* Herbst: Anticristo, r., VII; Campotenese, c., VII.  
*Metacinops rhinomacer* ssp. *calabrus* Stierl.: MAGNANO, 1957: 38; COLONNELLI, 1974: 147.  
*Mesites curvipes* Boh.: Fontana Rummo, r., VI; Vacquarro, c., VI.  
*Miaromimus distinctus* Boh.: MAGNANO, 1957: 50; (M);  
*Miaromimus fuscopubens* Reitt.: MAGNANO, 1957: 50; (M);  
*Miaromimus graminis* Gyll.: COLONNELLI, 1974: 172; (M);  
*Miaromimus plantarum* Germ.: MAGNANO, 1957: 50; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI.  
*Microplontus fairmairei* Bris.\*\*: Piano Ruggio, 1 ex., VI; COLONNELLI (i.l.) ha reperito questa specie a Serra delle Ciavole, 1 ex. ♀, VI, deponente su capolino di *Senecio tenorei*, nuova pianta ospite; Alpi Marittime e A. Cozie (LUIGIONI, 1929: 933); COLONNELLI (i.l.) la conosce anche di Abruzzo (Campo Felice) e Marche (M.te Sibilla); (M).  
*Mogulones cruciger* Herbst: COLONNELLI, 1974: 168; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI-VII;  
*Mogulones geograficus* Goeze: MAGNANO, 1957: 47; COLONNELLI, 1974: 168; Valle Malvento, r., VI; Valle della Caballa, r., VI;  
*Mogulones lucanus* Col.: COLONNELLI, 1974: 169 (sub *C. ornatus* Gyll.); COLONNELLI, 1983: 169;  
*Mogulones pallidicornis* Bris.: COLONNELLI, 1974: 169; (M).  
*Mogulones t-album* Gyll.: MAGNANO, 1957: 47 (sub *C. aubei* Boh.); COLONNELLI, 1974: 169; Valle Malvento, r., VI, leg. MONTEMURRO.  
*Nedyus quadrimaculatus* L.: MAGNANO, 1957: 46 (sub *Cidnorrhinus*); COLONNELLI, 1974: 168; Acqua Tremola, r., VI; Piano delle Mandre, r., VI; Pantano Grande, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI.  
*Neoplinthus tigratus* Rossi: MAGNANO, 1957: 44; COLONNELLI, 1974: 159 (sub *N. tigratus* ssp. *abbreviatus* Sol., COLONNELLI i.l.); Piano Ruggio, 1 ex., VII, leg. MONTEMURRO; (M).  
*Otiobrychus alpicola* ssp. *strigirostris* Boh.: MAGNANO, 1957: 20; COLONNELLI, 1974: 131; (M);  
*Otiobrychus alutaceus* Germ.: MAGNANO, 1957: 19; COLONNELLI, 1974: 130; Terranova P., 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI; Coppola di Paola, pendici sud, r., VII;

- Otiobrychus anthracinus* Steph.: MAGNANO, 1957: 21; COLONNELLI, 1974: 133; Piano Ruggio, 1 ex., VII;
- Otiobrychus armatus* Boh.: MAGNANO, 1957: 20; COLONNELLI, 1974: 131; Campotenese, 1 ex., VII;
- Otiobrychus brevipes* ssp. *tarentinus* Sol.: MAGNANO, 1957: 16;
- Otiobrychus brutius* Reitt.: MAGNANO, 1957: 18 (sub *O. perdix* Ol.); Timpa del Demonio, c., VI; Anticristo, r., VI; Campotenese, c., VII;
- Otiobrychus calabrolucanus* Lona: MAGNANO, 1957: 22; COLONNELLI, 1974: 134; (E);
- Otiobrychus cardiniger* ssp. *minutesquamosus* Sol.: MAGNANO, 1957: 18;
- Otiobrychus colonnelli* Magn.: COLONNELLI, 1974: 132 (sub *O. cribrirostris* Leoni n. ssp.); (E);
- Otiobrychus consentaneus* ssp. *dimorphus* Sol.: MAGNANO, 1957: 17; COLONNELLI, 1974: 130;
- Otiobrychus corruptor* Host.\*: Piano Ruggio, 1 ex., VII; Coppola di Paola, vetta, p.c., VII;
- Otiobrychus crinipes* ssp. *pilipes* Leoni \*: Campotenese, 1 ex., VII; (M);
- Otiobrychus cribricollis* Gyll.: MAGNANO, 1957: 21; Campotenese, r., VI-VII;
- Otiobrychus desertus* Rosh. ssp.?: COLONNELLI, 1974: 132; (M).
- Otiobrychus indefinitus* Reitt.: MAGNANO, 1957: 22; COLONNELLI, 1974: 134; (M);
- Otiobrychus ligneoides* Stierl.: MAGNANO, 1957: 19;
- Otiobrychus lugens* Germ.: Vacquarro, c., VI; Valle Malvento, p.c., VI;
- Otiobrychus mastix* ssp. *perlongus* Sol.: MAGNANO, 1957: 15; COLONNELLI, 1974: 128; Vacquarro, 1 ex., VI;
- Otiobrychus porcellus* Dan.: MAGNANO, 1957: 24; COLONNELLI, 1974: 133; (M);
- Otiobrychus rugosostriatus* Goeze: MAGNANO, 1957: 20;
- Otiobrychus setosulus* Stierl.: MAGNANO, 1957: 22; COLONNELLI, 1974: 133; Colle del Dragone, 1 ex., VII.
- Pachycerus scabrosus* Brullé: MAGNANO, 1957: 37.
- Pachytychius discithorax* Desbr.: COLONNELLI, 1974: 149 (sub *P.* n. sp.); CALDARA, 1978: 192.
- Parascythropus baudii* Stierl.: COLONNELLI, 1974: 138.
- Pelenomus quadrituberculatus* F.: MAGNANO, 1957: 49 (sub *Phytobius*); (M).
- Phloeophagus lignarius* Marsh.: OSELLA, 1975: 421; Duglia, r., V-VIII.
- Phyllobius argentatus* L.: MAGNANO, 1957: 27; COLONNELLI, 1974: 138; Acqua Tremola, c., VI; Pantano Grande, p.c., VI; Piano Ruggio, p.c., VI; Anticristo, r., VI;

- Phyllobius longipilis* Boh.: MAGNANO, 1957: 28; COLONNELLI, 1974: 137; Piano Ruggio, 1 ex., VI;
- Phyllobius maculicornis* ssp. *lucanus* Sol.: MAGNANO, 1957: 27; COLONNELLI, 1974: 137; Piano Ruggio, r., VI;
- Phyllobius oblongus* L.: MAGNANO, 1957: 26; COLONNELLI, 1974: 137; Cugno Ruggeri, r., VI; Duglia, p.c., VI-VII; Valle Malvento, r., VI;
- Phyllobius pyri* ssp. *italicus* Sol.: MAGNANO, 1957: 26; COLONNELLI, 1974: 137; Valle Zaperna, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI; Campotenese, 1 ex., VII;
- Phyllobius romanus* Faust.: MAGNANO, 1957: 27; COLONNELLI, 1974: 137; Piano Toscano, r., VI; Vacquarro, c., VI-VII; Colle Gaudolino, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, r., VI;
- Phyllobius raverai* Sol.: COLONNELLI, 1974: 138;
- Phyllobius subdentatus* Boh.: MAGNANO, 1957: 26; COLONNELLI, 1974: 136; Vacquarro, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, p.c., VI.
- Pissodes castaneus* Deg.: Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, r., VI;
- Pissodes piceae* Ill.: COLONNELLI, 1974: 156; Duglia, 1 ex., VII; Serra del Prete, pendici nord-est, 1 ex., VII;
- Pissodes validirostris* Gyll.\*\*: Cugno Ruggeri, 1 ex., VI; noto di Trentino A. Adige e Friuli V. Giulia (LUIGIONI, 1929: 919).
- Plinthus illigeri* ssp. *colonnellii* Mereg.: COLONNELLI, 1974: 159 (sub *Plinthus* n. sp.); MEREGALLI, 1985: 118; (E);
- Plinthus megerlei* Panz.: COLONNELLI, 1974: 159; MEREGALLI, 1985: 117; (M);
- Plinthus squalidus* ssp. *granulipennis* Fairm.: MAGNANO, 1957: 44; 1960: 289; COLONNELLI, 1974: 159; MEREGALLI, 1985: 115; (M).
- Polydrusus brevicollis* Desbr.: MAGNANO, 1957: 29; COLONNELLI, 1974: 140; Campotenese, 1 ex., VII;
- Polydrusus cervinus* L.: MAGNANO, 1957: 29; COLONNELLI, 1974: 140; Valle Malvento, c., VI; Anticristo, 1 ex., VII;
- Polydrusus frater* Rottbg.: MAGNANO, 1957: 30;
- Polydrusus kabri* Kirsh.: Terranova P., 1 ex., VI;
- Polydrusus impar* Gozis: MAGNANO, 1957: 28; COLONNELLI, 1974: 138; Vacquarro, r., VI; Colle dell'Impiso, 1 ex., VI; Valle Malvento, c., VI;
- Polydrusus modestus* Stierl.: MAGNANO, 1957: 20; Colle Gaudolino, 1 ex., VII;
- Polydrusus pilosus* Gredl.: MAGNANO, 1957: 29; COLONNELLI, 1974: 140; Vacquarro, 1 ex., VI; Valle Zaperna, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII;
- Polydrusus pirazzolii* Stierl.: COLONNELLI, 1974: 139; Duglia, r., VI, *leg.* MONTEMURRO;

- Polydrusus pterygomalis* Boh.: COLONNELLI, 1974: 140; Piano Ruggio, 1 ex., VI; (M);
- Polydrusus raverai* Sol.: MAGNANO, 1957: 30; COLONNELLI, 1974: 141; Acqua Tremola, r., VI; Piano delle Manle, 1 ex., VI; Valle Zaperna, 1 ex., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, p.c., VI; Anticristo, r., VI;
- Polydrusus scutellaris* Chev.: MAGNANO, 1957: 28; COLONNELLI, 1974: 139; Piano Pollino, r., VII; Piano Ruggio, c., VI;
- Polydrusus siculus* Desbr.: MAGNANO, 1957: 29; COLONNELLI, 1974: 139;
- Polydrusus sparsus* Gyll.: COLONNELLI, 1974: 140; Duglia, 1 ex., VII; Valle di Malevento, 1 ex., VII;
- Polydrusus subnotatus* Schils.: MAGNANO, 1957: 28; COLONNELLI, 1974: 139; Valle Malvento, c., VI.
- Pseudocleonus italicus* Sol.: MAGNANO, 1957: 37; COLONNELLI, 1974: 146; (M).
- Pseudocoeliodes rubricus* Gyll.: COLONNELLI, 1974: 167.
- Pseudomylocerus neapolitanus* Pic: MAGNANO, 1957: 25 (sub *P. sinuatus* F.); COLONNELLI, 1974: 136 (sub *Phyllobius paganettii* Schils., COLONNELLI i.l.); Duglia, r., VIII, leg. DE MARZO; Campotenese, 1 ex., VII.
- Pseudomeira binaghi* Sol.: MAGNANO, 1957: 25;
- Pseudomeira obscura* Sol.: COLONNELLI, 1974: 134; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII;
- Pseudomeira* sp. prope *vitalei* Desbr.: COLONNELLI, 1974: 134.
- Pseudorhinus impressicollis* Boh. ssp. (prope *peninsularis* Sol.): COLONNELLI, 1974: 161.
- Rhamphus oxyacanthae* Marsh.: COLONNELLI, 1974: 174; (sub *R. pulicarius Herbst*, COLONNELLI i.l.); Duglia, 1 ex., VIII; Campotenese, r., VII.
- Rhinocyllus conicus* F.: MAGNANO, 1957: 30; Piano Ruggio, 1 ex., VII.
- Rhinoncus pericarpus* L.: MAGNANO, 1957: 49; COLONNELLI, 1974: 167; Piano Ruggio, 1 ex., VII.
- Rhynchaenus decoratus* Germ.\*: Serra del Prete, pendici nord-est, 1 ex., VI; Vacquarro, 1 ex., VI; (M);
- Rhynchaenus fagi* L.: MAGNANO, 1957: 52; COLONNELLI, 1974: 174; Valle Zaperna, 1 ex., VI; Valle Malvento, 1 ex., VIII; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Fosso Mauro, 1 ex., VI;
- Rhynchaenus pilosus* F.: MAGNANO, 1957: 52;
- Rhynchaenus stigma* Germ.: COLONNELLI, 1974: 174; (M).
- Rhyncholus chloropus* L.: MAGNANO, 1957: 38 (sub *R. ater* L.); (M);
- Rhyncholus elongatus* Gyll.: MAGNANO, 1957: 38; COLONNELLI, 1974: 148;
- Rhyncholus lignarius* Marsh.\*: Vacquarro, 1 ex., VI, leg. MONTEMURRO;

- Rhyncholus punctatulus* Boh.\*: Duglia, 1 ex., VI, sotto corteccia di *Abies alba* L., leg. COLONNELLI (COLONNELLI i.l.).
- Rutidosoma fallax* Otto \*\*: Piano Ruggio, 1 ex., VI; nota di Trentino A. Adige (LUIGIONI, 1929: 927); (M).
- Sibinia attalica* Gyll.: MAGNANO, 1957: 41; COLONNELLI, 1974: 154; Colle Gaudolino, 1 ex., VI;
- Sibinia femoralis* Germ.: CALDARA, 1983-84: 45;
- Sibinia pellucens* Scop.: CALDARA, 1983-84: 39; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, r., VI-VII.
- Sitona callosus* Gyll.: COLONNELLI, 1974: 143;
- Sitona cambricus* Steph.: MAGNANO, 1957: 31 (sub *Sitona* n. sp.); 1959: 160 (sub *S. solarii* n. sp.) (vedasi COLONNELLI, 1974: 142);
- Sitona cinerascens* Fahrs.: COLONNELLI, 1974: 142;
- Sitona crinitus* Herbst: MAGNANO, 1957: 31;
- Sitona discoideus* Gyll.: MAGNANO, 1957: 32; Anticristo, r., VI; Campotenese, c., VI-VII; (M);
- Sitona intermedius* Küst.: Campotenese, c., VII;
- Sitona hirsutus* Desbr.\*: Cugno Ruggeri, r., VI; Cugno dell'Acero, r., VI; noto di Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Corsica (LUIGIONI, 1929: 891);
- Sitona hispidulus* F.: COLONNELLI, 1974: 144; Piano Ruggio, 1 ex., VI, leg. MONTEMURRO;
- Sitona humeralis* Steph.: MAGNANO, 1957: 32; Campotenese, 1 ex., VI;
- Sitona limosus* Rossi: Campotenese, 1 ex., VI, leg. COLONNELLI (COLONNELLI i.l.);
- Sitona lineatus* L.: COLONNELLI, 1974: 142;
- Sitona lividipes* Fahrs.: Duglia, 1 ex., VIII, leg. DE MARZO;
- Sitona puncticollis* Steph.: COLONNELLI, 1974: 143; Campotenese, r., VII;
- Sitona sulcifrons* ssp. *angustifrons* Reitt.: MAGNANO, 1957: 31; COLONNELLI, 1974: 143; Duglia, 1 ex., VIII, leg. DE MARZO; Piano Pollino, 1 ex., VII; Fontana Rummo, 1 ex., VI; Vacquarro, c., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII;
- Sitona suturalis* Steph.: COLONNELLI, 1974: 143.
- Smicronyx brevicornis* Sol.: MAGNANO, 1974: 143.
- Smicronyx coecus* Reich: COLONNELLI, 1974: 152; (M).
- Smicronyx nebulosus* Tourm.: COLONNELLI, 1974: 151; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Valle della Caballa, 1 ex., VI;
- Smicronyx reichi* Gyll.: COLONNELLI, 1974: 150; (M).
- Stenocarus fuliginosus* Marsh.: COLONNELLI, 1974: 168.
- Stereocorynes truncorum* Germ.: MAGNANO, 1957: 39.
- Strophosoma melanogrammus* Först.: Valle Malvento, 1 ex., VII; Cozzo di Dimoniello, 1 ex., VI.



- Tanysphyrus lemnae* Payk.: COLONNELLI, 1974: 149.
- Trachyploeus alternans* Gyll.: MAGNANO, 1957: 25; COLONNELLI, 1974: 135; (M);
- Trachyploeus laticollis* Boh.: COLONNELLI, 1974: 135;
- Trachyploeus spinimanus* Germ.\*: Valle Malvento, 1 ex., VI; (M).
- Trichosirocalus horridus* Panz.: MAGNANO, 1957: 46 (sub *Ceuthorrhynchidius horridus* Panz.); Piano Ruggio, 1 ex., VI;
- Trichosirocalus rufulus* Duf.: MAGNANO, 1957: 46; COLONNELLI, 1974: 168 (sub *Ceuthorrhynchidius rufulus* Duf.); Valle della Caballa, 1 ex., VI;
- Trichosirocalus urens* Gyll.: MAGNANO, 1957: 46; COLONNELLI, 1974: 167 (sub *Ceuthorrhynchidius urens* Gyll.);
- Trichosirocalus troglodytes* F.: MAGNANO, 1957: 46 (sub *Ceuthorrhynchidius troglodytes* F.); Piano Ruggio, 1 ex., VI.
- Tropiphorus obtusus* Boisd.: MAGNANO, 1957: 32; COLONNELLI, 1974: 144; Valle Zaperna, 1 ex., VI; (M);
- Tropiphorus* sp. prope *terricola* Newm.: Piano Ruggio, r., VI.
- Tychius armatus* Tourn.: COLONNELLI, 1974: 153;
- Tychius caldarai* Dieckm.: Terranova P., 1 ex., VII, leg. SCHATZMAYR & KOCH, coll. Mus. Milano (CALDARA i.l.);
- Tychius cuprifer* Panz.: COLONNELLI, 1974: 154 (sub *Miccotrogus cuprifer* Panz.); Valle Malvento, 1 ex., VI; Campotinese, 1 ex., VII;
- Tychius curtirostris* Desbr.: Terranova P., r., VI; Campotinese, 1 ex., VII;
- Tychius flavicollis* Steph.: MAGNANO, 1957: 40; Piano Ruggio, r., VI;
- Tychius focarilei* Sol.: COLONNELLI, 1974: 152; (M);
- Tychius kulzeri* Pen.: M. Pollino, m 1800, 1 ex., VII, leg. SCHATZMAYR & KOCH, coll. Mus. Milano (CALDARA i.l.);
- Tychius picirostris* F.: MAGNANO, 1957: 41; COLONNELLI, 1974: 154 (sub *Miccotrogus picirostris* F.); Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, r., VI;
- Tychius pusillus* Germ.: MAGNANO, 1957: 41 (sub *T. neapolitanus* Tourn.: COLONNELLI, 1974: 153, nota);
- Tychius quinquepunctatus* L.: MAGNANO, 1957: 37 (sub *Aoromius quinquepunctatus* L.); Campotinese, 1 ex., VI;
- Tychius schneideri* Herbst: MAGNANO, 1957: 40 (sub *T. polylineatus* Germ.); COLONNELLI, 1974: 152; Piano Ruggio, c., VI;
- Tychius stephensi* Schönh.: Piano Ruggio, 1 ex., VI;
- Tychius thoracicus* Boh.: MAGNANO, 1957: 40;
- Tychius tibialis* Boh.: MAGNANO, 1957: 41; COLONNELLI, 1974: 153; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Campotinese, 1 ex., VII;
- Tychius tomentosus* Herbst: MAGNANO, 1957: 40 (sub *T. lineatulus* Steph.); COLONNELLI, 1974: 153.

*Zakladus affinis* Payk.: Valle Malvento, 1 ex., VI;

*Zakladus exiguus* Ol.: Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VI.

#### CONSIDERAZIONI

Ho già esposto in altra sede (« Coleotterofauna del bosco di Policoro ») i motivi per cui ritengo prematuro presentare considerazioni di carattere zoogeografico e, per le stesse ragioni, qui mi limito a segnalare i reperti più significativi emersi nel corso dello studio sulla coleotterofauna del Massiccio del Pollino:

- a) specie da considerare tuttora presumibilmente endemiche: *Trechus angelae* Magr., *T. schatzmayr* Foc., *Anemadus strigosus* ssp. *pollinensis* Tam., *Bathysciola ruffoi* Tam., *Atheta pollinensis* Scheerp., *Leptusa kochiana* Bernh., *L. pollinensis* Pace, *Mycetoporus pollinensis* Scheerp., *Ocalea pollinensis* Scheerp., *Sipalia focarilei* Scheerp., *S. tamaninii* Scheerp., *Opilio taeniatus torretassoi* Wittm., *Cyphon palmi* Nyholm, *Rhamnusium graecum* ssp. *italicum* Müll., *Acalles saccoi* Colonn., *Otiobrychus calabrolucanus* Lona, *O. colonnellii* Magn., *Plinthus illigerii* ssp. *colonnellii* Mereg;
- b) specie nuove per la fauna italiana: *Acrotichis sitkaensis* Motsch., *Acrolocha amabilis* Heer, *Micropeplus latus* Hampe, *Stenus binaghii* Putz, *Malthinus striatulus* Marsh., *Ebaeus ater* Kiesw., *Ceutorhynchus angustus* Dieckm. & Smrecz., *Pachytychius discitorax* Desbr.;
- c) specie sinora note di singole regioni italiane: *Leiodes longipes* Schmidt, *Euthicomus conicollis* Fairm., *Ptiliolum marginatum* Aubé, *Gyrohypnus angustatus* Steph., *Ampedus melanurus* Muls., *Selatosomus impressus* F., *Lathridius anthracinus* Mannh., *Cis dentatus* Mellié, *Stephanopachys quadricollis* Mars., *Ernobius nigrinus* Sturm, *Ochina latreillei* Bon., *Phytobaeus amabilis* Sahlb., *Mordella holomelaena* Apflb., *Mordellistena micantoides* Erm., *Isomira icteropa* Küst., *Polygraphus grandiclava* Thoms., *Microplontus fairmairei* Bris., *Pissodes validirostris* Gyll., *Rutidosoma fallax* Otto;
- d) specie sinora note delle Isole: *Biploporus ultimus* Guill., *Bruchidius pygmaeus* Boh., *Apion alcioneum* Germ.;
- e) 182 specie aventi in Italia una distribuzione di tipo alpino e/o appenninico, hanno il loro limite meridionale di diffusione sul Massiccio del Pollino.

La tabella che segue elenca le famiglie di Coleotteri attualmente note per il Pollino con l'indicazione del rispettivo numero di specie reperitevi; di ogni famiglia è altresì riportato il rapporto percentuale fra il numero delle specie reperite sul Pollino e il numero complessivo delle specie note d'Italia.

Famiglia	SPECIE POLLINO			% su totale specie famiglia
	già note	nuove	totale	
<i>Carabidae</i>	114	42	156	11,5
<i>Haliplidae</i>	1	1	2	9,5
<i>Hygrobiidae</i>		1	1	100
<i>Dytiscidae</i>	29	6	35	19
<i>Gyrinidae</i>	2		2	15
<i>Hydrophilidae</i>	9	31	40	18,5
<i>Histeridae</i>	22	14	36	22
<i>Silphidae</i>	5	2	7	23,5
<i>Leptinidae</i>		1	1	50
<i>Catopidae</i>	4	7	11	7,5
<i>Colonidae</i>	1		1	4
<i>Leiodidae</i>	3	18	21	23
<i>Clambidae</i>		2	2	18
<i>Scydmaenidae</i>	2	7	9	5,5
<i>Corylophidae</i>		2	2	6,5
<i>Ptiliidae</i>		7	7	11,5
<i>Scaphidiidae</i>	4	2	6	33
<i>Staphylinidae</i>	103	91	194	11
<i>Pselaphidae</i>	4	13	17	6
<i>Lycidae</i>	3	1	4	27
<i>Lampyridae</i>	3		3	15
<i>Cantharidae</i>	18	10	38	19
<i>Drylidae</i>		1	1	33
<i>Melyridae</i>	33	11	44	18
<i>Cleridae</i>	6	4	10	33
<i>Lymexylonidae</i>		1	1	50
<i>Cebrionidae</i>		2	2	22
<i>Elateridae</i>	41	17	58	26
<i>Eucnemidae</i>	3	1	4	23,5
<i>Throscidae</i>	1	1	2	20
<i>Buprestidae</i>	44	4	48	24
<i>Dascillidae</i>	1		1	20
<i>Helodidae</i>	4		4	13
<i>Eucinetidae</i>		1	1	33
<i>Dryopidae</i>		2	2	12
<i>Elmidae</i>		3	3	11
<i>Heteroceridae</i>		2	2	8
<i>Dermestidae</i>		18	18	24
<i>Byrrhidae</i>	2		2	5
<i>Trogositidae</i>	3	3	6	60
<i>Byturidae</i>	1	1	2	40
<i>Nitidulidae</i>	10	26	36	21
<i>Rhizophagidae</i>	3		3	19
<i>Cucujidae</i>		11	11	11
<i>Erotylidae</i>	2	5	7	35

Famiglia	SPECIE POLLINO			% su totale specie famiglia
	già note	nuove	totale	
<i>Cryptophagidae</i>	10		10	9,5
<i>Phalacridae</i>	1	1	2	6
<i>Merophysiidae</i>		1	1	7
<i>Lathridiidae</i>		18	18	25
<i>Dasyceridae</i>		1	1	100
<i>Mycetophagidae</i>		5	5	25
<i>Colydiidae</i>	3	9	12	19
<i>Cerylonidae</i>		5	5	62,5
<i>Endomychidae</i>	1	4	5	16,5
<i>Coccinellidae</i>	2	33	35	27
<i>Sphindidae</i>		1	1	100
<i>Aspidiphoridae</i>		1	1	50
<i>Cisidae</i>		15	15	35,5
<i>Lyctidae</i>		1	1	20
<i>Bostrychidae</i>		5	5	25
<i>Anobiidae</i>		18	18	17
<i>Ptinidae</i>		8	8	17
<i>Oedemeridae</i>	11	6	17	38
<i>Pythidae</i>	1	3	4	19
<i>Pyrochroidae</i>		2	2	50
<i>Scraptiidae</i>		2	2	25
<i>Aderidae</i>		1	1	5,5
<i>Anthicidae</i>	2	13	15	16
<i>Meloidae</i>	8	1	9	13,5
<i>Mordellidae</i>	20	11	31	37
<i>Melandryidae</i>	2	3	5	12,5
<i>Lagriidae</i>		2	2	50
<i>Alleculidae</i>	9	7	16	28,5
<i>Tenebrionidae</i>	18	15	33	12,5
<i>Scarabaeidae</i>	78	15	93	28
<i>Lucanidae</i>	5		5	62,5
<i>Cerambycidae</i>	66	12	78	27,5
<i>Chrysomelidae</i>	49	63	112	15
<i>Bruchidae</i>	1	16	17	21
<i>Anthribidae</i>	3	2	5	15
<i>Scolytidae</i>	9	11	20	13
<i>Nemonychidae</i>		1	1	33,3
<i>Attelabidae</i>	2		2	66
<i>Rhynchitidae</i>	14	1	15	43
<i>Apionidae</i>	63	14	77	41,5
<i>Curculionidae</i>	210	50	260	16
<b>TOTALE</b>	<b>1.079</b>	<b>745</b>	<b>1.824</b>	<b>16,5</b>

### RIASSUNTO

Si riportano i dati di cattura relativi a 745 specie di Coleotteri non ancora segnalate per il Massiccio del Pollino, tra cui 251 specie nuove per la Basilicata o Calabria e 22 specie sinora note solo di singole regioni italiane o isole. Di queste ultime viene riportata la diffusione in Italia. Inoltre, i nuovi reperti comprendono 4 specie nuove per la fauna italiana, *Acrotrichis sitkaensis* Motsch., *Acrolocha amabilis* Heer, *Micropeplus latus* Hampe, *Ceutorhynchus angustus* Dieckm., e 1 specie descritta di recente come nuova per la scienza *Agathidium montemurroi* Ang. & Dmz.

Tenendo conto anche dei dati già pubblicati da Autori vari, si rileva che 182 specie raggiungono sul Pollino il loro limite meridionale di diffusione, mentre 18 specie risultano endemiche di tale complesso montuoso. In totale la coleotterofauna del Pollino conta finora 1.824 specie.

Le stazioni esplorate dall'autore sono indicate in una cartina. In un'apposita tabella viene riportato il numero di specie note per ciascuna famiglia.

### SUMMARY

#### *Coleoptera* OF THE POLLINO MASSIF (BASILICATA-CALABRIA)

Field data are presented on 745 species of Coleoptera, not recorded so far from Pollino Massif (Southern Italy). They include: a) 251 new records from Basilicata or Calabria, b) 22 species which were known so far only from single regions or islands of Italy, c) 1 recent new description, *Agathidium montemurroi* Ang. & Dmz., d) 4 new records from the whole Italy, *Acrotrichis sitkaensis* Motsch., *Acrolocha amabilis* Heer, *Micropeplus latus* Hampe, *Ceutorhynchus angustus* Dieckm., e) 182 species which exhibit their southern distribution limit on Pollino, f) 18 endemic species.

Owing to these new data, the coleopterous fauna of Pollino includes so far as many as 1824 species of 86 families.

### BIBLIOGRAFIA \*

- ALIQÙÒ V. & MASSA B., 1976 - Contributo allo studio di *Anoxia scutellaris* s.l. e descrizione di *Anoxia scutellaris argentea* n. ssp. di Sicilia. *Boll. Soc. ent. ital.*, 108: 151-157.
- ANGELINI F., 1978 - *Haliplidae*, *Dytiscidae* e *Gyrinidae* della Lucania. *Entomologica*, Bari, 14: 63-135.
- ANGELINI F., 1982 - Catalogo topografico dei *Coleoptera Haliplidae*, *Hygrobiidae*, *Dytiscidae* e *Gyrinidae* d'Italia. *Mem. Soc. ent. ital.*, 61/A: 45-126.
- ANGELINI F. & MONTEMURRO F., 1986 - Coleotterofauna del bosco di Policoro (Matera). (*Coleoptera*). *Lav. Soc. ital. Biogeogr.*, (n. s.) (in stampa).
- AUDISIO P., 1975 - Note su alcune specie italiane del genere *Meligetes* Steph. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 30: 2-16.
- AUDISIO P., 1976 - Note su alcune *Epuraea* italiane. *Boll. Soc. ent. ital.*, 108: 95-96.
- BAUDI DI SELVE F., PICCIOLI F. & CAVANNA G., 1882 - Al Vulture ed al Pollino. Parte II Catalogo degli animali raccolti al Vulture, al Pollino ed in altri luoghi dell'Italia meridionale e centrale. *Boll. Soc. ent. ital.*, 14: 63-81.
- BERTRAND H., 1956 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XX. *Coleoptera* - 10. Coléoptères acquatiques de Calabre. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VIII (4): 1-8.

\* Sono elencati solo i lavori che contengono dati sul Massiccio del Pollino e che sono citati nel testo; sono pertanto esclusi tutti quei lavori, anche « Faune » e « Cataloghi » da cui è stata desunta solo la diffusione generale delle specie.

- BINAGHI G., 1955 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XII. *Coleoptera* - 2. *Elateridae*, *Melasidae*, *Throscidae* e *Dascillidae*. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VII (9): 1-19.
- BINAGHI G., DELLACASA G. & POGGI R., 1969 - Nuovi caratteri diagnostici per la determinazione degli *Onthophagus* del gruppo *ovatus* (L.) e geonomia controllata delle specie italiane del gruppo. *Mem. Soc. ent. ital.*, 48, fasc. 1 B: 29-46.
- BOLOGNA M. A., 1976 - Reperti di *Oedemeridae* dell'Italia centromeridionale e insulare. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 31: 29-31.
- BORDONI A. & CASTELLINI G., 1973 - Sulle specie paleartiche del genere *Mastigus* Latreille con osservazioni su due specie dell'Africa Australe. *Redia*, 54: 295-323.
- BRUNO S., 1970 - A proposito di *Carabus* (*Oreocarabus*) *hortensis* L. nelle regioni più meridionali del suo areale. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 25: 46-54.
- BUCCIARELLI I., 1961 - Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956-1957-1958. VIII. *Coleoptera Anthicidae*. *Boll. Soc. ent. ital.*, 91: 102-131.
- BUCCIARELLI I., 1980 - *Coleoptera. Anthicidae*. Fauna d'Italia, XVII. Ed. Calderini, Bologna, 240 pp.
- BURLINI L., 1955 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XIX. *Coleoptera* - 9. Due nuovi *Pachybrachys* italiani (*Chrysomelidae*). *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VIII (3): 1-7.
- BURLINI M., 1968 - Revisione dei *Cryptocephalus* italiani e della maggior parte delle specie di Europa. *Mem. Soc. ent. ital.*, 34: 5-287.
- CALDARA R., 1978 - Revisione dei *Pachytychius* paleartici. *Mem. Soc. ent. ital.*, 56: 131-216.
- CALDARA R., 1983 - Revisione delle *Sibinia* paleartiche. *Mem. Soc. ent. ital.*, 62/63: 24-105.
- CANZONERI S., 1977 - Contributo alla conoscenza dei Tenebrionidi appenninici. *Boll. Mus. Civ. st. Nat. Verona*, 4: 227-285.
- CARPANETO G. M., 1974 a - Endemismi italiani. 15. *Aphodius* (*Acrossus*) *siculus* Harold. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 29: VI.
- CARPANETO G. M., 1974 b - Note sulla distribuzione geografica ed ecologica dei Coleotteri Scarabaeoidea Laparosticti nell'Italia appenninica. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 29: 32-54.
- CHIESA A., 1959 - *Hydrophilidae Europae* (*Coleoptera Palpicornia*). Arnaldo Forni Editore, Bologna, 199 pp.
- COLONNELLI G., 1974 - Gli Attelabidi ed i Curculionidi del Massiccio del Pollino (*Coleoptera*). *Fragm. Entomol.*, X, 2: 107-218.
- COLONNELLI G., 1980 - Revisione del Genere *Acallobrates* Reitter. *Atti Soc. ital. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano*, 121 (1-2): 3-16.
- ENDRÖDY-YOUNGA, S. - Monographie der paläarktischen Arten der Gattung *Clambus* (*Coleoptera, Clambidae*). *Acta zool. hung.*, Budapest, 6: 257-303.
- FIORI G., 1948 - I *Byrrhus* L. s. str. italiani. *Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna*, 17: 1-21.
- FIORI G., 1951 - Alcuni appunti sui *Byrrhus* L. s. str. Europei. II contributo alla conoscenza della famiglia *Byrrhidae*. *Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna*, 18: 293-304.
- FOCARILE A., 1949 - I Contributo alla conoscenza dei Trechini paleartici (*Coleoptera: Carabidae*). *Boll. Soc. ent. ital.*, 79: 71-79.
- FOCARILE A., 1960 a - Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956-1957-1958. III. *Coleoptera Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae*. *Mem. Soc. ent. ital.*, 39: 41-114.
- FOCARILE A., 1960 b - Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956-1957-1958. V. *Coleoptera Helodidae*. *Boll. Soc. ent. ital.*, 90: 112-113.
- FOCARILE A., 1961 - Revisione dei coleotteri *Helodidae* conservati nel Museo Civico di Storia Naturale di Milano. 1° - Genere *Cyphon* Payk. *Atti Soc. It. Sc. nat. e Mus. Civ. St. nat. Milano*, 100: 257-268.

- FOCARILE A., 1975 - Alcuni interessanti coleotteri della Valle d'Aosta. *Rev. Valdôt. d'Hist. Natur. (Aosta)*, 29: 8-52.
- FOCARILE A., 1978 - Interessanti coleotteri della Valle d'Aosta (2ª serie). *Rev. Valdôt. d'Hist. Natur. (Aosta)*, 32: 27-66.
- FOGATO W., 1978 - Note sui *Luperus* bicolori italiani e descrizione di *L. leonardii* n. sp. *Mem. Soc. ent. ital.*, 57: 46-64.
- FRANCISCOLO M. E., 1956 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XVIII. *Coleoptera* - 8. *Mordellidae, Scaptiidae*. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VIII (1): 1-7.
- GARDINI G., 1974 - Materiali per lo studio dei Tenebrionidi dell'Arcipelago Toscano. *Lav. Soc. ital. Biogeogr. (n. s.)*, 5: 637-723.
- GENTILI E. & CHIESA A., 1975 - Revisione dei *Laccobius* Palearctici. (*Col. Hydrophilidae*). *Mem. Soc. ent. ital.*, 54: 5-187.
- GERINI F., 1952 - Note sui Buprestidi italiani. 1. *Boll. Soc. ent. ital.*, 82: 85-92.
- GERINI F., 1955 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XV. *Coleoptera* - 5. *Buprestidae*. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VII (12): 1-7.
- GOBBI G., 1971 - I Buprestidi dell'Appennino Lucano. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 26: 33-65.
- GOBBI G., 1973 - Interessanti reperti coleotterologici sull'Appennino Lucano. I. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 28: 33-41.
- GOBBI G., 1981 - Interessanti reperti di Buprestidi italiani e diagnosi di *Anthaxia liae* n. sp. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 36: 33-41.
- GOBBI G., 1983 - Appunti su Coleotteri Cleroidei predatori di xilofagi. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 38: 51-62.
- GRIDELLI E., 1956 a - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXI. *Coleoptera* - 11. *Staphylinidae*. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VIII (5): 1-29.
- GRIDELLI E., 1956 b - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXIII. *Coleoptera* - 13. *Tenebrionidae*. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VIII (9): 1-6.
- KOCH C., 1933 - Risultati scientifici delle caccie entomologiche di S.A.S. il Principe ALESSANDRO DELLA TORRE e TASSO in Italia, I. *Anthophagus*. *Boll. Soc. ent. ital.*, 65: 27-30.
- KOCH C., 1937 - Appunti sugli *Staphilinidi* italiani. III. *Boll. Soc. ent. ital.*, 69: 83-88.
- KOCH C., 1938 - Appunti sugli *Staphilinidi* italiani. IV. *Boll. Soc. ent. ital.*, 70: 135-141.
- LEONARDI C., 1971 - Considerazioni sulle *Psylliodes* del gruppo *napi* e descrizione di una nuova specie. *Atti Soc. It. Sc. nat. e Museo Civ. St. nat. Milano*, 112 (4): 485-533.
- LEONARDI C., 1972 - La « *Psylliodes wachsmanni* » Csiki specie distinta e suo inquadramento nel gruppo della « *Psylliodes picina* ». *Atti Mus. Civ. Stor. nat. Trieste*, 28 (1): 137-146.
- LEONARDI C., 1975 - Le *Psylliodes* appenniniche del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. *Boll. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 2: 51-90.
- LIBERTI G., 1978 - Revisione delle specie italiane del genere *Danacaea*, primo gruppo. *Mem. Soc. ent. ital.*, 57: 29-45.
- LÖBL I., 1970 - Revision der paläarktischen Arten der Gattungen *Scaphisoma* Leach und *Caryoscapha* Ganglbauer der Tribus *Scaphisomini* (*Col. Scaphidiidae*). *Revue suisse Zol.*, 77: 727-799.
- MAGISTRETTI M., 1953 - Le specie italiane del genere *Mylabris* F. *Ann. Mus. Civ. st. nat. Genova*, 62: 30-54.
- MAGISTRETTI M., 1955 a - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XI. *Coleoptera* - 1. *Carabidae*. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VII (8): 1-30.
- MAGISTRETTI M., 1956 b - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XIII. *Coleoptera* - 3. *Oedemeridae, Meloidae, Alleculidae*. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VII (10): 1-6.
- MAGISTRETTI M., 1962 - Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria; Campagne 1956-1957-1958. IX. *Coleoptera Oedemeridae, Pyrochroidae, Meloidae, Lagriidae, Alleculidae*. *Boll. Soc. ent. ital.*, 92: 83-92.
- MAGISTRETTI M., 1965 - *Coleoptera, Cicindelidae, Carabidae*. Catalogo topografico. Fauna d'Italia, VIII. Ed. Calderini, Bologna, 512 pp.

- MAGISTRETTI M., 1967 - Catalogo degli *Oedemeridae* italiani. *Mem. Soc. ent. ital.*, 46: 181-200.
- MAGISTRETTI M., 1969 - Catalogo topografico dei *Coleoptera Cicindelidae* e *Carabidae* d'Italia. I Supplemento. *Mem. Soc. ent. ital.*, 47: 177-217.
- MAGISTRETTI M. & RUFFO S., 1960 - Considerazioni sulla diffusione nell'Italia appenninica di alcuni generi di Coleotteri Carabidi e Crisomelidi. *Atti Acc. Naz. ital. Entomol.*, 8: 137-179.
- MAGNANO L., 1957 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXIV. *Coleoptera* - 14. *Carculionidae*. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, IX (1): 1-53.
- MAGRINI P., 1984 - *Trechus angelae* n. sp. dell'Appennino Calabro-Lucano. *Redia*, 67: 247-252.
- MAGRONE R. & PAPINI G., 1966 - Note Coleotterologiche. I. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 21 (3): 36-39.
- MAREK O., 1961 - Eine gebirgsausbeute von Nitiduliden aus den Apenninen. *Mem. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 9: 1-4.
- MARIANI G., 1958 - Revisione delle specie italiane di *Geotrupes* subgen. *Trypocopris*. *Mem. Soc. ent. ital.*, 38: 23-43.
- MARIANI G., 1971 - Zoogeografia degli Scarabeidi Laparosticti orofili dell'Appennino centrale (*Coleoptera Scarabaeoidea*). *Lav. Soc. ital. Biogeogr.*, (N.S.), 2: 225-270.
- MASUTTI L., 1968 - Coleotteri Scolitidi dei Pini d'altitudine in alcuni biotopi delle Alpi e sul Massiccio del M. Pollino. *Arch. Bot. Biogeogr. ital.*, 44: 213-223.
- MEGGIOLARO G., 1960 - Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956-1957-1958. IV. *Coleoptera Pselaphidae*. *Boll. Soc. ent. ital.*, 90: 80-94.
- MEGGIOLARO G., 1966 - Su alcuni euplectini paleartici. *Boll. Soc. ent. ital.*, 96: 163-168.
- MIKSIC R., 1959 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXIX. *Coleoptera* - 15. Beitrag zur Kenntnis der Lamellicornis-Fauna der Apenninen. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, XI (8): 1-24.
- MINELLI A. & VITTORELLI S., 1976 - Il Rassenkreis *Timarcha tenebricosa* (F.) (*Coleoptera Chrysomelidae*). *Boll. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 3: 1-33.
- MOSCARDINI C., 1968 - I Coleotteri Cantaridini della Regione Appenninica (*Col. - Cantharidae*). *Mem. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 16: 49-96.
- MÜLLER G., 1955 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XVI. *Coleoptera* - 6. *Histeridae*. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VII (13): 1-7.
- OSELLA G., 1975 - Descrizione di due nuove specie di *Phloeophagus* Schh. e brevi note sulla corologia e sulla ecologia di *P. gracilis* Rosenh. e *P. lignarius* Marsham. *Boll. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 1: 415-426.
- OTERO J. C. & ANGELINI F., 1981 - Su alcuni *Cryptophagus* italiani nuovi o poco conosciuti. *Boll. Soc. ent. ital.*, 113: 96-100.
- OTERO J. C. & ANGELINI F., 1984 - Contributo alla conoscenza dei *Cryptophagidae* italiani. *Entomologica*, Bari, 19: 81-96.
- PACE R., 1977 - Quindici nuove specie di Stafilinidi ipogei dell'Italia centro-meridionale. *Redia*, 60: 125-177.
- PARDO ALCAIDE A., 1961 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXXI. *Coleoptera* - 16. *Lycidae* y *Malachiidae* de los Montes Pollino y Aspromonte (Italia meridionale). *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, XVII (3): 1-8.
- PARDO ALCAIDE A., 1967 - Notas sobre *Malachiidae* del Mediterraneo Occidental (*Col.*) V. *Mem. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 15: 97-104.
- PIEROTTI H., 1976 - Ritrovamento dell'*Aphodius ragusae* Reitt. in Basilicata e in Sicilia. *Lav. Soc. Ven. Sc. nat.*, 1: 37-41.
- PIEROTTI H., 1977 - Contributo alla conoscenza degli *Aphodius* della Calabria e del Pollino. *Boll. Soc. ent. ital.*, 109: 173-198.
- PITTINO R., 1979 - Note su alcuni Coleotteri *Scarabaeoidea Laparosticta* della fauna italiana. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 34: 32-41.



- POGGI R., 1984 - Note su alcuni *Pselaphidae* paleartici, con descrizione di *Bryaxis pescarolo* n. sp. delle Alpi Pennine. *Boll. Soc. ent. ital.*, 116: 89-95.
- PORTA A., 1934 - *Fauna Coleopterorum Italica*. Supplementum 1°. Stab. Tipogr. Piacentino, Piacenza, 208 pp.
- PORTA A., 1949 - *Fauna Coleopterorum Italica*. Supplementum 2°. Stab. Tipogr. Soc. An. G. Gandolfi, Sanremo, 386 pp.
- REGALIN R., 1980 - Le specie italiane del genere *Labidostomis* Redtenbacher. *Mem. Soc. ent. ital.*, 59: 37-48.
- RUFFO S., 1964 a - Contributi alla conoscenza della distribuzione dei Coelotteri Crisomelidi nella Regione Appenninica. I. *Orsodacnini*, *Donaciini*, *Criocerini*. *Mem. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 12: 41-96.
- RUFFO S., 1964 b - Contributo alla conoscenza della distribuzione dei Coleotteri Crisomelidi nella Regione Appenninica. 2. *Alticini*: generi *Sphaeroderma*, *Argopus*. *Mem. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 12: 97-106.
- SAMA G., 1979 - Note ecologiche e geonemiche su alcuni Buprestidi italiani. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 34: 16-17.
- SANFILIPPO N., 1955 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XVII. *Coleoptera* - 7. *Dytiscidae*, *Gyrinidae*. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VII (14): 1-4.
- SCHATZMAYR A., 1943 - Appunti coleotterologici. *Natura*, Milano, 34: 135-136.
- SCHERPPELTZ O., 1956 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXII. *Coleoptera* - 4. Neue Kurzflügler aus Suditalien (*Col.*, *Staphylinidae*). *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VIII (10): 1-33.
- SMETANA A., 1954 - Ein Beitrag zur Kenntnis der italienischen *Philonthus* und *Gabrius*-Arten. *Ent. Tidskr.*, 75 (1): 39-43.
- TAMANINI L., 1955 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XIV. *Coleoptera* - 4. *Catopidae*, *Liodidae*, *Scaphidiidae*, *Silphidae*. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VI (1): 1-19.
- TASSI F., 1966 a - Su alcuni Buprestidi italiani nuovi o particolarmente interessanti. *Boll. Soc. ent. ital.*, 96: 17-27.
- TASSI F., 1966 b - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXXII. *Coleoptera* 17. *Cerambycidae*. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, XVII (6): 1-65.
- TASSI F., 1970 - Alcuni reperti interessanti dai Monti della Laga. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 25: 101-106.
- VIENNA P., 1971 - Gli *Histeridae* del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. *Mem. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 19: 267-301.
- VIENNA P., 1980 - *Coleoptera Histeridae*. Fauna d'Italia. XVI. Ed. Calderini, Bologna, 386 pp.
- ZAMPETTI M. F., 1979 - Note sulla geonomia di alcuni Coleotteri Clavicorni. *Boll. Soc. ent. ital.*, 111: 96-97.
- ZAMPETTI M. F., 1982 - Posizione sistematica di alcune specie appartenenti al genere *Brychidius* Schilsky. *Boll. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 8: 383-410.
- ZANETTI A., 1977 - Due nuove specie di *Staphilinidi* (*Col.*) dell'Appennino. *Boll. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 4: 307-315.
- ZANETTI A., 1978 - Note sulle specie italiane del genere *Acrolocha* Thoms. con descrizione di una nuova specie (*Col. Staphylinidae*). *Boll. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 5: 547-553.
- ZANETTI A., 1982 - Materiali per una revisione degli *Eusphalerum* italiani e centro europei con descrizione di nuove sottospecie e note sinonimiche. *Boll. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 8: 97-156.
- WITTMER W., 1935 - Risultati scientifici delle cacce entomologiche di S.A.R. il Principe ALESSANDRO DELLA TORRE e TASSO in Italia. IV. *Malacodermata* vom M.te Pollino (Lucania). *Boll. Soc. ent. ital.*, 67: 72-76.

Indirizzo dell'Autore: FERNANDO ANGELINI  
via Imperiali, 203  
72021 Francavilla Fontana (Brindisi)