

PAOLO PARENZAN<sup>1</sup> - FRANCESCO PORCELLI<sup>2</sup>

## **I macrolepidotteri italiani. Fauna Lepidopterorum Italiae (Macrolepidoptera) - Addenda et corrigenda. I**

### ABSTRACT

This Addenda & corrigenda reports data about more than five hundred Lepidoptera species related to the Italian fauna. The generic names listed in the main publication were respected despite their changes in very recent publications. This was made in order to make both texts uniform.

Key words: zoogeography, mediterranean area, palearctic, corology, distribution.

### RIASSUNTO

Gli autori precisano ulteriormente lo stato della fauna dei macrolepidotteri italiani fornendo aggiunte e correzioni riguardanti oltre cinquecento specie. I dati sono stati aggiornati sulla base delle più recenti pubblicazioni mantenendo, però, i nomi dei generi presenti nel lavoro principale per favorirne la consultazione.

Parole chiave: zoogeografia, regione mediterranea, paleartide, corologia, distribuzione.

### INTRODUZIONE

A due anni dalla pubblicazione del corpo principale de: "I macrolepidotteri italiani. Fauna Lepidopterorum Italiae (Macrolepidoptera)", è opportuno colmare alcune lacune e rettificare errori piccoli e grandi che sono inevitabili in rassegne così ampie. Con l'occasione, i dati sono stati aggiornati sulla base degli ultimi lavori pubblicati.

Poiché l'aggiornamento delle variazioni nomenclatoriali, derivanti da revisioni sempre più ampie e complete, avrebbe portato a numerose sostituzioni, sono stati mantenuti i nomi pubblicati nel testo principale.

La numerazione delle specie è rimasta inalterata, ma sono indicate alcune variazioni da

---

Dattiloscritto accettato il 12 aprile 2008.

<sup>1</sup>Paolo Parenzan, Via De Ferrariis, 65 - 70124 BARI. E-mail: paolo.parenzan@gmail.com

<sup>2</sup>Francesco Porcelli, DiBCA Via Amendola, 165/A - 70126 BARI. E-mail: porcelli@agr.uniba.it

Per uniformità manteniamo le caratteristiche tipografiche del contributo principale pubblicato su *Phytophaga* Vol XV (2005-2006).

apportare all'indice. La bibliografia riportata nell'allegato in .pdf viene aggiornata e, quando necessario, corretta, sempre conservando la stessa numerazione.

Ringraziamo i molti amici e colleghi che hanno inviato estratti o fotocopie e che hanno aiutato a migliorare il testo comunicando lacune, sviste ed errori rilevati e li invitiamo a continuare in questa gradita opera di revisione nello spirito di una collaborazione nell'interesse dell'argomento trattato.

#### ERRATA

La "Fam. Symtomidae" deve essere eliminata perché compresa nella Fam. Arctiidae. Per uniformità viene inserito anche il settore "Arcipelago ligure", così come sono inserite negli "Arcipelaghi" tutte le isole minori di Toscana, Sardegna e Sicilia, ecc.

#### ADDENDA ALLA LEGENDA

(ALL) = (coll. Alliata, Museo di Terrasini, PA)

(BRT, PRN) = (leg. Bertaccini, coll. Parenzan)

#### ELENCO DELLE SPECIE

2 *Triodia sylvina* (Linnaeus, 1761) (= *kruegeri* Turati, 1910)

*Hepialus kruegeri* è descritta su esemplari della **Sicilia**: Ficuzza (622).

7 *Pharmacis carna* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Veneto**: Monte Pascolet (BL) 1200 m 18.VII.2005 (Teobaldelli *in litt.*).

38 *Postsolenobia juliella* (Rebel, 1919) (= *friulana* Meier, 1957)

La citazione: (2547) va riferita alla Slovenia.

Non ancora segnalata nella **Venezia Giulia**.

49 *Bankesia conspurcatella* (Zeller, 1850) (= *staintoni* Walsingham, 1899)

Presente anche nelle **Marche**: 2001-2008; (3522).

51 *Penestoglossa dardoinella* (Millière, 1864) (= *latiorella* Mann, 1873; *incerta* Millière, 1886)

*Psilotrix latiorella* è descritta su un esemplare della **Sicilia**: Palermo (206 bis). *Psilotrix incerta* è descritta su esemplari della **Lombardia**: Monti di Como (Brianza) (332).

54 *Luffia lapidella* (Goeze, 1783)

Presente anche nelle **Marche**: 2001-2008; (3522).

54 bis *Luffia ferchaultella* (Stephens, 1850) (partenogenetica)

Nota - *Luffia ferchaultella* (Stephens, 1850) (partenogenetica) è specie distinta da *L. lapidella*.

Presente in **Piemonte**: 2001-2008; (3378), e in **Liguria**: 1976-2000; (3183).

61 *Psyche crassiorella* (Bruand, 1850)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (1157 bis).

82 *Epichnopteryx pontbrillantella* (**Bruand, 1858**) (= *turibulella* Fuchs, 1901)

Presente anche in **Piemonte**: 2001-2008; (3539).

88 *Acanthopsyche atra* (**Linnaeus, 1767**) (= *opacella* Herrich-Schäffer, 1846)

Nota - La citazione di *Acanthopsyche atra* per il **Piemonte**: (3378), è da riferire a *A. zelleri* (3539).

89 *Acanthopsyche ecksteini* (**Lederer, 1855**)

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; 2001-2008; (3464 bis).

90 *Acanthopsyche zelleri* (**Mann, 1855**)

Presente anche in **Piemonte**: 2001-2008; (3378).

96 *Leptopterix plumistrella* (**Hübner, 1793**)

Nota - La citazione di *Leptopterix plumistrella* per il **Piemonte**: (3378), è da riferire a *L. dellabeffai* (3539).

107 *Ptilocephala muscella* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)

Presente anche in **Trentino**: 1926-1950; (1053).

109 *Ptilocephala agrostidis* (**Schrank, 1802**)

Presente anche in **Piemonte**: 2001-2008; (3539).

114 *Phalacropterix apiformis* (**Rossi, 1790**) (= *siculella* Bruand, 1853)

*Psyche siculella* è descritta su un maschio della **Sicilia** (121). *Psyche siculella* Bruand è sinonimo di *P. apiformis*: (1555).

115 *Phalacropterix graminifera* (**Geoffroy, 1785**)

Nota - La citazione di *S. fusca* per il **Piemonte**: (1388), è stata erroneamente riferita anche a questa specie in: (3501). Anche le citazioni di *S. fusca* per la **Lombardia** (1388), (1787), il **Trentino** (1388), (1787) ed il **Veneto** (1787), sono state erroneamente riferite a questa specie in: (3500), (3501).

Non segnalata in **Lombardia**, **Trentino** e **Veneto**.

Sola citazione certa per il **Piemonte**: 2001-2005; (3378).

116 *Phalacropterix praezellens* (**Staudinger, 1870**) (= *calberlae* Heylaerts, 1890)

*Psyche calberlae* è descritta su esemplari dei Pirenei e del **Trentino**: Condino (362).

122 *Apterona helicoidella crenulella* (**Bruand, 1853**) (= *paludella* Dannehl, 1929) (bisessuata)

*Apterona paludella* è descritta su esemplari delle aree umide dell'**Alto Adige**: Etschauen (prati lungo l'Adige) 1901, 1902, Andrian (Andriano), Terlan (Terlano), Sigmundskron (Castel Firmiano) (1053).

Presente anche in **Abruzzo**: 1926-1950; (1254 bis).

125 bis *Somabrachys aegrota* (**Klug, 1830**)

Nota - Nuova per la fauna italiana.

Rinvenuta nell'**Arcipelago Siciliano**: 2001-2008; (3491).

130 *Theresimima ampellophaga* (**Bayle-Barelle, 1808**)

Nuovi dati - **Molise**: Fossato (CB) 23.VI.2002 (SCR)

Presente anche nel **Molise**: 2001-2008; (3453 bis).

133 *Adscita italica* (Alberti, 1937)

La citazione per il **Piemonte**: 1976-2005; (3461 bis) è da confermare; probabilmente va riferita a *A. alpina*.

135 *Adscita geryon* (Hübner, 1813)

Riportata per la **Venezia Giulia**: 1926-1950; (1157 bis), citazione molto dubbia.

136 *Adscita albanica* (Naufock, 1926)

Presente anche in **Romagna**: 2001-2008; (3522).

137 *Adscita manni* (Lederer, 1852) (= *crassicornis* Staudinger, 1862; *bellieri* Rambur, 1866)

*Ino bellieri* è descritta su esemplari della **Sicilia** (139\*).

140 *Jordanita notata* (Zeller, 1847)

Presente anche in **Piemonte**: 2001-2008; (3461 ter).

142 *Jordanita chloros* (Hübner, 1813) (= *sepium* Boisduval, 1834)

*Procris sepium* è descritta su esemplari della **Lombardia**: Milano (71\*), (1459).

143 *Jordanita tenuicornis* (Zeller, 1847) (= *turatii* Bartel, 1906)

*Ino Turatii* è descritta su esemplari di Monteforte (**Italia**) (524). Secondo (1310) il cotipo è di Monteforte (**Calabria**), ma esistono solo Monteforte Cilento (Salerno) e Monteforte Irpino (Avellino), entrambi in **Campania**; certamente si tratta di Monteforte Irpino (**Campania**), avendo Bartel ricevuto gli esemplari da Zickert che ha raccolto nell'Avellinese.

149 *Zygaena punctum* Ochsenheimer, 1808 (= *contaminei* Zeller, 1847)

*Zygaena contamini* è descritta su esemplari della **Sicilia**: Messina, Siracusa (109).

Nota - La citazione di *Z. punctum* per il **Piemonte** in: (114 bis<sup>o</sup>) è errata, da riferire a *Z. sarpedon*. Non presente in **Piemonte**: (3539). La nuova segnalazione **Calabria**: Acquatremola in (3501), va riferita alla **Basilicata** e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.

156 *Zygaena erythrus* (Hübner, 1806) (= *minos* Boisduval, 1828; *saportae* Boisduval, 1829)

*Zygaena minos* è descritta su esemplari della **Sicilia** (53). *Zygaena saportae* è stata descritta su esemplari della **Sicilia**, secondo (1812). In realtà *Zygaena saportae* è descritta su esemplari della Francia meridionale: Provençe: (60).

160 *Zygaena orana* Duponchel, 1835 (= *sardoa* Mabille, 1892)

*Zygaena sardoa* è descritta su esemplari della **Sardegna**: (374). *Zygaena sardoa* Mabille è stata descritta su esemplari di Gran Torre, oggi Torregrande (OR); penisola del Sinis: (1969). *Zygaena sardoa* è sinonimo di *Z. orana*: (2621).

Nota - Le citazioni: (2374), (3129), erroneamente riportate per l'**Arcipelago sardo** in (3500), (3501), vanno riferite alla **Sardegna**.

Non presente nell'**Arcipelago sardo**.

163 *Zygaena carniolica* (**Scopoli, 1763**) (= *virginea* Allioni, 1766; *onobrychis* Fabricius, 1794)

*Sphinx virginea* è descritta su esemplari del **Piemonte**: Torino: colle (recte Monte) dei Cappuccini e fiume 'Duriam' (Dora Riparia) E.VII: (6).

Nota - La località Cozzo Vardo, citata erroneamente per la **Calabria** in (3501), va riferita alla **Basilicata**.

166 *Zygaena oxytropis* **Boisduval, 1828**

Nota - La citazione: (3321), erroneamente attribuita al **Veneto**, in (3500), (3501), va riferita alla **Toscana**.

Non ancora segnalata nel **Veneto**.

174 *Zygaena lavandulae* (**Esper, 1783**)

Confermata la presenza in **Piemonte**: 2001-2008; (3461 quater).

177 *Zygaena transalpina* (**Esper, 1782**) (= *astragali* Borkhausen, 1793; *medicaginis* Hübner, 1796)

*Sphinx astragali* è descritta su esemplari dei dintorni di Darmstadt (Germania); Borkhausen precisa che "non posso mantenere il nome transalpina perchè presente anche al di qua delle Alpi, in Germania e anche a Darmstadt" (21 ter). Secondo: (1825), ripreso in: (2047 bis), *Sphinx astragali* sarebbe stata descritta su esemplari della **Lombardia**: prealpi italiane (dintorni del Lago Maggiore). *Sphinx medicaginis* è descritta su esemplari del **Piemonte** (23\*).

180 *Zygaena filipendulae* (**Linnaeus, 1758**)

*Zygaena oxshenheimeri* è descritta su esemplari della **Sicilia**: Siracusa, Convento dei Cappuccini (109). *Zygaena oxshenheimeri* è sinonimo di *Zygaena filipendulae* r. *major* Esper, 1793, nec 1789 (657).

197 *Paranthrene tabaniformis* (**Rottemburg, 1775**) (= *rhingiaeformis* Hübner, 1790)

*Sphinx rhingiaeformis* è descritta su esemplari della **Toscana**: Firenze (14\*), (2612).

200 *Synanthedon sphaeciformis* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)

La citazione: (2142), riportata in (3500), (3501), va riferita al **Lazio**.

Non ancora segnalata in **Umbria**.

207 *Synanthedon melliniformis* (**Laspeyres, 1801**) (= *mimus* Le Cerf, 1922)

*Synanthedon mimus* è descritta su esemplari delle **Marche**: colline di Macerata 300 m (968).

208 *Synanthedon myopaeformis* (**Borkhausen, 1789**) (= *mutillaeformis* Laspeyres, 1801)

*Sesia cruentata* è descritta su un maschio della **Sicilia**: Valle Palla-gutta (recte Valle Corta, PA) (144). *S. cruentata* è ssp. di *S. myopaeformis*.

209 *Synanthedon vespiformis* (**Linnaeus, 1761**) (= *asiliformis* Rottemburg, 1775; *cynipiformis* Esper, 1782).

Nota - La nuova segnalazione per la **Sicilia**: Noto (AG) Bonaccorsi, ex l. su mandorlo: (3501) va corretta in: Aci Bonaccorsi (CT), ex l. su mandorlo.

213 *Synanthedon spuleri* (Fuchs, 1908) (= *schwarzi* Kralicek & Povolny, 1977)

Nota - La nuova segnalazione **Calabria**: Pollino: Monte Cerviero, Acquatemola in (3501), va riferita alla **Basilicata** e corretta in Pollino: Acquatemola (PZ) 1500 m.

225 *Bembecia uroceriformis* (Treitschke, 1834) (= *mamertina* Zeller, 1847; *odyneriformis* Ghiliani, 1852, nec Herrich-Schäffer, 1846; *monedulaeformis* Rambur, 1866; *lecerfi* Oberthür, 1909)

*Sesia mamertina* è descritta su un maschio della **Sicilia**: Messina località il Castellaccio (109). *Sesia odyneriformis* è descritta su esemplari della **Sardegna**: monti (144).

227 *Pyropteron chrysidiformis* (Esper, 1782) (= *haemorroidalis* Cyrillus, 1787; *chalcidiformis* Hübner, 1806; *chalcocnemis* Staudinger, 1856; *rondoui* Siépi, 1909; *lecerfi* Oberthür, 1909)

*Sesia haemorroidalis* è descritta su esemplari della **Puglia** (Japygia) (15).

Nuovi dati - **Puglia**: (ssp. *sicula* Le Cerf) Triggiano (BA): Lama Conte, 15.VI.1981; San Giorgio (BA), 16.VI.1978; Palo del Colle (BA), 20.VI.1995 (PRN).

229 *Pyropteron dorylififormis* (Ochsenheimer, 1808) (= *braconiformis* Ghiliani, 1852)

Presente anche nell'**Arcipelago siciliano**: 1976-2000; (3273).

234 *Pyropteron affinis* (Staudinger, 1856)

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3462 ter).

236 *Chamaesphexia chalciformis* (Esper, 1804)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1901-1925; (1060).

237 *Chamaesphexia schmidtiiiformis* (Freyer, 1836)

Nota - Le citazioni di *C. schmidtiiiformis*: (2917), (2674), riportate erroneamente per il **Trentino** in (3500), vanno riferite alla **Lombardia**.

Non ancora segnalata nel **Trentino**.

Presente in **Lombardia**: 1901-1925; (2674). (2917).

242 *Chamaesphexia osmiaeformis* (Herrich-Schäffer, 1848) (= *stelidiformis* Zeller, 1847, nec Freyer, 1836)

*Sesia osmiaeformis* è descritta su esemplari della **Sicilia** (Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, 2: 79, Tav. 9, fig. 52) (100\*). In (2612) è riportato che *Sesia osmiaeformis* è stata descritta su esemplari d'**Italia**.

249 *Chamaesphexia masariformis* (Ochsenheimer, 1808) (= *odyneriformis* Herrich-Schäffer, 1846; *loewii* Zeller, 1847)

Nota - La citazione: (3273), riportata erroneamente per il **Veneto** in: (3500), (3501), va riferita al **Friuli**.

Non ancora segnalata per il **Veneto**.

Presente anche in **Friuli**: 1951-1975; (3273).

251 *Chamaesphacia anthraciformis* (Rambur, 1832) (= *foeniformis* Herrich-Schäffer, 1846; *oryssiformis* Herrich-Schäffer, 1846; *seitzi* Püngeler, 1905; *reisseri* Capuse, 1973)

*Sesia foeniformis* è descritta su esemplari della **Sardegna** (100\*), (2612).

259 *Lamellocossus terebra* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La località Merna (GO): (3007), oggi è in Slovenia.

Non ancora segnalata nella **Venezia Giulia**.

265 *Stygioides colchica* (Herrich-Schäffer, 1851)

Presente anche in **Abruzzo**: 2001-2008; (3493).

268 *Thyris fenestrella* (Scopoli, 1763) (= *fenestrina* Denis & Schiffermüller, 1775; *marica* Cyrillus, 1787)

Nota - La nuova segnalazione **Calabria**: Monte Cerviero, Acquatremola in (3501), va riferita alla **Basilicata** e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.

270 *Poecilocampa alpina* (Frey & Wulschlegel, 1874) (= *canensis* Millière, 1875)

Presente anche in **Lombardia**: 2001-2008; (3378 bis).

271 *Trichiura crataegi* (Linnaeus, 1758)

Nuovi dati - **Abruzzo**: Montereale (AQ) 1000 m 23.IX.2006 (Teobaldelli *in litt.*).

**Calabria**: Pollino: Monte Cerviero: Acquaformosa 14.IX.1979 (PRN).

277 *Malacosoma castrensis* (Linnaeus, 1758)

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3462 ter). Confermata la presenza in **Liguria**: 2001-2008; (3477).

278 *Malacosoma franconica* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche in **Romagna**: 2001-2008; (935).

279 *Malacosoma alpicola* Staudinger, 1870

Presente anche in **Lombardia**: 1901-1925; (820); (1053); e nel **Trentino**: 1901-1925; 1976-2000; (2475); (3293).

Per un refuso non era stata riportata per queste regioni in: (3500), (3501).

281 *Lasiocampa quercus* (Linnaeus, 1758)

Nota - La nuova segnalazione **Calabria**: Pollino: Monte Cerviero, Acquatremola in (3501), va riferita alla **Basilicata** e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.

Nuovi dati - **Liguria**: Capo Mele: Andora (SV), 95 m, 31.VII.1976, ex o. 6.IX.1992 (CMR, PRN).

286 *Dendrolimus pini* (Linnaeus, 1758)

Nuovi dati - **Basilicata**: Massiccio del Pollino: Lago della Duglia, 1600 m, 15.VI.1983 (ADD).

291 *Gastropacha quercifolia* (Linnaeus, 1758)

Le citazioni: (2142), (2732), riportate per l'**Umbria** in (3500), (3501), vanno riferite al **Lazio**.

Non ancora segnalata in **Umbria**.

292 *Gastropacha populifolia* (Esper, 1782)

Nuovi dati - **Basilicata**: Policoro (MT): bosco Pantano 14.VI.2000 (SCR).

298 *Saturnia pavoniella* (Scopoli, 1763)

Nota - La nuova località per la **Sicilia**: Castrogliastro, riportata in (3501), va corretta in Cozzo Ogliastris (SR).

301 *Antheraea yamamai* (Guérin-Ménéville, 1861)

Il genere è *Antheraea* e non *Antherea*.

305 *Lemonia taraxaci* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Sicilia**: Caronia (ME), 304 m, X.1926, X.1928; Palermo: Villa Alliata 9.V.1932 (ALL).

310 *Laotioe populi* (Linnaeus, 1758)

Nota - La citazione Pollino: Acquatemola in (2923) va riferita alla **Basilicata** e non alla **Calabria**.

312 *Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758)

Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 1951-1975; (2110).

317 *Hemaris fuciformis* (Linnaeus, 1758) (= *variegata* Allioni, 1766)

*Sphinx variegata* è descritta su esemplari del **Piemonte**: Torino: colle dei Cappuccini e fiume 'Duriam' (Dora Riparia) (6).

Nota - È riportata erroneamente in (3501) come sinonimo di *H. tityus* e descritta da Müller, che è il depositario della collezione studiata da Allioni.

319 *Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758)

Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 1951-1975; (2110).

320 *Daphnis nerii* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le citazioni per l'**Umbria**: (2142), (2732), riportate in (3500), (3501), vanno riferite al **Lazio**.

Non ancora segnalata in **Umbria**.

321 *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772)

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis).

322 *Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le citazioni in (2142), (2732), (2894), riportate per l'**Umbria** in (3500), (3501), vanno riferite al **Lazio**.

Non ancora segnalata in **Umbria**.

Presente anche nell'**Arcipelago ligure**: 1801-1850 (110).

328 *Hyles livornica* (Esper, 1780)

Nota - La nuova segnalazione **Calabria**: Acquatemola in (3501), va riferita alla **Basilicata** e corretta in Pollino: Acquatemola (PZ) 1500 m.

329 *Deilephila elpenor* (Linnaeus, 1758)

Nuovi dati - **Sicilia**: Castelbuono (PA) VII.1926, Casteldaccia (PA) VII.1926, Palermo: Villa Alliata IX.1929 (ALL).

335 *Paysandisia archon* (Burmeister, 1880)

Presente anche nel **Lazio**: 2001-2008; (3324 bis), e in **Sicilia**: (2001-2008); (3324 bis).

337 *Carcharodus alceae* (Esper, 1780)

Nuovi dati - **Puglia**: Foggiano (TA) 40-80 m 3.VI.1967, 7.VI.1968, fiume Tara (TA) 0-2 m 20.VI.1973, 16.VIII.1974, Gravina in Puglia (BA) 338 m 23.VI.1968, Ruvo di Puglia (BA) 250 m 3.V e 5.VI.1964 (PRN).

346 *Pyrgus sidae* (Esper, 1782)

Nota - La citazione generica per il **Friuli**: (2054) riportata in (3500), (3501), è dovuta ad una svista. È citata genericamente per la **Venezia Giulia**: (2054), (2448 bis), dati errati in quanto la specie non è presente nel **Friuli** e nella **Venezia Giulia** (Morandini *in litt.*).

350 *Pyrgus malvae* (Linnaeus, 1758) (= *alveolus* Hübner, 1775)

Presente anche in **Alto Adige**: 1901-1925; (1053).

Segnalazione corretta (Balletto *in litt.*). Tutte le altre citazioni sono da riferire a *P. malvoides*.

352 *Pyrgus serratulae* (Rambur, 1839)

Nota - La citazione per la **Toscana** (3383) è dovuta ad errata identificazione (Balletto *in litt.*).

Non presente in **Toscana**.

355 *Pyrgus cirsii* (Rambur, 1839) (= *fritillum* Hübner, 1775)

Nota - le citazioni di *P. cirsii* per la **Valle d'Aosta**: (2165), (2365), sono da riferire a *P. carlinae* (Balletto *in litt.*).

Non presente in **Valle d'Aosta**.

356 *Pyrgus armoricanus* (Oberthür, 1910)

Nota - La citazione: (3440), erroneamente riportata per l'**Arcipelago sardo** in (3500), (3501); va riferita alla **Sardegna**.

Non ancora segnalata nell'**Arcipelago sardo**.

Nuovi dati - **Calabria**: Monte Moschereto (Civita, CS) 600-700 m 25.VIII.1975 (PRN).

357 *Pyrgus alveus* (Hübner, 1803)

Nota - Le citazioni di *P. alveus* per la **Sicilia** sono da riferire a *P. armoricanus* (Balletto *in litt.*)

359 *Pyrgus centralitaliae* (Verity, 1920)

Nota - In (3501) è stata erroneamente riportato che: "La citazione (*alveus* v. *fritillum*) provincia di Cuneo: (359), potrebbe essere riferibile a *P. centralitaliae*, che nelle Alpi occidentali è simpatico con *P. alveus* (Balletto *in litt.*)". *P. centralitaliae* non è presente in **Italia settentrionale** (Balletto *in litt.*). Le citazioni per la **Sicilia**: 1801-1900; (109); (343); vanno riferite a *P. armoricanus* (Balletto *in litt.*).

Non presente in **Sicilia**.

362 *Pyrgus warrenensis* (Verity, 1928)

Presente anche in **Lombardia**: 1926-1950; (1122); (1363).

366 *Thymelicus lineola* (Ochsenheimer, 1808)

Nota - La località Pollino: Monte Cerviero, Acquatemola, citata in (3501), va corretta in Pollino: Acquatemola (PZ) 1500 m.

Nuovi dati - **Puglia**: Locorotondo (BA) 400 m, Buffoluto (TA) 10 m, Statte (TA) 100-150 m 13.V.1968, 17.IX.1971, Faggiano (TA) 40-80 m 3.VI.1967, 2.IV e 7.VI.1968, fiume Tara (TA) 0-2 m 20.VI.1973, 16.VIII.1974, Foresta di Mercadante (BA) 400-450 m 9.VII.1967, 9.VI.1974, Gravina in Puglia (BA) 338 m 23.VI.1968, Ruvo di Puglia (BA) 250 m 3.V.1964, dintorni di Bari 22.VI.1965 (PRN).

367 *Thymelicus sylvestris* (**Poda, 1761**) (= *flava* Brünnich, 1763; *thaumas* Hufnagel, 1766; *linea* Allioni, 1766)

*Papilio linea* è descritta su esemplari del **Piemonte**: Torino: colle dei Cappuccini e fiume 'Duriam' (Dora Riparia) (6).

369 *Hesperia comma* (**Linnaeus, 1758**)

Presente anche nell'**Arcipelago ligure**: 1926-1950; (1363); ed in **Puglia**: 2001-2008; (3480).

370 *Ochlodes sylvanus* (**Esper, 1777**) (= *venata* Bremer & Grey, 1857)

Nota - Il nome prioritario è *sylvanus* e *venata* suo sinonimo.

Nuovi dati - **Calabria**: Gambarie (Aspromonte: RC) 1100-1300 m 8.VIII.1971, Oriolo (CS) 300-400 m 9.VI.1978 (PRN).

372 *Gegenes nostradamus* (**Fabricius, 1793**)

Nota - La citazione: (1676), che per una svista è stata riferita al **Piemonte** in (3500), va riportata all'**Emilia**.

La specie non è mai stata segnalata in **Piemonte**.

374 *Zerynthia polyxena* (**Denis & Schiffermüller, 1775**) (= *aristolochiae* de Prunner, 1798; *creusa* Meigen, 1828)

*Thais creusa* è descritta su esemplari della **Toscana**: Firenze (51\*), (1258). *Thais creusa* Meigen, 1829 è stata descritta su esemplari di **Italia**: (1411).

385 (-) *Leptidea duponcheli* (**Staudinger, 1871**)

Nota - Le citazioni per il **Piemonte** e la **Liguria** sono da riferire a *L. sinapis*. *Leptidea duponcheli* non fa parte della fauna italiana (Balletto *in litt.*)

Non presente in **Piemonte** e **Liguria**.

387 *Anthocharis cardamines* (**Linnaeus, 1758**)

Nuovi dati - **Puglia**: Mellitto (BA) 350 m 4.VI.1979, Gravina in Puglia (BA) 338 m 6.V.1980 (PRN). **Calabria**: Piana Caruso (Corigliano Calabro, CS) 750-900 m 9.V.1981; Monte Moschereto (Civita, CS) 600-900 m 6.VI.1980; Civita (CS) 450 m 20.IV.1975, 20.V.1979; Colle del Dragone (Massiccio del Pollino, CS) 1400-1500 m 27.IV.1975 (PRN).

388 *Anthocharis belia* (**Linnaeus, 1767**)

Nota - Le segnalazioni di *A. belia* per la **Liguria** vanno riferite a *E. cramerii* e non a *A. euphenoides*; le segnalazioni di *A. belia* per l'**Emilia** vanno riferite a *E. ausonia* e non a *A. euphenoides*; le segnalazioni di *A. eupheno* per la **Toscana** vanno riferite a *E. ausonia* e non a

*A. euphenoides* (Balletto *in litt.*).

389 *Anthocharis euphenoides* Staudinger, 1869

Nota - Le citazioni: (1411), (1989), erroneamente riportate per la **Lombardia** in (3500), (3501), vanno riferite alla Svizzera; le citazioni per il **Veneto** di *A. eupheno*: (98), (161), e di *A. euphenoides*: (367), sono da riferire a *E. ausonia*; le citazioni per la **Toscana** di *A. eupheno* (177), (206), riportate come *euphenoides* in: (344), (437), e le citazioni generiche di *A. euphenoides* in (218), (319), sono da riferire a *E. ausonia* (Balletto *in litt.*).

Non presente in **Lombardia**, nel **Veneto** ed in **Toscana**.

Presente anche in **Alto Adige**: 1926-1950; (1411).

392 *Euchloe crameri* Butler, 1869 (= *simplonia* Freyer, 1828; *occidentalis* Verity, 1908)

Nota - Le citazioni per la **Lombardia** di *E. ausonia crameri* in: (1137), (1411), sono da riferire a *E. ausonia* (Balletto *in litt.*).

Non presente in **Lombardia**.

Presente anche in **Romagna**: 1976-2008; (3077); (3429 bis).

394 *Euchloë ausonia* (Hübner, 1804) (= *romana* Calberla, 1887)

Nota - Quasi tutte le citazioni di *E. ausonia* per la **Liguria** vanno riferite a *E. crameri*; in **Liguria** *E. ausonia* è presente solo da La Spezia ad est (2153). La citazione di *E. belia* Cr. e della sua var. *ausonia* Hb. per il **Trentino** in: (654) è dubbia.

Confermata la presenza in **Lombardia**: 1926-1950; (1411); **Liguria**: 1976-2000; (2153).

398 *Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758)

Nota - La nuova segnalazione **Calabria**: Pollino: Acquatremola in (3501), va riferita alla **Basilicata** e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.

401 *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758)

Nota - La nuova segnalazione **Calabria**: Pollino: Acquatremola in (3501), va riferita alla **Basilicata** e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.

Nuovi dati - **Puglia**: Laghi di Alimini (LE) 30 m 3.VII.1968, Salina Grande (TA) 0 m 28.III.1975 (PRN). **Basilicata**: Fosso Bifurno (Serra di Calvello, PZ) 1200 m 15.VII.1977, Casa del Conte (Massiccio del Pollino, PZ), 1100 m, 19.VI.1982, Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).

402 *Pieris ergane* (Geyer, 1828) (= *narcaea* Freyer, 1828)

*Pontia narcaea* è descritta su esemplari della Dalmazia e della **Toscana**: Firenze (56\*) (73).

*Pontia rapae* var. *minor* è descritta su esemplari di **Calabria**: Aspromonte, **Campania**: Matese e **Abruzzo**: Gran Sasso (70). Erroneamente in (2581) è riportato che la ssp. *minor* Costa è stata descritta su esemplari della **Toscana**.

Nota - Si hanno antiche citazioni per la **Toscana**, errate: (177), (355); Stefanelli riconosce errata la segnalazione per i dintorni di Firenze: (218), (319); nei dintorni di Firenze certamente non esiste: (1411). La citazione: 1801-1850; (70), è riportata erroneamente anche per il **Molise**, in (3501).

Sola citazione valida per la **Toscana**: Cetona (SI): Monte Cetona, 1000-1100 m,

10.IX.2004 (3462 bis).

Per il **Molise** è citata solo in (3259).

403 *Pieris napi* (Linnaeus, 1758)

Nuovi dati - **Basilicata**: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).  
**Calabria**: Villapiana (CS) 5 m 30.IV.1967, Monte Moschereto (Civita, CS) 600-900 m 24.IV.1977, Gambarie (Aspromonte: RC) 1100-1300 m 8.VIII.1971, Corigliano: Piana Caruso 750-900 m 9.V.1981 (PRN).

405 *Pieris callidice* (Hübner, 1800)

Nota - La località Val Ferret 16.VIII.1958 (3501), erroneamente attribuita al **Piemonte**, va riferita alla **Valle d'Aosta**.

406. *Pieris daplidice* (Linnaeus, 1758)

Nota - La citazione per il **Piemonte**: 1751-1800: (20), va riferita a *P. edusa*. La sola citazione attendibile per il **Piemonte** è: 1901-1925; (900).

407 *Pieris edusa* (Fabricius, 1777) (= *daplidice* auct.)

Nota - La citazione per la **Liguria** di *P. edusa*: (3183), va riferita a *P. daplidice* (Balletto *in litt.*).

Nuovi dati - **Basilicata**: Cancellara (PZ) 839 m 31.VII.1968, Valle del fiume Camastra (PZ) 350-600 m 29.IX.1975, 29.V.1976, Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).

411 *Colias croceus* (Geoffroy, 1785) (= *edusa* Fabricius, 1787)

Nota - La località Grottarossa 12.V.1988 (3501), erroneamente attribuita alla **Sicilia**, va riferita al **Lazio**.

414 *Colias hyale* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le citazioni per la **Liguria** di *C. hyale* sono da riferire a *C. alfacariensis*; la citazione di *C. hyale* per l'**Arcipelago toscano** in (1933), è dubbia, da verificare; le citazioni di *C. hyale* per la **Sardegna** vanno riportate a *C. crocea* f. *helice* (Balletto *in litt.*) e non a *C. alfacariensis*, come detto in (3500), (3501).

Non presente in **Liguria**.

415 *Colias alfacariensis* Ribbe, 1905 (= *australis* Verity, 1911)

Nuovi dati - **Basilicata**: Valle del fiume Camastra (PZ) 350-600 m 1,V, 9.VII. 29.IX.1975, Cancellara (PZ) 800 m 31.VII.1968, Piano Ruggio (Massiccio del Pollino, PZ) 1600-1650 m 19.VI.1976, 22.VII.1979, 15.V, 8.VI.1980, 6.VII.1981, 20.VI.1982 (PRN).

416 *Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758)

Nota - La nuova segnalazione **Calabria**: Pollino: Acquatremola in (3501), va riferita alla **Basilicata** e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.

Nuovi dati - **Basilicata**: Terranova di Pollino (PZ): sorgente Acquafredda, 1300 m, 19.VI.1982 (PRN).

417 *Gonepteryx cleopatra* (Linnaeus, 1767)

Nuovi dati - **Puglia**: Laghi di Alimini (LE) 3.VII.1968 (PRN).

Presente nell'**Arcipelago ligure**: 1926-1950 (1411).

419 *Lycaena phlaeas* (Linnaeus, 1761)

Nuovi dati - **Puglia**: gravina di Massafra (TA) 100-150 m 18.V e 18.VI.1971, Statte (TA) 100-150 m 13.V.1968, 17.IX.1971, Faggiano (TA) 40-80 m 3.VI.1967, 2.IV e 7.VI.1968, Bosco San Giacomo (Mottola, TA) 350-400 m 22.VII.1967, 23.V.1972, Mellitto (BA) 350 m 4.VI.1979, 27.IV.1980, Laghi di Alimini (LE) 30 m 3.VII.1968 (PRN).

**Basilicata**: Venosa (PZ): località Loreto 350-400 m 12.VIII.1969 (PRN).

421 *Lycaena dispar* (Haworth, 1803)

Nota - Le citazioni di *Lycaena dispar* per la **Basilicata**: Pollino: Madonna del Pollino 23.VII.1979 (3501), e per la **Calabria**: Soverato (CZ) (2650), che sono state attribuite a *L. dispar* in (3501), vanno riferite a *L. italica*.

*Lycaena dispar* non è presente in **Italia meridionale**.

Presente anche in **Liguria**: (2691 bis).

422 *Lycaena virgaureae* (Linnaeus, 1758)

Nota - La citazione: (359) va riferita all'**Abruzzo** e non alla **Campania** come riportato erroneamente in (3501). Il Monte Faito citato in (359) è situato in provincia de L'Aquila (**Abruzzo**) e non è il Monte Faito presso Castellammare di Stabia (NA, **Campania**).

425 *Lycaena alciphron* (Rottemburg, 1775) (= *hipponoë* Bergstrasser, 1779)

Nota - La nuova segnalazione **Calabria**: Pollino: Acquatremola in (3501), va riferita alla **Basilicata** e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.

426 *Lycaena hippothoë* (Linnaeus, 1761)

Nota - Le citazioni per la **Liguria** e l'**Alto Adige** di *L. eurydice*, *L. chryseis*, *L. hippothoë*, vanno riferire a *L. eurydame*; nel **Veneto** è presente solo ad Est del Piave (Balletto *in litt.*). La citazione di *L. hippothoë* per la **Venezia Giulia**: (1392), va riferita all'Istria (Slovenia-Croazia).

Non ancora segnalata nella **Venezia Giulia**.

Presente nel **Veneto**: (1926-1950); (1392).

427 *Lycaena eurydame* (Hoffmannsegg, 1806) (= *columbanus* de Prunner, 1798; (?) *xenophon* de Loche, 1801; *eurybia* Ochseneheimer, 1808)

*Papilio columbanus* è descritto su esemplari dei monti del **Piemonte**: "In montibus rarus" (26). *Papilio xenophon* è descritto su esemplari delle Alpi di **Piemonte** ad alta quota (27). *Papilio eurybia* è descritta su esemplari del **Piemonte** e della Svizzera meridionale (31). Il *P. columbanus* De Prunner è stato descritto probabilmente su esemplari di San Colombano, frazione di Exilles in Val di Susa (1440).

428 *Lycaena italica* (Calberla, 1887)

Nota - La citazione: (359) va riferita all'**Abruzzo** e non alla **Campania** come riportato erroneamente in (3501). Il Monte Faito citato in (359) è situato in provincia de L'Aquila (**Abruzzo**) e non è il Monte Faito presso Castellammare di Stabia (NA, **Campania**).

431 *Thecla betulae* (Linnaeus, 1758)

Presente anche in **Puglia**: 1976-2000; (3480).

432 *Favonius quercus* (Linnaeus, 1758)

Nuovi dati - **Basilicata**: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).

**Calabria**: Monte Moschereto (Civita, CS) 600-900 m 20.VII.1980 (PRN).

435 *Callophrys rubi* (Linnaeus, 1758)

Nota - La nuova segnalazione **Calabria**: Pollino: Acquatremola in (3501), va riferita alla **Basilicata** e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.

442 *Lampides boeticus* (Linnaeus, 1767)

Nuovi dati - **Basilicata**: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis).

443 *Cacyreus marshalli* Butler, 1898

Presente anche nella **Valle d'Aosta**: 2001-2008; (3505), ed in **Alto Adige**: 2001-2008; (3494).

444 *Leptotes pirithous* (Linnaeus, 1767) (= *telicanus* Lang, 1789)

Nuovi dati - **Basilicata**: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).

450 *Cupido osiris* (Meigen, 1829) (= *saportae* Duponchel, 1832; *sebrus* auct.)

Nota - La citazione per la **Lombardia**: (467), va riferita a *C. minimus* (Balletto *in litt.*).

Non ancora segnalata in **Lombardia**.

452 *Cupido argiades* (Pallas, 1771)

Confermata la presenza in **Puglia**: 2001-2008; (3480).

455 *Pseudophilotes baton* (Bergsträsser, 1779)

Presente anche nell'**Arcipelago siciliano**: 1976-2000; (2912).

460 - *Scolitantides orion* (Pallas, 1771)

Il genere corretto è *Scolitantides* e non *Scoliantides*.

463 *Iolana iolas* (Ochsenheimer, 1816)

Confermata la presenza in **Puglia**: 1951-2000; (3480).

464 *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758)

Nuovi dati - **Lombardia**: Madesimo (SO): Valle San Giacomo 1700 m 5.VII.1967 (PRN). **Basilicata**: Piano Ruggio (Massiccio del Pollino, PZ) 1600-1650 m 6.VII.1981, 20.VI.1982 (PRN).

Confermata la presenza in **Puglia**: 2001-2008; (3480).

466 *Maculinea nausithous* (Bergsträsser, 1779) (= *arcas* Rottemburg, 1775)

Nota - Le citazioni di *M. arcas* e *M. nausithous* per **Piemonte**, **Lombardia**, **Lazio** e **Abruzzo** sono da riferire a *M. rebeli* (Balletto *in litt.*).

467 *Maculinea alcon* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - *Lycena alcon* var. *monticola* è descritta su esemplari di Caucaso, Svizzera, Ponto e ? Lidia (448). Fra i tipi della var. *monticola* depositati nella collezione del Museum für Naturkunde della Humboldt Universität di Berlino è presente un esemplare con etichetta

scritta a mano: "Macugnaga/m.(ihi)" (**Piemonte**) (di carta bruna), ed un nuovo cartellino stampato "Typus" (recto rosso, verso bianco) (3208).

Nota - Le citazioni di *M.alcon* per la **Liguria**, la **Valle d'Aosta**, il **Trentino**, l' **Alto Adige**, il **Veneto**, l'**Emilia**, la **Toscana**, le **Marche**, il **Lazio**, l'**Abruzzo** ed il **Molise**, sono da riferire a *M. rebeli* (Balletto *in litt.*). *M.alcon* è presente solo nelle seguenti regioni:

**Piemonte**: (1801-1850); 1851-2005; (114); (3378); **Lombardia**: 1901-2005; (795); (3393); **Friuli**: 1976-2005; (3462 ter); (3464 bis); **Venezia Giulia**: 1851-1925; (650); (935);

468 *Maculinea rebeli* (Hirschke, 1904)

Presente in: **Valle d'Aosta**: 1976-2000; (2365); (3145); **Piemonte**: 1751-1800; 1976-2005; (26); (3378); **Lombardia**: 1976-2000; (2995); (3218); **Trentino**: 1851-1950; 1976-2000; (398); (3218); **Alto Adige**: 1851-1975; 2001-2005; (239); (3423); **Veneto**: 1851-1900; 1951-1975; 2001-2005; (1038); (3423); **Liguria**: 1951-2000; (1727); (3183); **Emilia**: 1851-2000; (246); (3059); **Toscana**: 1926-1950; 1976-2000; (1392); (2691 bis); **Marche**: 1901-1975; 2001-2005; (1016); (3423); **Lazio**: 1901-2005; (902); (3423); **Abruzzo**: 1851-1900; 1926-2000; (344); (3180); **Molise**: 1976-2000; (2142).

470 *Plebejus trappi* (Verity, 1927)

Nota - La citazione generica per il **Trentino**: (2774), è da riferire all'**Alto Adige**.

Non ancora segnalata nel **Trentino**.

472 *Lycaeides idas* (Linnaeus, 1761)

Nota - La citazione per la **Puglia**: (3480), va riferita a *L. abetonica*.

473 *Lycaeides abetonica* (Verity, 1911) (= *argellus* Turati, 1911)

Presente anche in **Puglia**, riportata come *Plebejus idas*: 1976-2008; (3480).

478 *Agriades glandon* (de Prunner, 1798) (= *orbitolus* Esper, 1800)

*Papilio orbitolus* è descritta su esemplari delle Alpi del Tirolo e del **Piemonte** (9\*), (31).

481 *Eumedonia eumedon* (Esper, 1780) (= *chiron* Rottemburg, 1775; *belinus* De Prunner, 1798)

Confermata la presenza in **Puglia**: 1976-2000; (3480).

482 *Aricia cramera* (Eschscholtz, 1821)

Sarebbe presente anche in **Sicilia**, in quanto *Lycaena astrarche* ssp. *ornata* var. *lilliputana* è stata descritta da Oberthür su esemplari di **Sicilia**: (1054); da confermare.

483 *Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *astrarche* Bergsträsser, 1779)

Nuovi dati - **Puglia**: Ruvo di Puglia (BA) 220 m 3.V.1964, Bitritto (BA) 102 m 23.IV.1983, Noci (BA) 400 m 29.VI.1997, Statte (TA) 100-150 m 1.V.1968 (PRN). **Basilicata**: Venosa (PZ): località Loreto 350-400 m 15.VIII.1959 (PRN).

486 *Aricia nicias* (Meigen, 1830) (= *donzelii* Boisduval, 1832)

Presente anche nel **Trentino**: 1901-1950; (654), (1053).

488 *Polyommatus escheri* (Hübner, 1823)

- Confermata la presenza in **Puglia**: 1976-2008; (3480).
- 489 *Polyommatus hispanus* (**Herrich-Schäffer, 1852**)  
Presente anche nell'**Arcipelago ligure**: 1926-1950 (1392).
- 490 *Polyommatus amandus* (**Schneider, 1792**) (= *icarius* Esper, post 1792)  
Confermata la presenza in **Puglia**: 1976-2008; (3480).
- 492 *Polyommatus icarus* (**Rottemburg, 1775**) (= *alexis* Denis & Schiffermüller, 1775)  
Nuovi dati - **Puglia**: Statte (TA) 100-150 m 13.V.1968; gravina di Massafra (TA) 100-150 m 18.V.1971; Gravina in Puglia (BA) 338 m 18.VI.1968, 23.VI.1968; Ruvo di Puglia (BA) 250 m 5.V.1964; Bari: Campus Fac. Agraria, 20-30 m 30.VI.1965, 5.VI.1979 (PRN).  
**Basilicata**: Pollino: Casa del Conte (PZ), 1100 m, 19.VI.1982; Cropani (PZ) 650 m 25.IX.1981; Venosa (PZ): località Loreto 350-400 m 10.VIII.1958; valle del fiume Basento (MT/PZ) 28.VII.1974 (PRN).
- 510 *Libythea celtis* (**Laicharting, 1782**)  
Presente anche in **Romagna**: 2001-2008; (3522).
- 511 *Argynnis paphia* (**Linnaeus, 1758**)  
Nota - Le località Cozzo Vardo e Acquatremola, citate erroneamente per la **Calabria** in (3501), vanno riferite alla **Basilicata**.  
Nuovi dati - **Basilicata**: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).
- 512 *Argynnis pandora* (**Denis & Schiffermüller, 1775**) (= *maja* Cramer, 1776)  
Nuovi dati - **Basilicata**: Monte Caperino (PZ) 1100-1300 m 9.VII e 11.VIII.1975 (PRN).
- 513 *Argynnis aglaja* (**Linnaeus, 1758**) (= *charlotta* Haworth, 1802)  
Nota - Le località Cozzo Vardo e Acquatremola, citate erroneamente per la **Calabria** in (3501), vanno riferite alla **Basilicata**.
- 514 *Argynnis adippe* (**Denis & Schiffermüller, 1775**) (= *esperi* Verity, 1913)  
*Argynnis esperi* è descritta su esemplari della **Toscana**: Firenze (783).  
Nuovi dati - **Basilicata**: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).
- 515 *Argynnis niobe* (**Linnaeus, 1758**)  
Nota - La località Cozzo Vardo, citata erroneamente per la **Calabria** in (3501), va riferita alla **Basilicata**.
- 517 *Issoria lathonia* (**Linnaeus, 1758**)  
Nuovi dati - **Basilicata**: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).
- 519 *Brenthis daphne* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)  
Nota - La nuova segnalazione **Calabria**: Pollino: Acquatremola in (3501), va riferita alla **Basilicata** e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.  
Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3383), (3464 bis).
- 521 *Boloria eunomia* (**Esper, 1799**)  
Una citazione generica per il **Trentino**: (654), è molto probabilmente errata.
- 524 *Boloria selene* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)  
Nuovi dati - **Friuli**: Martignacco (UD) 140 m 23.VII.1967, Tirano (UD) 1300 m

16.VIII.1973 (BRT, PRN)

527 bis (-) *Boloria aquilonaris* (Stichel, 1908)

Nota - La citazione di *B. aquilonaris* per l'**Alto Adige**: (3382 bis) va riferita a *B. pales. B. aquilonaris* non fa parte della fauna italiana.

528 *Boloria napaea* (Hoffmannsegg, 1804)

Nuovi dati - **Trentino**: Monte Buffaure (TN) 2100 m 26.VII.1973 (BRT, PRN)

530 *Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758)

Nota - La località Acquatemola, citata erroneamente per la **Calabria** in (3501), va riferita alla **Basilicata**.

Nuovi dati - **Basilicata**: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).

532 *Inachis io* (Linnaeus, 1758)

Nota - La località Acquatemola, citata erroneamente per la **Calabria** in (3501), va riferita alla **Basilicata**.

533 *Aglais urticae* (Linnaeus, 1758)

Nota - La località Acquatemola, citata erroneamente per la **Calabria** in (3501), va riferita alla **Basilicata**.

Nuovi dati - **Basilicata**: Pollino: Casa del Conte (PZ), 1100 m, 19.VI.1982 (PRN).

**Calabria**: Monte Moschereto (CS) 1200 m 16.V.1983 (PRN).

536 *Polygonia egea* (Cramer, 1775) (= *i-album* Esper, (1789))

Nuovi dati - **Basilicata**: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).

537 *Araschnia levana* (Linnaeus, 1758)

Una citazione per il **Lazio**: (1602 bis), è certamente errata. Non è mai stata presente in Italia peninsulare.

538 *Nymphalis antiopa* (Linnaeus, 1758)

Nuovi dati - **Basilicata**: San Severino Lucano: contrada Magnano 800 m 7.VII.1981 (PRN).

539 *Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758)

Nota - La località Acquatemola, citata erroneamente per la **Calabria** in (3501), va riferita alla **Basilicata**.

Nuovi dati - **Basilicata**: Massiccio del Pollino: Piano Ruggio (PZ) 1600-1650 m 20.VI.1982; Pollino: Casa del Conte 1100 m 19.VI.1982 (PRN).

540 *Nymphalis xanthomelas* (Esper, 1781)

Citata per il **Trentino** da Hinterwaldner, mai trovata (654).

543 *Euphydryas intermedia* (Ménétrières, 1859)

Nota - In Italia questa specie è presente con certezza solo nelle Alpi centrali e orientali. La segnalazione per il **Piemonte**: (1443), è errata ed anche due recenti segnalazioni: (3186), (3378); sono da confermare. La citazione per la Val Bregaglia: (218); si riferisce ad una località della Svizzera, anche se poco oltre il confine; non risultano altre segnalazioni per la Valle Bregaglia in territorio italiano. Pertanto la prima segnalazione per la **Lombardia** è di

Perlini: 1901-1925; (550).

545 *Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775)

Nota - Le citazioni di *E. aurinia* per il **Trentino** in (171), (654), sono dubbie, da riferire ad altra specie (probabilmente *E. glaciegenita*).

Non presente nel **Trentino**.

546 *Euphydryas provincialis* (Boisduval, 1828)

Nota - La citazione di *E. aurinia provincialis* per il **Trentino**: (654) va riferita a altra specie, probabilmente *E. glaciegenita*.

Non presente nel **Trentino**.

552 *Melitaea didyma* (Esper, 1778)

Nuovi dati - **Puglia**: Laghi di Alimini (LE) 3.VII.1968; Foresta di Mercadante (BA) 9.VII.1967, 9.VI.1974; Gravina in Puglia 23.VI.1968 (PRN). **Basilicata**: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).

560 *Melitaea athalia* (Rottemburg, 1775) (= *cymothoe* Bertoloni, 1829)

*Melitaea cymothoe* è descritta su un esemplare della **Liguria**: Promontorio Lunese: Capo Corvo (La Spezia) (58).

562 *Limenitis camilla* (Linnaeus, 1764)

Le citazioni di *L. camilla* per la **Liguria** in: (1172), (1693), (3500), (3501), sono da riferire a *L. reducta* (Balletto *in litt.*).

Non presente in **Liguria**.

Presente anche in **Abruzzo**: 2001-2008; (3519).

563 *Limenitis reducta* Staudinger, 1901 (= *camilla* Denis & Schiffermüller, 1775; *anonyma* Lewis, 1872)

Nuovi dati - **Puglia**: Laghi di Alimini (LE) 30 m 3.VII.1968, Foresta di Mercadante (BA) 400-450 m 9.VI.1974 (PRN). **Basilicata**: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).

564 *Neptis sappho* (Pallas, 1771) (= *leucothoe* Piller & Mitterpacher, 1783)

Nota - La citazione per il **Piemonte** di *N. leucothoe*: (20), ripresa in (3501), va riferita a *N. rivularis* (3539).

Non presente in **Piemonte**.

568 *Apatura ilia* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *iris* Esper, 1777; *eos* Rossi, 1794)

*Papilio eos* è descritta su esemplari di Etruria (**Toscana**), "habitat in Salice, Fraxino" (24).

Nuovi dati - **Emilia**: Coltaro (frazione di Sissa, PR) 29 m 20.VIII.1968 (BRT, PRN)

Presente anche in **Liguria**: 2001-2008; (3479).

Sarebbe presente anche nel Nord del **Molise**: (2001-2008); (3524). Da confermare.

571 *Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767) (= *megaera* Esper, 1777; *xiphia* Boisduval, 1832)

Nuovi dati - **Puglia**: Faggiano (TA) 40-80 m 3.VI.1967, 2.IV e 7.VI.1968, fiume Tara

(TA) 0-2 m 20.VI.1973, 16.VIII.1974, Statte (TA) 100-150 m 11.VI.1980, Lido Azzurro (TA) 2 m 12.VI.1966, Foresta di Mercadante (BA) 400-450 m 9.VII.1967, 9.VI.1974, Gravina in Puglia (BA) 338 m 23.VI.1968, Ruvo di Puglia (BA) 250 m 3.V.1964 (PRN).

573 *Lasiommata petropolitana* (Fabricius, 1787)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1851-1900; (375).

576 *Coenonympha tullia* (Müller, 1764) (= *tiphon* Rottemburg, 1775; *davus* Fabricius, 1777)

Nota - Le citazioni per l'**Alto Adige** di *C. davus*, *C. tiphon* e di *C. tullia*, vanno riferite a *C. gardetta*.

Non presente in **Alto Adige**.

578 *Coenonympha rhodopensis* Elwes, 1900

Nota - La segnalazione di *C. rhodopensis* per la **Toscana**: (2691 bis), (3002 bis), riportata in (3500), (3501), è errata; è una *C. pamphilus* aberrante (*ex verbis* Vignali). Citata genericamente per il **Molise**: (2001-2008); (3453 bis).

Nuovi dati - **Molise**: Pizzone: Monte Meta 15.VI.2003 (SCR).

Non presente in **Toscana**.

580 *Coenonympha glycerion* (Borkhausen, 1788)

Nota - La citazione in: (3074), erroneamente riportata per le **Marche** in: (3423), va riferita all'**Umbria**.

Presente anche in **Umbria**: 1976-2000; (3074).

582 *Coenonympha darwiniana* Staudinger, 1871

*Coenonympha arcania darwiniana* è descritta su esemplari di "Alpes Helvetia meridionalis, Pedemontium (**Piemonte**), Gallia (et? Germania meridionalis)" (Catalog der Lepidopteren des Europaischen Faunengebiets, I. Macrol.: 32) (188).

586 (-) *Coenonympha hero* (Linnaeus, 1761)

Nota - La citazione per il **Piemonte** di *C. hero*: (26), è da riferire a *C. oedippus* (Balletto *in litt.*).

587 *Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758)

Nota - *Coenonympha lyllus* (Esper, 1805) sarebbe una specie distinta, che sostituisce *C. pamphilus* nella penisola Iberica ed in **Sardegna**, secondo: (3315 bis); opinione che non risulta accettata dagli altri autori.

589 *Pyronia cecilia* (Vallantin, 1894)

Nota - Le citazioni per il **Piemonte** e la **Lombardia** di *P. ida* e di *P. cecilia*, sono da riferire a *P. tithonus* (Balletto *in litt.*).

Non ancora segnalata in **Piemonte** e in **Lombardia**.

594 *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758) (= *janira* Linnaeus, 1758)

Nota - La località Grottarossa 12.V.1988 (3501), erroneamente attribuita alla **Sicilia**, va riferita al **Lazio**.

595 *Hyponephele lycaon* (Rottemburg, 1775)

Presente anche in **Umbria**: 1976-2000; (2142).

596 *Hyponephele lupinus* (Costa O.G., 1836) (= *rhamnusia* Freyer, 1845)

*Epinephele rhamnusia* Freyer è descritta su un esemplare della **Sicilia**: Etna (97 bis\*), (611).

599 *Erebia eriphyle* (Freyer, 1836)

Nota - La citazione per il **Piemonte**: (375), e quella generica in (1388), sono da riferire ad *E. epiphron*. In (3423) sono indicate solo alcune località al confine svizzero.

Non ancora citata per il **Piemonte**.

Citata per il **Trentino**: 1901-1925; (1053).

603 *Erebia christi* Rätzer, 1890

Nota - La citazione di *E. christi* per la **Lombardia** in: (550), riportata in (3500), (3501), va riferita a *E. epiphron* (Balletto *in litt.*).

Non presente in **Lombardia**.

608 *Erebia medusa* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Le località del genovesato (**Liguria**) riportate in (995) in realtà sono da riferire in parte al **Piemonte** (Monte Chiappo, Monte Boglielio (AL)) ed in parte all'**Emilia-Lombardia** (Monte Lesima (PC/PV)); per la **Liguria** si ha solo una citazione generica: (3049); da confermare.

609 *Erebia alberganus* (de Prunner, 1798)

Nota - La località Passo della Teglia 7.VII.1979 (3501), erroneamente attribuita al **Piemonte**, va riferita alla **Liguria**.

610 *Erebia pluto* (de Prunner, 1798) (= *morio* Giorna, 1791; *petrosus* de Prunner, 1798; *glacialis* Esper, 1804; *belzebub* Costa, 1839)

Segnalata anche per la **Liguria**: 1851-1900; (375); citazione da confermare.

611 *Erebia gorge* (Hübner, 1804) (= *medon* de Prunner, 1798; *hecuba* Prola, 1940)

*Papilio medon* è descritta su esemplari della Francia: "Barcellonetis mense Juli non tam rarus" (26). Il luogo tipico è in Francia (Barcellonette, Basses-Alpes) e non in **Piemonte**, come detto in (3500).

*Erebia triope, gorge* var.?, è descritta su esemplari della Svizzera: Bernina (163) e non della **Lombardia**: Bernina, come detto in (3500).

612 *Erebia aethiopellus* (Hoffmannsegg, 1806)

Nota - La citazione: (2219), erroneamente attribuita alla **Liguria** in: (3500), (3501), va riferita al **Piemonte**.

Non ancora segnalata in **Liguria**.

615 *Erebia ottomana* Herrich-Schäffer, 1851

Nuovi dati - **Trentino**: Monte Baldo: Rifugio Graziani (TN) 1500-1800 m 18.VII.1934, 1700 m 22.VII.1937 (PRN).

616 *Erebia tyndarus* (Esper, 1781)

Nota - Le citazioni di *E. tyndarus* per il **Friuli**: (174), (175), (3500), (3501), sono da

referire a *E. cassioides* (Balletto *in litt.*).

Non presente nel **Friuli**.

618 *Erebia calcaria* Lorkovic, 1949

Nota - L'assenza di siti nel **Veneto** in (3423), è dovuta ad una svista (Balletto *in litt.*).

La citazione: (1650), erroneamente riportata per la **Venezia Giulia** in (3500), (3501), va riferita al **Friuli**.

Non risulta segnalata per la **Venezia Giulia**.

Presente in **Veneto**: 1951-2000; (1650), (3049).

619 *Erebia cassioides* (Reiner & Hochenwarth, 1792)

Nota - Le citazioni: (1650), (3423), erroneamente riportate per la **Venezia Giulia** in: (3500), (3501), vanno riferite al **Friuli**.

Non presente nella **Venezia Giulia**.

623 *Erebia stirijs* (Godart, 1824)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1976-2000; (3294 bis).

626 *Erebia neoridas* (Boisduval, 1828)

Nota - La citazione per il Colle del Melegno (recte Melogno), 1000 m, 26.VIII.1972 (3501), riportata erroneamente per il **Piemonte**, va riferita alla **Liguria**.

630 *Erebia pandrose* (Borkhausen, 1788)

La citazione (3183), erroneamente riportata per la **Liguria** in (3500), (3501) è da riferire al **Piemonte**.

Non presente in **Liguria**.

631 *Erebia sthenny* de Graslin, 1850

Presente in **Lombardia**: 2001-2008 (3481); nel **Trentino**: 1926-1950; (1320), (3481); nel **Veneto**: 1901-1950; (1084), (3481); e nel **Friuli**: 1926-1950; (1497), (3481).

632 *Melanargia russiae* (Esper, 1783)

La citazione: (3077), riportata per la **Romagna** in (3500), (3501), in realtà si riferisce a due località del pesarese segnalate in (2643), quindi non facenti parte della attuale **Romagna** ma delle **Marche**.

Non ancora rinvenuta in **Emilia-Romagna**.

633 *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758) (= *galene* Ochsenheimer, 1808)

*Papilio galene* è descritta su esemplari del **Lazio**: Monti Sabini (31). *Papilio procida* è descritto su esemplari dell'**Arcipelago campano**: Isola di Procida (12 bis\*). *Papilio liriopae* è descritto su esemplari della **Campania** (15). *Papilio procida* è buona sottospecie, *Papilio liriopae* è sinonimo della ab. *leucomelas* Esper, 1777.

635 *Melanargia arge* (Sulzer, 1776)

Nuovi dati - **Puglia**: gravina di Laterza (TA) 300 m 27.V.1976, Locorotondo (BA) 400 m 20.V.1974, Mellitto (BA) 350 m 21.V.1978 (PRN).

637 *Melanargia pherusa* (Boisduval, 1833)

Presente anche nell'**Arcipelago siciliano**: 1976-2000; (2867).

642 *Hipparchia fagi* (Scopoli, 1763) (= *hermione* Linnaeus, sensu auct.)

Nota - Nel testo di Scopoli (5) *Papilio fagi* è descritta senza alcuna indicazione di località, "Inter Fagos, & circa tuguria rusticorum", per cui la sola opzione valida è che sia stata descritta su esemplari della Slovenia: Carniola. Secondo (1705) *Hipparchia fagi* è stata descritta da Scopoli nel 1763 (Ent. Carn., p. 152) su esemplari del Tirolo meridionale (**Alto Adige**) e di Carinzia (Austria).

643 *Hipparchia alcyone* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *hermione* Linnaeus, 1764; *aelia* Hoffmannsegg, 1804)

Nota - Le citazioni di *H. alcyone* per la **Campania** e la **Sicilia** vanno riferite a *H. genava*: (3438), (3464 quinque).

Non presente in **Campania** e in **Sicilia**.

644 *Hipparchia genava* (Fruhstorfer, 1908) (= *vivilo* Fruhstorfer, 1908; *latevittata* Verity, 1911; *remota* Verity, 1911; *nigrogenava* Verity, 1953)

Nota - Le citazioni di *H. alcyone* per la **Campania** e la **Sicilia** vanno riferite a *H. genava*.

Presente in **Campania**: 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (109); (3265); e **Sicilia**: 1951-2000; (1566); (3320).

646 *Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le citazioni di *H. semele* per l'**Arcipelago toscano** sono da riferire tutte a *H. aristaeus* (Balletto *in litt.*).

Non presente nell'**Arcipelago toscano**.

652 *Hipparchia statilinus* (Hufnagel, 1766) (= *fauna* Sulzer, 1776; *allionia* Fabricius, 1781)

Nuovi dati - **Basilicata**: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).

Presente anche nell'**Arcipelago ligure**: 1901-1925 (871).

655 *Arethusana arethusa* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *erythia* Hübner, 1804)

Presente anche in **Toscana**: 2001-2008; (3522).

656 *Brintesia circe* (Fabricius, 1775) (= *proserpina* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Basilicata**: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).

657 *Chazara briseis* (Linnaeus, 1764)

Nota - La citazione generica per la **Calabria**: (2941) è dovuta a una svista (*ex verbis* Scalercio).

Non ancora segnalata in **Calabria**.

Presente anche in **Puglia**: 1976-2000; (3480).

659 *Danaus chrysippus* (Linnaeus, 1758) (= *asclepiadis* Gagliardi, 1811)

*Papilio asclepiadis* è descritta su esemplari della **Campania**: Torre del Greco (NA) (34).

660 *Thyatira batis* (Linnaeus, 1758)

- Nuovi dati - **Sicilia**: Caronia (ME), 304 m, VI.1927, X.1928 (ALL).
- 662 *Tetbea ocellaris* (Linnaeus, 1767) (= *octogesimea* Hübner, 1786; *octogesima* auct.)  
Nuovi dati - **Sicilia**: Caronia (ME), 304 m, X.1928 (ALL).
- 666 *Cymatophorina diluta* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Nuovi dati - **Sicilia**: Caronia (ME), 304 m, X.1928 (ALL)
- 679 *Cilix hispanica* Pérez De Gregorio, Torruella, Requena Miret, Rondós Casas & Vallhonrat i Figueras, 2002  
Presente anche in **Emilia**: 1976-2008; (3528); in **Romagna**: 1976-2008; (3429 bis), (3528); e nelle **Marche**: 1976-2000; (3522).
- 683 *Abraxas grossulariata* (Linnaeus, 1758)  
Presente anche in **Calabria**: 1976-2000; (3463).
- 692 *Macaria notata* (Linnaeus, 1758) (= *notataria* Denis & Schiffermüller, 1775)  
Confermata la presenza in **Campania**: 1976-2000; (3517).
- 694 *Macaria signaria* (Hübner, 1809)  
Presente anche in **Lombardia**: 1976-2000; (3463).
- 696 *Macaria wauaria* (Linnaeus, 1758)  
Presente anche in **Umbria**: 1976-2000; (3463).
- 703 *Digrammia rippertaria* (Duponchel, 1830)  
Nota - La citazione per la **Liguria**: (1388), è molto probabilmente ripresa da Ghiliani: (114), che però si riferisce ai monti di Nizza: (3463).  
Non ancora segnalata in **Liguria**.
- 709 *Isturgia sparsaria* (Hübner, 1809) (= *acquiaria* Millière, 1875)  
Nota - La citazione per la **Lombardia**: (1238) è dovuta probabilmente a un errore di identificazione (3463).  
Non presente in **Lombardia**.
- 725 *Petrophora convergata* (de Villers, 1789)  
Presente anche nel **Lazio**: 1976-2000; (3463).
- 734 *Epione repandaria* (Hufnagel, 1767)  
Presente anche in **Campania**: 2001-2008; (3463).
- 740 *Ennomos quercinaria* (Hufnagel, 1767)  
Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3463).
- 742 *Ennomos fuscantaria* (Haworth, 1809)  
Presente anche in **Valle d'Aosta**: 1926-1976; (3463); e nel **Friuli**: 1976-2008; (3463); è confermata la presenza in **Romagna**: 1976-2000; (3463).
- 743 *Ennomos erosaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Presente anche in **Emilia**: 1976-2000; (3463).
- 744 *Ennomos quercaria* (Hübner, 1813)  
Presente anche in **Alto Adige**: 1951-1975; (3463); e nel **Friuli**: 1976-2000; (3463).
- 747 *Selenia tetralunaria* (Hufnagel, 1767)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1901-1925; (1157 bis).

748 *Artiora evonymaria* (Denis Schiffermüller, 1775)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1976-2008; (3463), (3464 bis).

752 *Crocallis dardoinaria* Donzel, 1840

Nota - L'unico esemplare di *Crocallis dardoinaria* noto di **Sicilia**, della collezione Mariani, citato in (3358) appartiene a *C. auberti*: (3463). Pertanto le citazioni per la **Sicilia**: (1340), (3358), riprese in (2929), (2980), (3314), (3500), (3501), vanno riferite a *Crocallis auberti*.

Non ancora segnalata in **Sicilia**.

755 *Ourapteryx sambucaria* (Linnaeus, 1758)

Presente anche in **Campania**: 1976-2000; (3463), (3502).

756 *Colotois pennaria* (Linnaeus, 1761)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3463); in **Umbria**: 1976-2000; (3463); e in **Campania**: 2001-2008; (3463), (3502).

757 *Angerona prunaria* (Linnaeus, 1758)

Confermata per la **Liguria**: 1976-2000; (3463).

758 *Apocheima hispidaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche in **Campania**: 2001-2008; (3463), (3502).

759 *Apocheima pilosaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche in **Campania**: 2001-2008; (3463), (3502).

761 *Lycia alpina* (Sulzer, 1776) (= *bombycaria* Boisduval, 1840)

Presente anche in **Piemonte**: 1976-2008; (3463).

763 *Lycia florentina* (Stefanelli, 1882)

Presente anche in **Campania**: 2001-2008; (3463), (3502).

767 *Lycia pomonaria* (Hübner, 1790)

Nota - Le citazioni di *L. pomonaria* per l'**Alto Adige**: (812) e il **Piemonte**: (114), sono da ritenersi dubbie, potendo essere stata confusa con *L. isabellae* (3463).

768 *Biston strataria* (Hufnagel, 1767)

Presente anche in **Campania**: 1976-2008; (3463), (3502).

769 *Biston betularia* (Linnaeus, 1758)

Nuovi dati - **Basilicata**: Monticchio laghi 8.IV.1983 (PRN).

772 *Agriopis leucophaearia* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3462 ter), (3463); ed in **Campania**: 2001-2008; (3463), (3502).

773 *Agriopis bajaran* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche in **Liguria**: 1976-2000; (3463); nel **Friuli**: 1976-2000; (3463); ed in **Campania**: 2001-2008; (3463), (3502).

774 *Agriopis aurantiaria* (Hübner, 1799)

Presente anche in **Liguria**: 1976-2008; (3463); in **Basilicata**: 1951-1975; (3463); ed

in **Calabria**: 1976-2000; (3463).

775 *Agriopsis marginaria* (Fabricius, 1776)

Presente anche in **Campania**: 2001-2008; (3502).

778 *Crocota tinctoria* (Hübner, 1799)

Nota - La citazione di *Crocota lutearia*: (1038), erroneamente attribuita al **Veneto** in (3500), (3501), va riferita al **Trentino**.

Non ancora segnalata nel **Veneto**.

784 *Nychiodes obscuraria* (de Villers, 1789)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3463); nella **Venezia Giulia**: 1976-2000; (3463); ed in **Campania**: 2001-2008; (3463), (3502).

787 *Nychiodes dalmatina* Wagner, 1909

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1901-1925 (1060); citazione confermata (3463).

789 *Menophra abruptaria* (Thunberg, 1792) (= ? *fasciataria* Rossi, 1794; *petrificaria* Treitschke, 1828)

*Phalaena fasciataria* è descritta su esemplari della **Toscana**: "Etruria, habitat in silvis sat frequens" (24).

Presente anche in **Umbria**: 1976-2000; (3463).

790 *Menophra japygiaria* (Costa O.G., 1849)

Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 2001-2008; (3463).

791 *Menophra nycthemeraria* (Geyer, 1831)

Presente anche in **Piemonte**: 1951-1975; (3463).

794 *Synopsis sociaria* (Hübner, 1799)

Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 2001-2008; (3463).

796 *Phthonandria viertlii* (Bohatsch, 1883)

Presente anche nel **Lazio**: 1976-2000; (3463).

803 *Peribatodes perversaria* (Boisduval, 1840)

Nota - La citazione di *Peribatodes perversaria* per il **Piemonte**: (3378), è da riferire a *P. rhomboidaria* (3539).

804 *Peribatodes umbraria* (Hübner, 1809)

Nuovi dati - **Sicilia**: Casteldaccia (PA) 29 e 30.IV.1927; Palermo: Villa Alliata 2.V.1927, 30.IV.1928, X.1929, 21.V.1945 (ALL).

807 *Selidosema brunnearia* (de Villers, 1789)

Presente anche in **Campania**: 2001-2008; (3502); ed in **Sardegna**: 1976-2000; (2980 bis).

808 *Selidosema plumaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Confermata la presenza in **Piemonte**: 1951-1975; (3539).

810 *Selidosema ambustaria* (Geyer, 1831) (= *duponchelaria* Lefebvre, 1831)

*Fidonia duponcheliaria* è descritta su esemplari della **Sicilia**: Sperlinga (65).

813 *Deileptenia ribeata* (Clerck, 1759)

Presente anche nel **Friuli**: 1901-1925; 2001-2008; (628); (3464 bis).

814 *Alcis repandata* (Linnaeus, 1758) (= *consobrinaria* Borkhausen, 1790)

*Phalaena Geometra consobrinaria* è descritta su esemplari di **Italia** (18 bis\*) (3174).

818 *Hypomecis roboraria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche in **Sardegna**: 1976-2000; (2980 bis).

828 *Ematurga atomaria* (Linnaeus, 1758)

Nota - La nuova segnalazione per il **Piemonte**: "Bienza Chiaverana" (3501), va corretta in Chiaverano: Bienza. La citazione: Valtellina: Val Viola 9.VII.1974 (3501), riportata erroneamente per il **Veneto**, va riferita alla **Lombardia**.

833 *Tephronia oranaria* Staudinger, 1892

Nota - Le citazioni di *Tephronia oranaria* per l'**Italia**, dalla **Sicilia** a quasi tutte le regioni meridionali e centrali, spingendosi a nord lungo l'Appennino fino al modenese, sono da riferire a *T. lepraria*. *T. oranaria* non è presente in **Italia**, tranne che in **Liguria** dove è segnalata segnalata *Tephronia oranaria castiliaria* Studinger, 1892, ma è possibile che si tratti di una buona specie diversa dalla vera *oranaria* dell'Algeria (3528).

**Liguria**: 1976-2008; (2454); (3477).

833 bis - *Eumannia lepraria* (Rebel, 1909)

Nota - Nuova per la fauna italiana. Segnalata per la prima volta nel **Friuli** (3462 ter), sostituisce *T. oranaria* in **Italia peninsulare** e **Sicilia**: (3528).

**Alto Adige**: 1976-2000; (3528); **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter); (3464 bis); **Venezia Giulia**: 1976-2000; (3462 ter); **Emilia**: 1901-1925; 1976-2000; (3237); (3329); **Romagna**: 1951-2008; (1885); (3432 ter); **Toscana**: 1901-1925; 1951-2008; (554); (3429); **Umbria**: 1951-1975; (3237); **Marche**: 1976-2000; (3237); **Lazio**: 1976-2008; (3268); **Abruzzo**: 1951-2000; (2868); (3324); **Puglia**: 1951-1975; (2868); **Basilicata**: 1976-2008; (2868); (3298); **Calabria**: 2001-2008; (3347); **Sicilia**: 1976-2000; (2967).

835 *Cabera pusaria* (Linnaeus, 1758)

Confermata la presenza in **Sardegna**: 2001-2008; (3461 quater).

843 *Campaea honoraria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche nell'**Abruzzo**: 1976-2000; (2203).

844 *Hylaea fasciaria* (Linnaeus, 1758) (= *prosapiaria* Linnaeus, 1758; *prasinaria* Denis & Schiffermüller, 1775; *biliolata* de Villers, 1789; *squalidaria* Costa O.G., 1848)

Presente anche in **Campania**: 1801-1850; (111), e **Puglia**: 1801-1850; (111).

845 (-) *Hylaea squalidaria* (Costa O.G., 1848)

*Hemithea squalidaria* è descritta su esemplari della **Campania**: Lago di Patria (NA) e della **Puglia**: San Cataldo (LE) (Fauna del Regno di Napoli. Lepidotteri. Parte seconda. Geometre: 17, Tav. II, fig. 4) (111).

Nota - *Hemithea squalidaria* Costa O.G., è sinonimo di *H. fasciaria*.

861 *Neognophina intermedia* (Wehrli, 1917)

Confermata la presenza in **Alto Adige**: (1976-2000), 2001-2008; (2973), (3382 bis).

864 *Euchrognophos variegata* (Duponchel, 1830)

Presente anche in **Romagna**: 1976-2008; (3522), (3432 ter).

878 *Glacies alticolaria* (Mann, 1853) (= *chalybaeus* Zerny, 1916)

*Psodos chalybaeus* è descritta su esemplari dell'**Alto Adige**: Stilfserjoch e Svizzera: Graubünden, Walliser e Waadter Alpen (852). *Psodos chalybaeus* è stato descritto su esemplari di Stilfser Joch e Ortler (3174).

889 *Chariaspilates formosaria* (Eversmann, 1837)

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis).

898 *Dyscia raunaria* (Freyer, 1851)

Presente anche nel **Molise**: 2001-2008; (3453 bis).

904 *Compsoptera argentaria* (Herrich-Schäffer, 1839)

Nuovi dati - **Sicilia**: Caronia (ME): Castello di San Nicola X.1938 (1f); Madonie (1m) (ALL).

905 *Alsophila aescularia* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter).

908 *Orthostixis cribraria* (Hübner, 1799)

Presente anche in **Puglia**: 2001-2008; (3515).

917 *Thetidia sardinica* (Schawerda, 1934)

*Euchloris sardinica* è descritta su esemplari della **Sardegna**: Aritzo 1000 m (Internationale Entomologische Zeitschrift, Guben, 27 (41): 463, fig. 5) (1271).

920 *Chlorissa viridata* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le citazioni per la **Romagna** di *C. viridata* in (1010), (1885), riprese in (1388), (1943), (3500), (3501), sono da riferire a *C. cloraria* (2516); *C. viridata* non è presente in **Romagna**.

922 *Phaiogramma etruscaria* (Zeller, 1849) (= *pulmentaria* Guenée, 1857)

*Nemoria pulmentaria* è descritta su esemplari di Francia, Dalmazia e **Italia** (137\*), (3174).

Presente anche nell'**Arcipelago siciliano**: 2001-2008; (3491).

927 *Thalera fimbrialis* (Scopoli, 1763)

Confermata per il **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter); (3464 bis).

935 *Emmiltis pygmaearia* (Hübner, 1809) (= *minutaria* Fabricius, 1781)

Nota - La citazione per l'**Abruzzo**: (3376), va riferita al **Lazio**.

943 *Idaea determinata* (Staudinger, 1876) (= *geministrigata* Fuchs, 1901)

*Acidalia geministrigata* è descritta su esemplari della **Sicilia** (441).

947 *Idaea mediaria* (Hübner, 1819)

Presente anche nel **Lazio**: 2001-2008; (3493).

948 *Idaea leipnitzii* Hausmann, 2004

Presente anche in **Abruzzo**: 2001-2008; (3493).

951 *Idaea sericeata* (Hübner, 1813)

Nota - La citazione di *I. sericeata*: (1787), erroneamente riportata per la **Lombardia** in (3500), (3501), va riferita al **Veneto**.

Non ancora segnalata in **Lombardia**.

952 *Idaea macilentaria* (Herrich-Schäffer, 1847)

È segnalata nel **Veneto**: (1053), citazione dubbia: (3376).

953 *Idaea ochrata* (Scopoli, 1763) (= *corrigata* Fabricius, 1781; *ochraria* Fischer von Rösslerstamm, 1836; *accretata* Fuchs, 1901)

*Acidalia accretata* è descritta su esemplari della **Sicilia** (441).

968 *Idaea elongaria* (Rambur, 1833) (= *aridata* Zeller, 1847)

Secondo (3174) *Acidalia confusaria* è descritta su esemplari della **Sicilia** in (158); ma in (158) è solo detto che *Acidalia confusaria* Mann *in litt.* (= *aridata* Z.), citata da Snellen in (152) per la **Sicilia**, è un *nomen nudum*.

971 *Idaea inquinata* (Scopoli, 1763)

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis).

975 *Idaea politaria* (Hübner, 1799)

Presente anche nel **Friuli**: 1926-1950; 1976-2008; (1157 bis), (3464 bis).

977 bis *Idaea libycata* (Bartel, 1906)

Nota - Nuova per la fauna d'**Italia**.

Rinvenuta in **Liguria**: 2001-2008; (3477).

987 *Idaea sylvestraria* (Hübner, 1799) (= *graciliata* Mann, 1867)

*Acidalia graciliata* è descritta su un esemplare dell'**Alto Adige**: Bolzano: Eisakauen (171).

988 *Idaea dimidiata* (Hufnagel, 1767)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1926-1950; 2001-2008; (1157 bis), (3464 bis).

990 - *Idaea biselata* (Hufnagel, 1767) (= *bisetata* auct.)

Presente anche in **Liguria**: 1976-2000; (3533).

995 *Idaea infirmaria* (Rambur, 1833)

Presente anche in **Romagna**: 2001-2008; (3432 ter), (3528).

996 *Idaea rhodogrammaria* (Püngeler, 1913)

Presente anche in **Liguria**: 2001-2008; (3477) e nel **Lazio**: 1976-2000; (3493).

1001 *Idaea nitidata* (Herrich-Schäffer, 1861)

Confermata per il **Piemonte**: (3539), presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter).

1009 *Scopula immorata* (Linnaeus, 1758)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1901-1925; (1157 bis).

1010 *Scopula tessellaria* (Boisduval, 1840) (= *pulverulentaria* De Selys-Longchamps, 1844; *tabianaria* Turati, 1905)

*Eupisteria pulverulentaria* è descritta su un esemplare della **Campania**: Caserta (102).

*Acidalia tabianaria* è descritta su esemplari dell'**Emilia**: Tabiano e Salsomaggiore (Parma) (515).

1011 *Scopula corrivalaria* (Kretschmar, 1862)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1996-2000; (3464 bis).

1018 *Scopula decorata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche nel **Friuli**: 1996-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1021 *Scopula vigilata* (Prout, 1913)

Presente anche in **Romagna**: 2001-2008; (3522).

1025 *Scopula turbulentaria* (Staudinger, 1871)

*Acidalia turbidaria* var. *turbulentaria* Staudinger, è descritta su esemplari di Grecia: Attica (luogo tipico) e **Sardegna** (Horae societatis entomologicae Rossicae, VII (1870): 151, Tav. 2, fig. 3 (1871)) (189).

1035 *Scopula floslactata* (Haworth, 1809) (= *remutaria* Hübner, 1799; *lactata* Haworth, 1809; *sublactata* Haworth, 1809)

Confermata per il **Piemonte**: 1951-1975; (3539).

1044 *Glossotrophia asellaria* (Herrich-Schäffer, 1847)

*Acidalia romanaria* è descritta su esemplari del **Lazio**: Roma (176 bis\*), (2788). È ssp. di *Glossotrophia asellaria* (3376).

1053 bis (-) *Cyclophora lennigaria* (Fuchs, 1883)

Nota - La citazione di *C. albiocellaria* f. *lennigaria* per la **Venezia Giulia**: (1157 bis) è da riferire a *C. albiocellaria*.

*Cyclophora lennigaria* non fa parte della fauna italiana.

1055 *Cyclophora puppillaria* (Hübner, 1799)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1057 *Cyclophora ruficiliaria* (Herrich-Schäffer, 1855)

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3462 ter).

1062 *Rhodometra sacraria* (Linnaeus, 1767) (= *fulvaria* Fabricius, 1794; *sanguinaria* Esper, 1801; *lividaria* Costa O.G., 1848)

Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 1951-1975; (2110).

1068 *Lythria cruentaria* (Hufnagel, 1767) (= *purpurata* Linnaeus, 1761; *rotaria* Fabricius, 1798; *fasciolaria* Esper, 1801)

Nota - La citazione di *Lythria purpuraria* L. var. *cruentaria* Bork.: (459), riportata per la **Campania** come *L. cruentaria*, in (3517), molto probabilmente va riferita a *Lythria purpuraria* (Linnaeus, 1758) (= *cruentaria* Hufnagel, 1767, *nec* Scopoli, 1763), più diffusa in **Italia meridionale**, anche considerando che Cannaviello indica come piante alimentari *Polygonum aviculare* e *Cytisus scoparius*, mentre *L. cruentaria* è infeudata a *Acetosella vulgaris* e *Acetosa pratensis*.

1068 bis (-) *Lythria sanguinaria* (Duponchel, 1842)

Nota - Le citazioni per l'Italia di esemplari di **Valle d'Aosta** in: (797), **Piemonte**:

(1388), **Veneto**: (2990), **Emilia**: (2990), e **Abruzzo**: (2990) sono da riferire a *L. cruentaria*. *Lythria sanguinaria* non fa parte della fauna italiana.

1074 *Scotopteryx coarctaria* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)

Nota - La citazione di *S. coarctaria*: (1053), erroneamente attribuita all'**Alto Adige** in (3501), va riferita al **Trentino**.

Non ancora segnalata in **Alto Adige**.

Presente nel **Trentino**: 1901-1925; (1053).

1083 *Orthonama vittata* (**Borkhausen, 1794**) (= *lignaria* Boisduval, 1840)

Confermata per il **Piemonte**: 1951-1975; (3539).

1090 *Xanthorhoe vidanoi* **Parenzan & Hausmann, 1994**

Fra i paratipi anche esemplari del **Piemonte**: 1976-2000; (2869).

1091 *Xanthorhoe quadrifasciata* (**Clerck, 1759**)

Nota - La citazione per la **Sicilia**: (343), ripresa in (506), (1340), (1388), (1943), (2929), (2980), (3500), (3501), probabilmente è da riferire a *X. vidanoi*.

Non presente in **Sicilia**.

Confermata per il **Piemonte**: 1976-2000; (3539). Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis).

1098 *Catarhoe basochesiata* (**Duponchel, 1831**) (= *confusaria* Staudinger, 1870)

Nuovi dati - **Sicilia**: Palermo: Villa Alliata 6 e 8.IV.1927 (ALL).

1099 *Catarhoe putridaria* (**Herrich-Schäffer, 1852**)

Presente anche nel **Molise**: 2001-2008; (3453 bis).

Nuovi dati - **Molise**: Rocchetta al Volturno: Monte Marrone, 1200 m, 27.III.1997 (SCR).

1114 *Costaconvexa polygrammata* (**Borkhausen, 1794**)

Nuovi dati - **Sicilia**: Palermo: Villa Alliata 30.III.1926, VI e VIII.1928, 30.V.1945 (ALL).

Presente nell'**Arcipelago ligure**: 1901-1925 (3139), ma non in **Liguria**, come indicato in (3500), (3501).

1115 *Camptogramma bilineata* (**Linnaeus, 1758**)

Nota - La località Acquatremola, erroneamente riportata per la **Calabria** in (2868), va riferita alla **Basilicata**.

1120 - *Entephria flavicinctata* (**Hübner, 1813**)

Presente anche in **Basilicata**: 2001-2008; (3532).

1125 *Larentia malvata* (**Rambur, 1833**)

Nuovi dati - **Sicilia**: Palermo: Villa Alliata 9.XI.1926, 16.XI.1944, 24.X, 2.XII.1945 (ALL).

1126 *Anticlea badiata* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1128 *Mesoleuca albicillata* (**Linnaeus, 1758**)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1129 *Pelurga comitata* (**Linnaeus, 1758**)

- Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis).
- 1130 *Lampropteryx suffumata* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1901-1925; (1157 bis).
- 1133 *Nebula salicata* (Hübner, 1799)  
Presente anche in **Campania**: 1976-2000; (3517); citata come *Coenotephria salicata* (Denis & Schiffermüller, 1775).
- 1142 *Eulithis testata* (Linnaeus, 1761)  
Nota - Le citazioni di *E. testata* in (1053) e (1388), erroneamente attribuite al **Trentino** in (3500), (3501), vanno riferite all'**Alto Adige**.  
Non ancora segnalata nel **Trentino**.
- 1147 *Ecliptopera silaceata* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Presente anche nel **Friuli**: 1901-1925; (1157 bis).
- 1154 *Plemyria rubiginata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *bicolorata* Hufnagel 1767)  
Confermata per il **Piemonte**: 1951-2000; (3539).
- 1155 *Pennithera firmata* (Hübner, 1822)  
Confermata la presenza nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis). Presente anche in **Basilicata**: 2001-2008; (3532).
- 1166 *Eustroma reticulata* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter).
- 1167 - *Electrophaes corylata* (Thunberg, 1792)  
Presente anche in **Liguria**: 1976-2000; (3533).
- 1168 *Colostygia aptata* (Hübner, 1813)  
Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1901-1925; (1157 bis).
- 1187 *Horisme radicularia* (De La Harpe, 1855)  
Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter).
- 1189 *Horisme predotai* Bytinski-Salz, 1937  
*Horisme predotai* è descritta su esemplari della **Sardegna**: Oristano: Uras e Teulada (Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 15 (2): 209) (1303).
- 1191 *Horisme calligraphata* (Herrich-Schäffer, 1839)  
Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1901-1925; (1157 bis).
- 1195 - *Pareulype berberata* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Presente anche in **Basilicata**: 2001-2008; (3532).
- 1202 *Triphosa sabaudiata* (Duponchel, 1830)  
Nota - La località Grotta del Camoscere: (1524), (2331), erroneamente attribuita alla **Liguria** in (3500), (3501), va riferita al **Piemonte**.  
Non ancora segnalata in **Liguria**.  
Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1901-1925; (1060).
- 1203 bis *Triphosa dyriata* Powell, 1941

Nota - Nuova per la fauna italiana.

A questa specie, descritta su esemplari del Marocco, sono da riferire numerose citazioni di *T. dubitata*.

Presente in **Piemonte**: 2001-2008; (3530); **Lazio**: 2001-2008; (3530); **Abruzzo**: 2001-2008; (3530).

1204 *Philereme vetulata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1208 *Euphyia unangulata* (Haworth, 1809)

Presente anche in **Piemonte**: 1976-2000; (3539).

1211 *Euphyia mesembrina* (Rebel, 1927)

*Larentia mesembrina* è descritta su esemplari di Svizzera (Laquintal, olotipo), **Friuli** (Tarvisio), Austria (Obir) e Slovenia (Mojstrana e Crna Prst) (Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft, LXXVII (2), in: Bericht der Sektion für Lepidopterologie: (68)) (1091 bis).

1214 *Epirrita christyi* (Allen, 1906)

Presente anche in **Piemonte**: 2001-2008; (3539).

1217 *Operophtera fagata* (Scharfenberg, 1805)

Presente anche in **Calabria**: 2001-2008; (3496).

1223 *Perizoma lugdunaria* (Herrich-Schäffer, 1855)

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis).

1227 *Perizoma albulata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *albularia* Boisduval, 1840; *candidaria* Costantini, 1922)

Il luogo tipico di *Larentia candidaria* è in **Emilia**: Fiumalbo, Le Pozze (Apennini Mutinensi (= Appennini di Modena)) e non Appennino di Mutino, come erroneamente riportato in (3501).

1238 *Eupithecia inturbata* (Hübner, 1817)

Presente anche nel **Friuli** 2001-2008; (3464 bis).

1240 *Eupithecia immundata* (Lienig & Zeller, 1846)

Nota - La citazione di *E. immundata*: (1053), erroneamente attribuita al **Trentino** in (3500), (3501), va riferita all'**Alto Adige**.

Non ancora segnalata nel **Trentino**.

1246 *Eupithecia pulchellata* Stephens, 1831

Presente anche nel **Trentino**: 1901-1925; (1053).

1247 *Eupithecia pyreneata* Mabille, 1871

Presente anche in **Liguria**: 2001-2008; (3477); e in **Campania**: 1976-2000; (3517).

1254 *Eupithecia extremata* (Fabricius, 1787)

Presente anche in **Puglia**: 2001-2008; (3515).

1256 *Eupithecia valerianata* (Hübner, 1813)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3464 bis); e nella **Venezia Giulia**: 1976-

2000; (3464 bis).

1258 *Eupithecia undata* (Freyer, 1840) (= *scriptaria* Herrich-Schäffer, 1848)

Presente anche in **Lombardia**: 1851-1900; (170).

1264 *Eupithecia schiefereri* Bohatsch, 1893

Presente anche in **Piemonte**: 1951-1975; (3539).

1266 *Eupithecia alliararia* Staudinger, 1870

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3462 ter).

1267 *Eupithecia egenaria* Herrich-Schäffer, 1848

Presente anche in **Piemonte**: 1951-1975; (3539); e nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1270 *Eupithecia gueneata* Millière, 1862

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter).

1271 *Eupithecia gratiosata* Herrich-Schäffer, 1861

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1275 *Eupithecia selinata* Herrich-Schäffer, 1861

Presente anche in **Alto Adige**: 1901-1925; (1950-1975); (1053), (2973).

1280 *Eupithecia cauchiata* (Duponchel, 1830)

Confermata per il **Piemonte**: 1926-1950 (3539).

1281 *Eupithecia pernotata* Guenée, 1858

*Eupithecia pernotata* è descritta su esemplari di **Italia**: Monte Rosa, Monte Ossolano (in Boisduval & Guenée, Histoire Naturelle des Insectes. Species Général des Lépidoptères, 10: 316) (136\*), (3342). Nota solo di Svizzera: Monte Rosa (757). Il Monte Ossolano è in **Piemonte**, presso Domodossola (VB).

1284 *Eupithecia expallidata* Doubleday, 1856

Presente anche in **Romagna**: 1976-2000; (3522).

1285 *Eupithecia assimilata* Doubleday, 1856

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3464 bis).

1289 *Eupithecia denotata* (Hübner, 1813)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1901-1925; (1157 bis).

1292 *Eupithecia succenturiata* (Linnaeus, 1758)

Nota - La citazione in: (1053), erroneamente attribuita al **Trentino** in (3500), (3501), va riferita all'**Alto Adige**.

Non ancora segnalata in **Trentino**.

1305 *Eupithecia simplicciata* (Haworth, 1809)

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis); e nella **Venezia Giulia**: 1976-2000; (3464 bis).

1306 *Eupithecia druventiata* Dietze, 1902

Presente anche in **Liguria**: 2001-2008; (3477).

1307 *Eupithecia sardoa* Dietze, 1910

Presente anche nel **Lazio**: 1976-2008; (3493).

1310 *Eupithecia gemellata* Herrich-Schäffer, 1861 (= *schmidii* Dietze, 1872)

Presente anche in **Campania**: 1976-2000; (3517).

1312 *Eupithecia graphata* (Treitschke, 1828)

Presente anche in **Romagna**: 2001-2008; (3432 ter).

1314 *Eupithecia spissilineata* Mentzer, 1846

Presente anche in **Calabria**: 2001-2008; (3496).

1315 *Eupithecia indigata* (Hübner, 1813) (= *pliniata* Stauder, 1929)

Confermata per il **Piemonte**: 1951-1975; (3539).

1316 *Eupithecia pimpinellata* (Hübner, 1813)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter).

1317 bis (-) *Eupithecia gelidata* Möschler, 1860

La ssp. *hyperboreata* è riportata come presente in **Piemonte**: (569), citazione certamente errata. *Eupithecia gelidata* non fa parte della fauna italiana.

1322 *Eupithecia virgaureata* Doubleday, 1861

Presente anche in **Piemonte**: 1951-2000; (3539); nel **Friuli** 2001-2008; (3464 bis) e in **Romagna**: 2001-2008; (3522).

1323 *Eupithecia abbreviata* Stephens, 1831

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter).

1328 *Eupithecia phoeniceata* (Rambur, 1834)

Presente anche in **Sardegna**: 1976-2000; (3461 quater).

1329 *Eupithecia ericeata* (Rambur, 1833)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter).

1331 bis *Eupithecia rosmarinata* Dardoin & Millière, 1865

Nota - Nuova per la fauna italiana.

Rinvenuta in **Liguria**: 2001-2008; (3477).

1333 *Eupithecia ultimaria* Boisduval, 1840

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

1338 *Chloroclystis v-ata* (Haworth, 1809)

Confermata la presenza in **Sardegna**: 2001-2008; (3461 quater).

1339 *Pasiphila rectangularata* (Linnaeus, 1758)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); e nella **Venezia Giulia**: 1901-1925; 2001-2008; (1157 bis), (3464 bis).

1341 *Pasiphila debiliata* (Hübner, 1817)

Confermata per il **Piemonte**: 1951-1975; (3539).

1342 *Anticollix sparsata* (Treitschke, 1828)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

1343 *Chesias legatella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche in **Campania**: 2001-2008; (3502); e nella **Puglia**: 2001-2008;

(3515).

1366 *Hydrelia sylvata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *testacea* Donovan, 1810)

Confermata per il **Piemonte**: 1951-1975; (3539).

1368 *Lobophora halterata* (Hufnagel, 1767)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter).

1383 *Clostera anastomosis* (Linnaeus, 1758)

Nota - La citazione: (3129), erroneamente attribuita alle **Marche** in (3501), va riferita alla **Romagna**. La sola citazione per le **Marche**: (385), va confermata.

1385 *Cerura erminea* (Esper, 1783)

Nota - La citazione: (3183), erroneamente riportata per la **Liguria** in (3500), (3501), va riferita al **Piemonte**.

Non ancora segnalata in **Liguria**.

1386 *Furcula furcula* (Clerck, 1759)

Presente anche in **Puglia**: 2001-2008; (3515).

1393 bis *Notodonta tarburi* Eitschberger & Steiniger, 1981

*Notodonta tritophus tarburi* è descritta su esemplari di Austria (Golling: Bluntauental *locus typicus*) e **Veneto**: Monte Baldo: Bocca di Navene 1500 m (Atalanta, 12 (5): 361 (2224 bis).

Nota - Nuova per la fauna d'Italia.

Presente in **Friuli**: 1951-1975; (2841 bis); e nel **Veneto**: 1951-1975; (2224 bis).

1398 *Drymonia querna* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *danieli* Hartig, 1970)

*Drymonia danieli* è descritta su esemplari della **Calabria**: Gambarie: Basilicò, 1200 m (*holotypus*); reperita anche in **Basilicata**: Monte Pollino, 1300 m (1905).

Per una svista è stata riportata in (3500), (3501), come descritta su esemplari della **Basilicata**: Vulture; Valle dell'Ofanto; Monte Pollino 1300 m, luoghi tipici di *Drymonia querna* ssp. *meriditalica*.

1401 *Pheosia gnoma* (Fabricius, 1777)

Nota - La citazione: (2410), erroneamente attribuita alla **Liguria** in (3500), (3501), va riferita al **Piemonte**.

Non ancora segnalata in **Liguria**.

1423 *Acronicta cuspis* (Hübner, 1813)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1427 *Acronicta leporina* (Linnaeus, 1758)

Presente anche in **Emilia**: 2001-2008; (3454 bis).

1428 *Acronicta megacephala* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Calabria**: Monte Moschereto (CS), 800 m, 15.VII.1980 (PRN).

1432 *Acronicta euphorbiae* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *euphrasiae* Brahm, 1791)

Nuovi dati - **Alto Adige**: Stelvio, 1300 m, 3.VII.1930 (ex coll. Astfäller, GLL, PRN).

1434 *Acronicta rumicis* (**Linnaeus, 1758**)

Nuovi dati - **Basilicata**: Pollino: Timpone Castellana, 1100 m, 23.VII, 13.IX.1979, 17.VII.1980; Rotonda: Valli 18.VII.1980 (PRN).

1435 *Craniophora ligustri* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)

Nuovi dati - **Calabria**: Umbriatico (KR), 422 m, 14.VII.1982 (RTN, PRN).

1439 *Cryphia receptricula* (**Hübner, 1803**)

Presente anche nel **Trentino**: 1901-1925; (1053).

1444 *Cryphia ochsi* (**Boursin, 1940**)

*Bryophila ochsi* è descritta su esemplari di Francia (Alpes Maritimes: Saint-Barnabé, VIII.1921 (*holotypus*), Saint-Laurent-du-Var; Bouches-du-Rhone: Arles-Trinquetaille; Vaucluse: Mont Ventoux), Italia (**Emilia**: Bologna 7-11.VIII.1933; **Piemonte** (recte **Lazio**): Anagni (coll. de Joannis)), Asia Minore (Amasia) e Siria (Beyrouth) (Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, 9 (7-10): 110) (1353).

Nota - La citazione generica per il **Piemonte**: (1943), probabilmente è ripresa da (1989), dove fra i paratipi sono elencati esemplari di Anagni, città in provincia di Frosinone (**Lazio**), erroneamente indicata del **Piemonte**. La presenza nel **Piemonte** peraltro è attestata da un esemplare di Miasino (Novara) presente nella collezione Floriani di Milano (3539).

Presente in **Piemonte**: 1951-1975; (3539);

Presente anche in **Campania**: 1976-2000; (3517).

1448 *Cryphia rectilinea* (**Warren, 1909**)

Presente anche nelle **Marche**: 1976-2000; (3522).

1449 *Cryphia raptricula* (**Denis & Schiffermüller, 1775**) (= *divisa* Esper, 1791; *raptriculoides* Turati, 1912)

*Phalaena Noctua divisa* è descritta su esemplari della **Toscana**: Firenze (9\*), (2576).

1454 *Orectis massiliensis* (**Millière, 1864**) (= *euprepiata* Dannhel, 1933)

Presente anche in **Romagna**: 1976-2000; (3522).

1457 *Simplicia rectalis* (**Eversmann, 1842**)

Citata genericamente per la **Toscana**: (1976-2000); (2561); da confermare.

1460 *Macrochilo cribrumalis* (**Hübner, 1793**)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); e nella **Venezia Giulia** 2001-2008; (3464 bis).

1463 *Herminia tenuialis* (**Rebel, 1899**)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1976-2000; (3464 bis).

1465 *Polypogon gryphalis* (**Herrich-Schäffer, 1851**)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1469 bis *Hipoepa fractalis* (**Guenée, 1854**)

Nota - Nuova per la fauna d'Italia.

- Rinvenuta in **Campania**: 2001-2008; (3486).
- 1470 *Zanclognatha zelleralis* (**Wocke, 1850**) (= *tarsicristalis* Herrich-Schäffer, 1851)  
Presente anche in **Romagna**: 2001-2008; (3432 ter).
- 1477 *Tyta luctuosa* (**Denis & Schiffermüller, 1775**) (= *italica* Fabricius, 1781)  
Nuovi dati - **Basilicata**: Vulture (PZ): Monticchio laghi, 700 m, 6.VI.1983; Pollino: Casa del Conte (PZ), 1100 m, 18.VI.1982 (PRN).
- 1478 *Aedia funesta* (**Esper, 1786**)  
Confermata per il **Piemonte**: 1951-1975 (3539).
- 1479 *Aedia leucomelas* (**Linnaeus, 1758**)  
Nuovi dati - **Sicilia**: (f. *rufimixta* Warr.) Caronia (ME), 304 m, VI.1926, VI.1927; Palermo: Villa Alliata 2.VI e IX.1927, X.1929, 26.VII.1945 (ALL).
- 1480 *Catephia alchymista* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)  
Nuovi dati - **Sicilia**: Caronia (ME), 304 m, VI.1926, VI.1927; Palermo: Villa Alliata 9.V.1932 (ALL).  
Presente anche nell'**Arcipelago campano**: 1901-1925; (3523).
- 1481 *Zethes insularis* **Rambur, 1833** (= *bruzzanaria* Costa A., 1863)  
In (3500), (3501) è stato erroneamente indicato Petagna come descrittore di *Geometra bruzzanaria* invece di Costa A.
- 1483 *Ophiusa tirhaca* (**Cramer, 1773**)  
Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 1976-2000; (3523).
- 1484 *Minucia lunaris* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)  
Presente anche nel **Friuli**: 1951-2008; (3462 ter), (3523).
- 1486 *Clytie illunaris* (**Hübner, 1813**)  
Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1976-2000; (3464 bis), (3523); in **Umbria**: 2001-2008; (3523); nell'**Arcipelago campano**: 1951-1975; (3523); e nell'**Arcipelago sardo**: 1976-2000; (3523).
- 1487 *Dysgonia torrida* (**Guenée, 1852**)  
Presente anche nel **Veneto**: 1926-1975; 2001-2008; (3455 bis), (3523); ed in **Romagna**: 2001-2008; (3523). Confermata la presenza in **Sardegna**: 1976-2000; (3523).
- 1488 *Dysgonia algira* (**Linnaeus, 1767**) (= *achatina* Sulzer, 1776)  
Nuovi dati - **Basilicata**: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 19.VI.1982 (PRN); **Calabria**: Santo Stefano di Rogliano (CS), 1100 m, 5-10.VII.1981; Umbriatico (KR), 422 m, 14.VII.1982 (RTN, PRN); Rossano (CS), 250 m, 23.VIII.1981 (PRN).
- 1489 *Grammodes bifasciata* (**Petagna, 1786**)  
Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); e nell'**Arcipelago sardo**: 1976-2000; (3523).
- 1490 *Grammodes stolidia* (**Fabricius, 1775**)  
Presente anche nell'**Arcipelago campano**: 1976-2000; (3523).

1491 *Euclidia glyphica* (Linnaeus, 1758)

Nota - Le nuove segnalazioni per il **Piemonte**: (3501) vanno così corrette: “Bienza Chiaverana” in Chiaverano: Bienza; “Val di Susa: San Giacomo Entracque 1250 m 17.VI.1982; Bardonecchia: Valle della Rho 1650 m 21.VI.1985” in: San Giacomo Entracque (CN) 1250 m 17.VI.1982; Val di Susa: Bardonecchia (TO), Valle della Rho 1650 m 21.VI.1985.

Nuovi dati - **Basilicata**: Pollino: Lago della Duglia (PZ), 1600 m, 6.VI.1981 (PRN).

1494 *Drasteria cailino* (Lefebvre, 1827)

Nuovi dati - **Calabria**: Monte Moschereto (CS) 1200 m 16.V.1983 (PRN).

Presente anche in **Puglia**: 2001-2008; (3514), (3523).

1495 *Catocala fulminea* (Scopoli, 1763)

Presente anche in **Sicilia**: 1951-1975, citazione da confermare (3523).

1496 *Catocala nymphaea* (Esper, 1787) (= *vestalis* Geyer, 1835)

*Catocala vestalis* è descritta su esemplari dell'Etruria (**Toscana**): Florence (60). *C. vestalis* è buona specie: (2576).

Presente anche nella **Valle d'Aosta**: 1976-2000; (3523); nell'**Alto Adige**: 1976-2000; (3523); nell'**Emilia**: 1951-1975; (3523); e in **Romagna**: 2001-2008 (3432 ter).

1499 *Catocala nymphagoga* (Esper, 1787)

Presente anche in **Piemonte**: 1976-2008; (3523); nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter); in **Emilia**: 1951-2008; (2346), (3523); e nell'**Arcipelago sardo**: 1976-2000; (3523).

1500 *Catocala diversa* (Geyer, 1827)

Presente anche in **Emilia**: 1926-1950; (3523); in **Umbria**: 2001-2008; (3523); ed in **Sardegna**: 2001-2008; (3523).

1502 *Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3523).

1503 *Catocala coniuncta* (Esper, 1787)

Presente anche in **Abruzzo**: 1976-2008; (3523); e nell'**Arcipelago sardo**: 1976-2000; (3523).

1504 *Catocala nupta* (Linnaeus, 1767)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1976-2000; (3464 bis), (3523); in **Umbria**: 1976-2008; (3523); ed in **Sicilia**: 1951-2000; (3523).

1505 *Catocala electa* (Vieweg, 1790)

Presente anche nell'**Arcipelago pugliese**: 1976-2000; (3523).

1508 *Catocala dilecta* (Hübner, 1808)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3523); e nell'**Emilia**: 1951-2000; (3523).

1510 *Catocala promissa* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche in **Calabria**: 1976-2000; (3513).

1511 *Catocala lupina* Herrich-Schäffer, 1851

Presente anche in **Puglia**: 2001-2008; (3515).

1512 *Catocala optata* (Godart, 1824)

Presente anche nell'**Emilia**: 1976-2000; (3523); ed in **Sardegna**: 1976-2008; (3461 quater), (3523).

1513 *Laspeyria flexula* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche nella **Venezia Giulia** 2001-2008; (3464 bis).

1516 *Lygephila lusoria* (Linnaeus, 1758)

Nota - È stato riesaminato lo status dei taxa *lusoria* (Linnaeus, 1758), *glycyrrhizae* (Staudinger, 1871) ed *amasina* (Staudinger, 1879); la citazione per la **Romagna** (2516), ripresa in (3429 bis), è inesatta per un errore di cartellinatura dell'esemplare, per cui la specie va esclusa dalla fauna di tale Regione (3523).

Non presente in **Romagna**

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis), (3523); e nella **Venezia Giulia**: 1976-2000; (3464 bis).

1518 *Lygephila pastinum* (Treitschke, 1826)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3523); nella **Venezia Giulia**: 1976-2000; (3523); e nell'**Abruzzo**: 2001-2008; (3523).

1519 *Lygephila viciae* (Hübner, 1822)

Nota - La segnalazione relativa alla **Romagna**: (1010) è certamente errata come si può chiaramente desumere da (1885) dove *Lygephila viciae* Hbn. è stata rimossa e sostituita con *Lygephila craccae* (Denis & Schiffermüller, 1775): (3523).

Non ancora segnalata in **Romagna**.

Citata per la **Venezia Giulia**, con dubbio: 1901-1975; (1053 bis); presente in **Abruzzo**: 1976-2000; (3523).

1520 *Lygephila craccae* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Basilicata**: San Severino Lucano (PZ), 700 m, 15.IX.1979 (PRN).

1523 *Autophila hirsuta* (Staudinger, 1870)

Nota - La citazione Dolomiti: (2129), erroneamente attribuita al **Veneto** in (3500), (3501), va riferita al **Trentino**.

Non ancora segnalata nel **Veneto**.

1524 *Autophila limbata* (Staudinger, 1871)

Nota - La specie è stata riportata erroneamente per il **Piemonte**: (3378), questa citazione va invece riferita ad *A. dilucida* (3523).

Non ancora segnalata in **Piemonte**.

1525 *Autophila dilucida* (Hübner, 1808) (= *berioi* Bytinski-Salz, 1937)

*Autophila berioi* è descritta su esemplari della **Sardegna**: Aritzo (1303).

Nota - La citazione **Sicilia**: (3331); va riferita alla **Basilicata**.

Nuovi dati - **Sicilia**: Palermo: Villa Alliata 6.IV, 27 e 29.V.1945, 20.V.1947 (ALL).

Presente anche nell'**Arcipelago campano**: 1901-1925; (3523).

1527 *Autophila cataphanes* (Hübner, 1813)

Nota - La citazione per la **Venezia Giulia**: (1060) è probabilmente da riferire a *A. anaphanes* o *A. ligaminosa* (3523).

Presente anche in **Piemonte**: 2001-2008; (3523), e nell'**Arcipelago campano**: (1926-1950); (1207).

1528 *Autophila anaphanes* Boursin, 1940

Nota - La citazione per la **Sicilia** di *A. cataphanes*: (1340) è stata riportata erroneamente anche per *A. anaphanes* in (3501); la prima segnalazione di *A. anaphanes* per la **Sicilia** è: (1384).

1530 *Calyptra thalictri* (Borkhausen, 1790)

Presente anche in **Campania**: 1976-2000; (3523).

1531 *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758)

Presente anche nell'**Arcipelago campano**: 1951-1975; (3523).

1532 *Rhynchodontodes antiqualis* (Hübner, 1809)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter).

1543 *Rivula sericealis* (Scopoli, 1763)

Nuovi dati - **Sicilia**: Palermo: Villa Alliata 26.IV.1927, VII e VIII.1928, IX e X.1929 (ALL).

1545 *Parascotia fuliginaria* (Linnaeus, 1761)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); e nella **Venezia Giulia**: 1976-2000; (3464 bis).

1547 *Zebeeba falsalis* (Herrich-Schäffer, 1839)

Presente anche nelle **Marche**: 1976-2000; (3522).

1548 *Eutelina adulatrix* (Hübner, 1813) (= *aetnea* Costa O.G., 1839)

*Eriopus aetnea* è descritta su un esemplare della **Sicilia**: falde meridionali dell'Etna (89).

Per un refuso è stato indicato in: (3501) *Eriopus aetna*.

1552 *Abrostola agnorista* Dufay, 1956

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); è riportata genericamente per la **Sardegna**: (1976-2000); (2561), sola citazione, da confermare.

1553 *Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1758) (= *trigemina* Wernerburg, 1864)

Nuovi dati - **Basilicata**: Pollino: Casa del Conte (PZ), 1100 m, 18.VI.1982 (PRN).

1554 *Trichoplusia ni* (Hübner, 1803)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter).

1555 *Thysanoplusia orichalcea* (Fabricius, 1775)

Le citazioni per il **Piemonte**: (1388), la **Lombardia**: (470), l'**Alto Adige**: (170) e l'**Emilia**: (1388) sono da riferire a *Diachrysis chryson* (Esper, 1789).

Non presente in **Italia settentrionale**.

1558 *Ctenoplusia accentifera* (Lefebvre, 1827) (= *L-aureum* Freyer, 1831)

Nuovi dati - **Sicilia**: Palermo: Villa Alliata 5.IV, 18.VI, 20.VII.1926, 18.VI.1946, Via N. Morello VII.1927 (ALL).

1559 *Chrysoideixis chalcites* (Esper, 1789)

Nota - Berio: (2642) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: ovunque".

1560 *Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850) (= *circumflexa* Denis & Schiffermüller, 1775; *circumflexa* Esper, 1787; *clavata* Cyrillus, 1787; *gutta* Guenée, 1852)

Nuovi dati - **Basilicata**: Massiccio del Pollino: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 6.X.1983; Rotonda (PZ), 600 m, 9.VIII.1980; Rotonda: Valli, 700 m, 18.VII.1980 (PRN). **Sicilia**: Caronia (ME), 304 m, VI.1927 (ALL).

1562 *Diachrysis chrysitis* (Linnaeus, 1758)

Nuovi dati - **Basilicata**: San Severino Lucano (PZ), 900 m, 6.VII.1981 (PRN).

1564 *Diachrysis nadeja* (Oberthür, 1880)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1976-2000; (3464 bis).

1565 *Diachrysis zosimi* (Hübner, 1822)

Presente anche in **Lombardia**: 1925-1950; (1198), (1539); e nella **Venezia Giulia**: 1976-2000; (3464 bis).

1571 *Euchalcia modestoides* Poole, 1989 (= *modesta* Hübner, 1786)

Presente anche in **Puglia**: 2001-2008; (3515).

1572 *Polychrysis moneta* (Fabricius, 1787)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3464 bis).

1575 *Lamprotes c-aureum* (Knoch, 1781)

Confermata per il **Piemonte**: 1951-1975; (3539); presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3464 bis).

1577 *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758) (= *voelkeri* Schadewald, 1992)

Nota - Berio: (2642) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: tutta la penisola e le isole". Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 1951-1975; (2110).

1587 *Plusia festucae* (Linnaeus, 1758)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1594 *Phyllophila obliterata* (Rambur, 1833)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

1597 *Deltote uncula* (Clerck, 1759)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

1600 *Pseudeustrotia candidula* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

1601 *Coccidiphaga scitula* (Rambur, 1833)

Nuovi dati - **Sicilia**: Palermo: Villa Alliata V.1926, VIII.1944, 14.VI-11.IX.1945 (numerosi esemplari) (ALL).

1602 *Odice arcuinna* (Hübner, 1790)

Segnalata genericamente per la **Sardegna**: (1976-2000); (2561).

1604 *Odice jucunda* (Hübner, 1813)

Nota - La citazione: (3272), per il **Piemonte**, va riferita alle Alpi Marittime francesi.

- Si ha solo una segnalazione generica per le Alpi del **Piemonte**: (736).
- 1605 *Calymma communimacula* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)  
Nota - La citazione: (1659), erroneamente attribuita alla **Liguria** in (3501), va riferita all'**Emilia**.
- 1610 *Eublemma candidana* (**Fabricius, 1794**) (= *minuta* Hübner, 1808; *perlana* Frölich, 1830, in Hübner)  
Nuovi dati - **Calabria**: Monte Moschereto (CS), 800 m, 15.VII.1980 (PRN).
- 1613 *Eublemma ostrina* (**Hübner, 1808**)  
Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter).
- 1618 *Eublemma purpurina* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)  
Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter).
- 1624 *Araeopteron ephaea* **Hampson, 1914**  
Nota - L'autore non va fra parentesi
- 1626 *Metachrostis velox* (**Hübner, 1813**)  
Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter); ed in **Campania**: 1976-2000; (3517).
- 1628 *Metachrostis dardouini* (**Boisduval, 1840**)  
Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter).
- 1630 *Xanthodes albag* (**Fabricius, 1794**) (= *malvae* Esper, 1804)  
Presente anche in **Romagna**: 1976-2000; (3522).
- 1634 *Cucullia cineracea* **Freyer, 1841**  
È riportata per l'**Abruzzo**: scarpate rocciose calde e secche delle Alpi e dell'**Abruzzo**: (2877); probabile confusione con la **Toscana**, da confermare.
- 1638 *Cucullia xeranthemi* **Boisduval, 1840**  
Nuovi dati - **Molise**: Gambatesa, torrente Tappino, 20.VII.2004 (SCR).  
Presente anche nel **Molise**: 2001-2008; (3453 bis).
- 1641 *Cucullia umbratica* (**Linnaeus, 1758**)  
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressochè in tutte le stazioni della penisola, non si sono trovati reperti del territorio insulare".
- 1643 *Cucullia santolinae* **Rambur, 1834**  
Nota - La citazione di *Cucullia santolinae* per il **Piemonte** in (2373), erroneamente ripresa in (3183), (3500), (3501), va riferita a *C. campanulae* (2642).  
Non presente in **Piemonte**.  
Presente in **Venezia Giulia**: 1951-1975; (1780).
- 1645 *Cucullia calendulae* **Treitschke, 1835** (= *wredowi* Costa O.G., 1836; *dellabrunai* Berio, 1980)  
Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 1951-1975; (2041), e nell'**Arcipelago siciliano**: 2001-2008; (3491).
- 1650 *Cucullia dracunculi* (**Hübner, 1813**)

Presente anche in **Lombardia**: 1926-1950; (1438); e in **Romagna**: 1976-2000; (3522).

1653 *Shargacucullia caninae* (Rambur, 1833)

Nota - Tutte le larve del gruppo *caninae* - *blattariae* osservate nell'Appennino centrale (**Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo**) presentano le caratteristiche della tipica *blattariae* (3498).

1654 *Shargacucullia blattariae* (Esper, 1790)

Nota - Tutte le larve del gruppo *caninae* - *blattariae* osservate nell'Appennino centrale (**Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo**) presentano le caratteristiche della tipica *blattariae*, che quindi sarebbe presente almeno in queste regioni peninsulari (3498).

Presenza accertata in **Toscana**: (3498), **Umbria**: (3498), **Lazio**: (3498), e **Abruzzo**: (3498).

1656 *Shargacucullia gozmanyi* Ronkay G. & Ronkay L., 1994

Presente in **Friuli**: 1976-2008; (3498), e **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3498).

1666 *Omphalophana antiirrhinii* (Hübner, 1803)

Nuovi dati - **Basilicata**: Pollino: Casa del Conte (PZ), 1100 m, 18.VI.1982 (PRN).

1667 *Omphalophana serrata* (Treitschke, 1835)

Nuovi dati - **Sicilia**: Casteldaccia (PA), 79 m, 12.IV.1927 (ALL).

1671 *Sympistis nigrata* (Boisduval, 1840)

Presente anche nel **Veneto**: 1901-1925; (1038).

1682 *Omia cyclopea* (de Graslin, 1837)

Presso il Museo di Bergamo esiste un esemplare etichettato '**Italia**': (2373).

1687 *Asteroscopus sphinx* (Hufnagel, 1766)

Presente anche in **Puglia**: 2001-2008; (3515).

1688 *Brachionycha nubeculosa* (Esper, 1785)

Presente anche in **Lombardia**: 1976-2000; (2373).

1690 *Pyrois effusa* (Boisduval, 1829)

Nuovi dati - **Sicilia**: Caronia (ME), 304 m, VI.1926, Palermo: Malaspina VI.1927, 26.V.1945 (ALL).

1691 *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758)

È presente in **Sardegna**, insieme a *A. berbera*: (2001-2008); (3489). Non si hanno altre citazioni.

1694 *Amphipyra livida* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Confermata per il **Piemonte**: 1951-1975; (3539).

1695 *Amphipyra tragopoginis* (Clerck, 1759)

Nuovi dati - **Basilicata**: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 9.VI.1983; Rotonda (PZ), 950 m, 16.IX.1979; Timpone Castellana (PZ), 110 m, 13.IX.1979; Piana San Francesco (PZ), 1550 m, 24.IX.1981 (PRN). **Sicilia**: Caronia (ME), 304 m, VI.1926, X.1929, Palermo: Villa Alliata 14.VIII.1927 (ALL).

1698 *Condica viscosa* (Freyer, 1831)

Nota - La citazione Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 6-10.X.1992 (1m): (3501), erroneamente attribuita alla **Puglia**, va riferita alla **Basilicata**.

Presente anche in **Basilicata**: 1976-2000; (3501).

1700 *Aegle semicana* (Esper, 1798)

Nota - La citazione: (2725) è stata attribuita per una svista alla **Romagna** in (3501). Non ancora segnalata in **Romagna**.

Presente anche in **Emilia**: 1926-1950; (2725).

1705 *Schinia cardui* (Hübner, 1790)

La nuova località riportata in (3501) Poggio di Carasco va corretta in Poggio di Casasco.

1707 *Schinia scutosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche in **Romagna**: 2001-2008; (3522).

1711 *Heliothis peltigera* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *florentina* Esper, 1788)

Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 1951-1975; (2110).

1713 *Helicoverpa armigera* (Hübner, 1808) (= *obsoleta* auct. nec Fabricius, 1775; *barbara* Fabricius, 1794; *guidellii* Costantini, 1922)

*Heliothis guidellii* è descritta su esemplari dell'**Emilia**: agro Mutinensi (dintorni di Modena) (983). *Heliothis guidellii* Costantini, 1922, è riportata come buona specie in (2576); nella descrizione è detto che è molto simile a *H. armigera*, ma di dimensioni minori.

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1716 (-) *Periphanes treitschkei* (Frivaldsky, 1835)

La citazione in: (3500) per l'**Emilia** è dovuta ad una svista, in quanto la f. *petricolor* e la ssp. *italica* sono state descritte come forma e ssp. di *Scotogramma treitschkei*, sinonimo di *Hadula pugnax*.

*Periphanes treitschkei* non fa parte della fauna italiana, come precisato in: (3501).

1719 *Brithys crini* (Fabricius, 1775) (= *pancratii* Cyrillus, 1787; *encausta* Hübner, 1808)

Presente anche nell'**Arcipelago siciliano**: 1976-2000; (2373).

1720 *Elaphria venustula* (Hübner, 1790)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis). La **Sicilia** e la **Sardegna** sono coperte nella cartina: (3489); non risultano altre segnalazioni.

1723 *Caradrina morpheus* (Hufnagel, 1766)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis). La **Sardegna** è coperta nella cartina: (3489); non risultano altre segnalazioni.

1726 (-) *Platyperigea petraea* Tengström, 1869 (= *grisea* Eversmann, 1848)

La citazione per l'**Alto Adige**: (1053), ripresa in (1388), (2931), (3500), (3501), è errata. *Caradrina* (*Platyperigea*) *petraea* non fa parte della fauna italiana.

1727 *Platyperigea terreia* Freyer, 1840

Nota - Sarebbe presente in tutta **Italia**, coperta nella cartina: (3489).

1729 *Platyperigea kadenii* (Freyer, 1836)

Il luogo tipico di *Caradrina* (*Platyperigea*) *kadenii* ssp. *insularis*, descritta su esemplari della **Sardegna**: (3375), è la sola località certa per l'isola (3489).

1730 *Platyperigea proxima* (Rambur, 1837)

Confermata la presenza in **Sardegna**: 1976-2008; (3461 quater).

1731 *Platyperigea germainii* (Duponchel, 1835)

Nota - La citazione per l'**Alto Adige** in (1207), ripresa in (2350), probabilmente è dovuta a errata etichettatura (3489).

Non presente in **Alto Adige**.

Presente anche in **Toscana**: 2001-2008; (3493).

1732 *Platyperigea ingrata* (Staudinger, 1897)

Nota - Non presente in **Sicilia**: (3489). Pertanto la segnalazione in (2597), va riferita ad altra specie. La **Sardegna** meridionale è coperta nella cartina: (3489); non risultano altre segnalazioni per l'**Italia**.

1733 *Paradrina selini* (Boisduval, 1840)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter).

1735 *Paradrina fuscicornis* (Rambur, 1832) (= *pseudoterrea* De Laever, 1980)

Nota - La citazione di *Caradrina fuscicornis* per il **Piemonte**: (3378), è da riferire a *C. flavirena*: (3539). Le citazioni di *C. fuscicornis* per la **Sicilia**: (609), (1340), riprese in (506), (2987), (3500), (3501), sono da riferire a altra specie, *C. abruzzensis* o *C. selini*: (3489).

Non presente in **Piemonte** e in **Sicilia**.

Presente anche in **Alto Adige**: 1926-1950; (1184).

1739 *Paradrina noctivaga* Bellier, 1863

Nota - La presenza di *C. noctivaga* in **Italia continentale** e **Sardegna** va verificata. Secondo (3375), (3489), la presenza di *C. noctivaga* è accertata solo per la **Sardegna**: Nebrodi: Segheria, ma tale località è in realtà della **Sicilia**.

La presenza in **Sardegna** è da confermare.

Presente in **Sicilia**: 1976-2000; (3375).

1743 bis *Eremodrina flava* Oberthür, 1876

Nota - Nuova per la fauna italiana.

Rinvenuta in **Toscana**: 2001-2008; (3493).

1744 *Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781) (= *alsines* Brahm 1791; *alsinides* Costantini, 1922; *noguera* De Laever, 1976)

Nuovi dati - **Calabria**: Umbriatico (KR), 422 m, 14.VII.1982 (RTN, PRN).

1752 *Spodoptera exigua* (Hübner, 1808) (= *fulgens* Geyer, 1832; *junceti* Zeller, 1847)

*Noctua fulgens* è descritta su esemplari della **Sicilia** (52\*), (2576). *Caradrina junceti* è descritta su esemplari della **Sicilia**: Siracusa, Catania (109).

1754 *Spodoptera littoralis* (Boisduval, 1833)

Presente anche nel Molise: 2001-2008; (3346 bis).

1760 *Proxenus hospes* (Freyer, 1831)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); e nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

1767 *Polyphaenis sericata* Esper, 1787 (= *viridis* de Villers, 1789; *sericina* Esper, 1790)

Nota - Il nome specifico ritorna ad essere "*sericata*" (3489).

Nuovi dati - **Basilicata**: Pollino: Timpone Balsamano (PZ), 1100 m, 13.VIII.1980 (PRN).

1769 *Thalpophila matura* (Hufnagel, 1766) (= *texta* Esper, 1787)

*Phalaena Noctua texta* è descritta su esemplari della **Toscana**: Firenze (9\*), (3079).

1772 *Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758)

La **Sardegna** è coperta nella cartina: (3489); non risultano altre citazioni per l'isola.

1773 *Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758)

Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 1951-1975; (2110).

1775 *Hyppa rectilinea* (Esper, 1788)

Confermata per il **Piemonte**: 1951-2000; (3539). Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis).

1779 *Actinotia hyperici* (Denis & Schiffermüller, 1775)

La nuova località per la **Sardegna**: S'Arca de Tassoni (3501), va corretta in S'Arcu de Tascussi.

1780 *Callopietria juvenina* (Stoll, 1782)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1783 *Eucarta virgo* (Treitschke, 1835) (= *spencei* Boisduval, 1840)

*Placodes spencei* è descritta su esemplari della **Lombardia** (Italia boreale) (88).

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1784 *Ipimorpha retusa* (Linnaeus, 1761)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); e nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

1785 *Ipimorpha subtusa* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

1788 *Parastichtis suspecta* (Hübner, 1817)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter).

1790 *Mesogona acetosellae* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter).

1792 *Dicycla oo* (Linnaeus, 1758)

Nuovi dati - **Basilicata**: Pollino: Rotonda (PZ), 950 m, 20.VI.1983 (PRN). **Calabria**: Monte Moschereto (CS), 800 m, 15.VII.1980 (PRN).

1793 *Cosmia diffinis* (Linnaeus, 1767)

Confermata la presenza in **Romagna**: 2001-2008; (3432 ter).

1801 *Helotropha leucostigma* (Hübner, 1808)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis),

1802 *Eremobia ochroleuca* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Calabria**: Santo Stefano di Rogliano (CS), 1100 m, 5-10.VII.1981 (RTN, PRN).

1804 *Gortyna xanthenes* (Germar, 1842)

Nota - L'autore va fra parentesi, essendo stata descritta come *Hydroecia xanthenes*. La citazione: (3272), erroneamente attribuita alla **Liguria** in (3501), va riferita al **Lazio**.

Presente anche in **Liguria**: 1976-2000; (2648).

1807 *Gortyna borelii* Pierret, 1837 (= *leucographa* auct. nec Borkhausen, 1792; *fiorii* Berio, 1963; *galassii* Berio, 1963)

Nuovi dati - **Basilicata**: Pollino: Rotonda (PZ), 600 m, 13.XI.1983 (1f) (PRN).

1808 *Hydraecia micacea* (Esper, 1789)

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis).

1810 *Hydraecia petasitis* Doubleday, 1847

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter).

1811 *Hydraecia osseola* (Staudinger, 1882)

Presente anche in **Emilia**: 1976-2000; (2271), (2643).

1812 *Amphipoea fucosa* (Freyer, 1830)

Nota - La citazione Morano sul Po (AL) (*nec* Pozzolo Formigaro, *ex verbis* Cabella) (3461 bis); è da riferire a *Hadena luteago* (*ex verbis* Cabella).

*Amphipoea fucosa* non è ancora segnalata in **Piemonte**.

1815 *Luperina testacea* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *curoi* Berio, 1993)

Nota - Le citazioni di *L. testacea* per la **Romagna** sono da riferire a *L. tiberina*: (3522).

Non presente in **Romagna**.

1819 *Luperina tiberina* (Sohn-Rethel, 1929) (= *sohnretheli* Draudt, 1931)

Nuovi dati - **Basilicata**: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 8.X.1983 (PRN).

1820 *Luperina nickerlii* (Freyer, 1845)

Confermata la presenza in **Liguria**: 1951-1975; 2001-2008; (1693), (3477).

1827 *Phragmatiphila nexa* (Hübner, 1808)

Nota - il genere è *Phragmatiphila* e non *Phragmitiphila*

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis); e nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

1830 *Lenisa geminipuncta* (Haworth, 1809)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

1831 *Archanara neurica* (Hübner, 1808)

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis); e nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

1832 *Archanara dissoluta* (Treitschke, 1825)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

1833 *Coenobia rufa* (Haworth, 1809)

- Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis).
- 1835 *Denticullus pygmina* (**Haworth, 1809**)  
Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter).
- 1839 *Photedes minima* (**Haworth, 1809**)  
Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis).
- 1840 *Photedes morrisii* (**Dale, 1837**)  
Presente anche nella **Venezia Giulia**: 1976-2000; (3464 bis).
- 1842 *Capsula sparganii* (**Esper, 1790**)  
Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis); e nella **Venezia Giulia**: 1976-2000; (3464 bis).
- 1846 *Apamea epomidion* (**Haworth, 1809**)  
Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis).
- 1847 *Apamea aquila* **Donzel, 1837** (= *funerea* Heinemann, 1859)  
Presente anche in **Piemonte**: 1976-2000; (3539).
- 1849 *Apamea anceps* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)  
Presente anche in **Emilia**: 1951-1975; (1659).
- 1857 *Abromias syriaca* (**Osthelder, 1933**) (= *tallosi* Kovacs & Varga, 1969)  
Nuovi dati - **Calabria**: Santo Stefano di Rogliano (CS), 1100 m, 5-10.VII.1981 (RTN, PRN).
- 1858 *Abromias lithoxylaea* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)  
Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter).
- 1859 *Abromias sublustris* (**Esper, 1788**) (= *horrida* Dannehl, 1929)  
*Hadena lithoxylaea* v. *horrida* è descritta su individui dell'**Abruzzo**: Roccaraso, Pescocostanzo, Pescasseroli (1127).  
Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis).
- 1862 *Abromias platinea* (**Treitschke, 1825**)  
Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter), e nel **Molise**: 2001-2008; (3453 bis).
- 1866 *Abromias rubrarena* (**Treitschke, 1825**)  
Nota - La nuova citazione: Val Gardena: San Cristino, 1800 m, 8.VIII.1954 (3501) va corretta in Santa Cristina.
- 1867 *Lateroligia ophiogramma* (**Esper, 1794**)  
Presente anche in **Piemonte**: 1951-1975, 2001-2008; (3539); e nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).
- 1869 *Mesapamea secalella* **Remm, 1983** (= *didyma* auct. nec Esper, 1788)  
Nota - La citazione: (2085) per le **Marche** riportata in (3500), (3501) si basava sulla presenza della ab. *struvei*, che in (3461) è attribuita a *M. secalis*.  
*Mesapamea secalella* non è segnalata nelle **Marche**.
- 1874 *Oligia strigilis* (**Linnaeus, 1758**)  
Nuovi dati - **Basilicata**: Terranova di Pollino (PZ): sorgente Acquafredda, 950 m,

19.VI.1982 (PRN).

Presente anche in **Campania**: 1976-2000; (3517).

1875 *Oligia latruncula* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)

Nuovi dati - **Basilicata**: Pollino: Casa del Conte (PZ), 1100 m, 18.VI.1982 (PRN).

1876 *Oligia versicolor* (**Borkhausen, 1792**)

Nuovi dati - **Calabria**: Umbriatico (KR), 422 m, 10.VII.1982 (RTN, PRN).

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1877 *Oligia dubia* (**Heydemann, 1942**)

La citazione di *O. dubia* per la **Romagna** in: (2412), ripresa in (2516), (3062), è un errore di cartellinatura, probabilmente da riferire al **Friuli** (3522).

Non presente in **Romagna**.

1878 *Oligia fasciuncula* (**Haworth, 1809**)

Presente anche in **Piemonte**: 1951-1975; (3539).

1880 *Sesamia nonagrioides* (**Lefèbvre, 1827**)

Presente anche nelle **Marche**: 2001-2008; (3507).

1883 *Hadula pugnax* (**Hübner, 1824**)

Nota - La nuova località: (ssp. *italica* Berio) Valtellina: San Salvatore 19.VI.1960 (3501), riportata erroneamente per il **Veneto**, va riferita alla **Lombardia**.

Presente anche nell'**Alto Adige**: 1976-2000; (3081).

1884 *Hadula odontites* (**Boisduval, 1829**) (= *marmorosa* Borkhausen, 1792, *nec* Esper, 1788; *microdon* Guenée, 1852; *nana* auct. *nec* Hufnagel)

*Phalaena Noctua marmorosa* è descritta su esemplari della **Venezia Giulia**: Trieste (16\*), (2576).

Nuovi dati - **Sicilia**: Palermo: Villa Alliata 5.X.1925, 26.VII, 6.IX.1926, 4-6.VI.1927, IX.1927, VI.1929, IX.1929, X.1929, 1.V.1932, 14.V, 8 e 22.VI, 7, 9 e 24.VIII, 29.IX, 10.X.1945, 14.VI, 6 e 18.VIII.1946, 2 e 12.VI, 8.IX.1948, 26.IV, V.1955, 20.IX.1967 (ALL).

1886 *Hadula trifolii* (**Hufnagel, 1766**) (= *chenopodii* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni".

Nuovi dati - **Calabria**: Umbriatico (KR), 422 m, 10.VII.1982 (RTN, PRN).

1887 *Hadula stigmosa* (**Christoph, 1887**)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

1889 *Hadula melanopa* (**Thunberg, 1791**)

Presente anche nel **Veneto**: 1901-1925; (1038).

1891 *Coranarta cordigera* (**Thunberg, 1788**)

Confermata per la **Lombardia**: 1976-2000; (2373).

1892 (-) *Cardeпия sociabilis* (**de Graslin, 1850**)

Nota - Le citazioni di *C. sociabilis* di Sardegna e Sicilia vanno riferite a *C. affinis* (3493).

*Cardeпия sociabilis* non fa parte della fauna italiana.

1893 *Cardeпия affinis* **Rothschild, 1913**

Presente in **Sardegna**: 1976-2000; (2428); (3081); in **Toscana**: 1976-2000; (3493); ed in **Sicilia**: 1976-2005; (2636); (3254).

1905 *Lacanobia splendens* (**Hübner, 1808**)

Presente anche nel **Lazio**: 1976-2000; (3493).

1897 *Polia nebulosa* (**Hufnagel, 1766**)

Presente anche in **Emilia**: 1976-2000; (2373).

1899 *Pachetra sagittigera* (**Hufnagel, 1766**)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché in tutte le stazioni".

1900 *Lacanobia w-latinum* (**Hufnagel, 1766**)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché in tutte le stazioni; non vi sono reperti in Sardegna".

Nuovi dati - **Basilicata**: Pollino: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 6.VI.1981, 31.V.1983; San Severino Lucano (PZ), 700 m, 7.VII.1981 (PRN).

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1902 *Lacanobia contigua* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)

Presente anche in **Emilia**: 1951-1976; (2373).

1903 *Lacanobia suasa* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Settore padano: Pressochè tutte le stazioni".

1904 *Lacanobia oleracea* (**Linnaeus, 1758**)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni".

1905 *Lacanobia splendens* (**Hübner, 1808**)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); e nella **Venezia Giulia**: 1976-2000; (3464 bis).

1906 *Lacanobia aliena* (**Hübner, 1809**)

Presente nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter).

1907 *Lacanobia blenna* (**Hübner, 1824**)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

1908 *Melanchra persicariae* (**Linnaeus, 1761**)

Nuovi dati - **Lombardia**: Cittiglio (VA), 254 m, VI.1968 (GLL, PRN).

1911 *Hada plebeja* (**Linnaeus, 1761**)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Settore alpino orientale: Pressochè tutte le stazioni; Settore prealpino: Pressochè tutte le stazioni; Settore alpino occidentale: Pressochè tutte le stazioni".

1913 *Mamestra brassicae* (**Linnaeus, 1758**)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni".

1915 *Sideridis turbida* (**Esper, 1790**)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1917 *Sideridis reticulata* (**Goeze, 1781**)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Settore alpino orientale: Pressochè tutte le stazioni; Settore prealpino: Pressochè tutte le stazioni; Settore alpino occidentale: Pressochè tutte le stazioni".

1918 *Sideridis kitti* (Schawerda, 1914)

Presente anche in **Piemonte**: 1951-2000; (2373), (3539).

1921 *Conisania renati* (Oberthür, 1890)

Nota - La citazione: (3288), riportata per il **Piemonte** in (3500), (3501), è nelle Alpi Marittime francesi.

Non ancora segnalata per il **Piemonte**.

1922 *Conisania luteago* (Denis & Schiffermüller, 1775)

*Hadena behouneki* è descritta su esemplari della **Sardegna**: Tempio Pausania, Monte Ortobene, Belvi, Aritzo, Aritzo: Sa Casa (2302). *Hadena behouneki* è ssp. di *Conisania luteago*: (3288).

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressochè in tutte le stazioni".  
Nuovi dati - **Basilicata**: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 6.VI.1981, 31.V.1983; San Severino Lucano (PZ), 700 m, 7.VII.1981 (PRN).

1926 *Hecatera dysodea* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressochè tutte le stazioni".

1929 *Hadena bicruris* (Hufnagel, 1766)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (2373), (3462 ter).

1932 *Hadena compta* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Settore alpino orientale: pressochè tutte le stazioni; Settore alpino occidentale: pressochè tutte le stazioni; Settore appenninico: pressochè tutte le stazioni; Settore ligure: pressochè tutte le stazioni".

1933 *Hadena confusa* (Hufnagel, 1766) (= *conspersa* Denis & Schiffermüller, 1775; *nana* Rottemburg, 1776)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Settore alpino orientale: pressochè tutte le stazioni; Settore appenninico: pressochè tutte le stazioni; Settore apulo salentino: pressochè tutte le stazioni; Settore campano calabrico: pressochè tutte le stazioni; Settori sardo e siculo: pressochè tutte le stazioni".

1938 *Hadena luteocincta* (Rambur, 1834) (= *kruegeri* Turati, 1907; *dubia* Turati, 1911)

Presente anche in **Romagna**: 1976-2000; (3522).

1939 *Hadena filograna* (Esper, 1788)

Presente anche in **Sardegna**: 1976-2000; (2373).

1942 *Hadena perplexa* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *lepida* Esper, 1790 *nec* Cramer, 1777; *carpophaga* Borkhausen, 1792; *nisus* Germar, 1843; *nisus* Herrich-Schäffer, 1845)

*Miselia nisus* è descritta su esemplari della **Sicilia** (35\*), (2576).

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressochè tutte le stazioni.

1945 *Hadena silenes* (Hübner, 1822) (= *calcescens* Dannehl, 1929)

*Dianthoecia silenes* r. *calcescens* è descritta su individui dell'**Abruzzo**: Montagna Grande, Monte Sirente, Pescasseroli, Terrazza presso Gioia Vecchio, 1000-1200 m (1127).

Presente anche nelle **Marche**: 1976-2000; (2373); e nell'**Arcipelago laziale**: 1976-2000; (2373).

1946 *Hadena sancta* (Staudinger, 1859)

*Hadena protai* è descritta su esemplari dell'**Arcipelago sardo**: Calasetta (Isola di Sant'Antioco) (*holotypus*) e **Sardegna** (Santa Margherita Pula, Monte Limbara, Tempio Pausania, Costiadas) (2127).

Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 1926-1976; (2041), (2127).

1948 *Lasionycta proxima* (Hübner, 1809) (= *noguera* de Laever, 1976)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Settore alpino orientale, Pressochè tutte le stazioni". La nuova segnalazione: Valtellina: Sant'Antonio di Valfurva 10.IX.1933 (3501), riportata erroneamente per il **Veneto**, va riferita alla **Lombardia**.

Presente anche nel **Friuli** 2001-2008; (3464 bis).

1953 *Tholera decimalis* (Poda, 1761)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni".

1956 *Mythimna pudorina* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); e nella **Venezia Giulia** 2001-2008; (3464 bis).

1957 *Mythimna conigera* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni".

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

1959 *Mythimna impura* (Hübner, 1808)

Presente anche in **Toscana**: 2001-2008; (3335°).

1960 *Mythimna straminea* (Treitschke, 1825)

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis).

1961 *Mythimna vitellina* (Hübner, 1808)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni".

Nuovi dati - **Basilicata**: Monte Vulture (PZ) 1350 m 30.IV.1983; Terranova di Pollino, 950 m, 6.VI.1981, 31.VII.1983; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; San Severino 15.IX.1979; Piana San Francesco 14.VIII.1980 (PRN). **Calabria**: Civita: Torrente Raganello 16.V.1983; Rossano (CS), 250 m, 23.VIII.1981 (PRN).

Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 1951-1975; (2110).

1962 *Mythimna unipuncta* (Haworth, 1809)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché in tutte le stazioni".

Nuovi dati - **Puglia**: Trinitapoli (FG), 5 m, 6.X.1983; Mar Piccolo (TA): Palude La Vela, 1 m, 6.VII.1980 (PRN).

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis); e nell'**Arcipelago sardo**: 1951-1975; (2110).

1965 *Mythimna sicula* (**Treitschke, 1835**)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1966 *Mythimna scirpi* (**Duponchel, 1836**)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni".

1968 *Mythimna languida* (**Walker, 1858**)

Presente anche in **Toscana**: 2001-2008; (3364 bis).

1969 *Mythimna albipuncta* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni".

Nuovi dati - **Basilicata**: Monte Vulture (PZ) 1350 m 30.IV.1983; San Severino Lucano: contrada Magnano 800 m 7.VII.1981; Pollino: Lago della Duglia, 1600 m, 18.VII.1982; Terranova di Pollino, 950 m, 8 e 11.X.1983 (PRN). **Calabria**: Santo Stefano di Rogliano (CS), 1100 m, 5-10.VII.1981 (RTN, PRN).

1970 *Mythimna ferrago* (**Fabricius, 1787**)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni".

1971 *Mythimna congrua* (**Hübner, 1817**)

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis).

1972 *Mythimna l-album* (**Linnaeus, 1767**)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni".

Nuovi dati - **Puglia**: Trinitapoli (FG), 5 m, 6.X.1983; Mar Piccolo (TA): Palude La Vela, 1 m, 6.VII.1980 (PRN).

Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 1951-1975; (2110).

1973 *Anapoma riparia* (**Boisduval, 1829**)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

1975 *Leucania obsoleta* (**Hübner, 1803**)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); e nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

1976 *Leucania zaeae* (**Duponchel, 1827**)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

1981 *Leucania loreyi* (**Duponchel, 1827**) (= *caricis* Treitschke, 1835)

*Leucania caricis* è descritta su esemplari della **Sicilia**: Palermo (75).

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1982 *Senta flammea* (Curtis, 1828)

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis); e nella **Venezia Giulia**: 1976-2000; (3464 bis).

1983 *Panolis flammea* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *griseovariegata* Goeze, 1781; *piniperda* Panzer, 1786)

Presente anche in **Romagna**: 2001-2008; (3522).

1986 *Orthosia cerasi* (Fabricius, 1775) (= *stabilis* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni".

Nuovi dati - **Basilicata**: Pollino: Lago Fondo (PZ) 1700 m 15.V.1983, Rifreddo (PZ): Hotel Giubileo, 1170 m, 7.V.1983 (PRN). **Calabria**: Mauritana (Santo Stefano di Rogliano, CS), 1100 m, 12.IV.1982 (RTN, PRN).

1987 *Orthosia cruda* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *pulverulenta* Esper, 1786)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Settore appenninico: pressochè tutte le stazioni; Settore tosco laziale: pressochè tutte le stazioni; Settore marchigiano: pressochè tutte le stazioni; Settore salentino: pressochè tutte le stazioni; Settore campano calabro: pressochè tutte le stazioni".

1991 *Orthosia gothica* (Linnaeus, 1758)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni".

Nuovi dati - **Basilicata**: Pollino: Lago Fondo (PZ) 1700 m 15.V.1983; Monte Vulture (PZ) 1350 m 30.IV.1983 (PRN). **Calabria**: Mauritana (Santo Stefano di Rogliano, CS), 1100 m, 12.IV.1982 (RTN, PRN).

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

1997 *Atethmia ambusta* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche in **Abruzzo**: 1901-1925; (2373).

1999 *Tiliacea citrago* (Linnaeus, 1758)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter).

2001 *Tiliacea sulphurago* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter).

2004 *Xanthia icteritia* (Hufnagel, 1766)

Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).

2007 *Agrochola lychnidis* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni".

2027 *Conistra vaccinii* (Linnaeus, 1761)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressochè in tutti i settori della penisola; poche stazioni del settore alpino orientale, nessuna nel settore alpino occidentale e nel settore ligure, nessuna nel settore garganico, nell’apulo salentino, nel settore sardo, una sola nel settore siculo”.

Non presente in **Sicilia**. Le citazioni per l’isola vanno riferite a *Conistra iana* (3473).

2027 bis - ***Conistra jana* Zilli & Grassi 2006**

Nota - Le citazioni di *C. ligula* per la **Sicilia**, sono da riferire a *C. iana* (3473), (3501), che sostituisce *C. ligula* in **Sicilia**.

**Sicilia**: 1851-1900; 1976-2000; (360); (3473).

2029 ***Conistra rubiginosa* (Scopoli, 1763)**

La citazione per il **Friuli** (2185), è generica. Confermata la presenza in **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter).

2031 ***Conistra veronicae* (Hübner, 1813)**

Nota - La citazione per il Monte Ermada 18.XI.1927 (2286), (2373), erroneamente attribuita al **Friuli** in (3500), (3501), va riferita alla **Venezia Giulia**.

Non ancora segnalata in **Friuli**.

2034 ***Conistra ragusae* (Failla-Tedaldi, 1890)**

Presente anche in **Puglia**: 2001-2008; (3515).

2035 ***Conistra rubiginea* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Basilicata**: Pollino: Lago Fondo (PZ), 1700 m, 15.V.1983 (PRN).

**Calabria**: Mauritana (Santo Stefano di Rogliano, CS), 1100 m, 12.IV.1982 (RTN, PRN).

2043 ***Lithophane furcifera* (Hufnagel, 1766)**

Confermata per il **Piemonte**: 1951-1975; (3539).

2051 ***Xylena vetusta* (Hübner, 1813)**

Nota - La citazione generica per l’**Italia meridionale**: (3239 bis) è ripresa da (2931); non presente in **Italia meridionale**.

2054 ***Evisa schawerdae* Reisser, 1930**

Presente anche in **Abruzzo**: 1976-2000; (3493).

2056 ***Dryobota labecula* (Esper, 1788)** (= *furva* Esper, 1791; *occlusa* Hübner, 1824)

Presente anche nell’**Arcipelago sardo**: 1951-1975; (1910).

2058 ***Dichonia aeruginea* (Hübner, 1808)** (= *miouleuca* Treitschke, 1835)

*Hadena miouleuca* è descritta su esemplari della **Sicilia** (75).

2059 ***Dichonia convergens* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Basilicata**: fiume Camastra (PZ): Cantoniera Inferno 450 m 30.X.1979 (PRN).

2062 ***Dryobotodes eremita* (Fabricius, 1775)**

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter).

2067 ***Dryobotodes tenebrosa* (Esper, 1789)**

*Phalaena Noctua tenebrosa* è descritta su esemplari della **Toscana**: Firenze (15 ter\*).  
Erroneamente come luogo tipico è stata indicata Erlangen (Germania) (3079).

Nota - La citazione per la **Romagna**: (2346), erroneamente attribuita alla **Romagna** in (3500), va riferita all'**Emilia**: (8501).

Non ancora segnalata in **Romagna**.

Presente anche in Emilia: 1976-2000; (2346).

2071 *Ammoconia caecimacula* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)

Nuovi dati - **Basilicata**: Pollino: Lago della Duglia (PZ), 1600 m, 9.X.1983; Fiume Mercure (Rotonda, PZ) 320-330 m 6.X.1980 (PRN).

2073 *Ammopolia witzenmanni* (**Standfuss, 1890**)

Nuovi dati - **Puglia**: Mottola (TA): gravina di Petruscio, 100-150 m, 7.XI.1983 (PRN).

2074 *Trigonophora flammea* (**Esper, 1785**) (= *empyrea* Hübner, 1803)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché in tutte le stazioni".

Nuovi dati - **Basilicata**: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 8 e 18.X.1983 (PRN).

2075 *Aporophyla australis* (**Boisduval, 1829**)

Nuovi dati - **Basilicata**: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 6, 11 e 18.X.1983; Metaponto (MT) località San Marco 3.XI.1980; Fosso Paraturo (Rotonda, PZ) 400 m 2.XI.1981 (PRN).

2079 *Aporophyla nigra* (**Haworth, 1809**) (= *aethiops* Treitschke, 1825)

*Agrotis aethiops* è descritta su esemplari della **Toscana**: Firenze (75).

Nota - Berio: (2373) nel testo riporta Monte Santa Caterina (settore alpino or.); nell'elenco delle località cita due Santa Caterina, entrambe nello stesso settore: Santa Caterina di Avelengo e Santa Caterina Valfurva; Monte Santa Caterina però dovrebbe essere St. Katharinaberg, italianizzato, sempre dello stesso settore ma in prossimità di Rattisio (BZ).

Nuovi dati - **Puglia**: Torre Guaceto (BR) 1 m 15.X.1979; Mottola (TA): gravina di Petruscio, 100-150 m, 7 e 22.XI.1983 (PRN). **Basilicata**: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 11.X.1983; Fiume Mercure (Rotonda, PZ) 320-330 m 2.XI.1981; Fosso Paraturo (Rotonda, PZ) 400 m 2.XI.1981; Timpone Castellana (Massiccio del Pollino, PZ) 1100 m 5.X.1980 (PRN).

Presente anche in **Alto Adige**: 1976-2000; (2373).

2080 *Aporophyla canescens* (**Duponchel, 1826**) (= *pumicosa* Geyer, 1832)

*Noctua pumicosa* è descritta su esemplari della **Sicilia** (52\*), (2576).

2081 *Dasypolia templi* (**Thunberg, 1792**)

Presente anche in **Puglia**: 2001-2008; (3515).

2082 *Dasypolia ferdinandi* **Rühl, 1892**

Presente anche in **Piemonte**: 2001-2008; (3539).

2095 *Mniotype spinosa* (**Chrétien, 1911**)

Nota - La citazione di *M. spinosa* per l'**Arcipelago campano** in (2511) va riferita a *M. solieri*, come indicato in (3500), (3501).

Presente anche nell'**Arcipelago siciliano**: 2001-2008; (3491).

2097 *Mniotype solieri* (**Boisduval, 1829**)

*Mniotype solieri* è descritta in Errata et Addenda. Index Methodicus: 4 (1829); locus typicus Alpes provinc. (Provence; Francia S) (60). È solo elencata in Genera et Index Methodicus Europaeorum Lepidopterorum: 120 (1840); per Galloprov. (Provence; Francia S) e **Sicilia (Italia)** (88).

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni, tranne in Sardegna dove, come in Spagna e nelle Baleari, è sostituita da *spinosa*".

Nuovi dati - **Basilicata**: Metaponto (MT) località San Marco 3.XI.1980; Vulture: Monticchio laghi (PZ), 700 m, 30.IX.1983; Pollino: Rotonda (PZ), 950 m, 14.IX.1979, 23.IX.1981; Timpone Castellana 13.IX.1979 (PRN).

2100 *Episema glaucina* (**Esper, 1789**)

Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: "Reperti in Italia: Pressoché in tutte le stazioni".

Nuovi dati - **Basilicata**: Vulture: Monticchio laghi, 700 m, 30.IX.1983 (PRN).

**Campania**: Serino (AV), 600 m, 13.X.1984 (RTN, PRN).

Presente anche in **Campania**: 1976-2000.

2101 *Episema tersa* (**Denis & Schiffermüller, 1775**) (= *trimacula* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione di *Derthisa trimacula* Schiff., erroneamente riportata per l'**Umbria**: (894), ripresa in: (3500), (3501) va riferita al **Lazio**.

Non ancora segnalata in **Umbria**.

Presente anche nel **Lazio**: 1901-1925; (894), e nel **Molise**: 2001-2008; (3453 bis).

2109 *Meganephria bimaculosa* (**Linnaeus, 1767**) (= *italica* Esper, 1791)

Confermata la presenza in **Lombardia**: 1951-1975; (2014).

2111 *Allophyes corsica* (**Spuler, 1905**) (= *parenzani* de Laever, 1976; *oxyacanthae* auct.)

Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 1976-2000; (2373).

2115 *Praestilbia armeniaca* **Staudinger, 1892**

Contrariamente a quanto detto in (3500), (3501), risulta una segnalazione per l'**Italia**.

Rinvenuta nella **Venezia Giulia**: 1951-1975; (1780).

2116 *Xylocampa areola* (**Esper, 1789**) (= *lithoriza* Borkhausen, 1792)

Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 1951-1975; (2041).

2121 *Euxoa birivia* (**Denis & Schiffermüller, 1775**)

Nota - La citazione per la **Romagna** di *E. birivia*: (2717), ripresa in (3460), (3500), (3501), va riferita all'**Emilia**. *E. birivia* non è segnalata in **Romagna**.

Presente anche in **Emilia**: 1976-2000; (2717).

2121 bis *Euxoa oranaria* (**A. Bang-Haas, 1906**) (= *psimmythiosa* Boursin, 1958)

Nota - Nuova per la fauna italiana.

Rinevenuta in **Sicilia**: 1976-2000; (3239 bis).

2129 *Euxoa nigricans* (Linnaeus, 1761)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

2142 *Agrotis segetum* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *sicula* Boisduval, 1829; *dimidia* Zeller, 1847; *sicania* Guenée, 1852)

Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 1951-1975; (2110).

2147 *Agrotis puta* (Hübner, 1803) (= *lignosa* Godart, 1825; *erythroxylea* Treitschke, 1826)

*Noctua lignosa* è descritta su esemplari della **Toscana** (40\*), (2576). *Xylina erythroxylea* è descritta su esemplari di **Italia** e Francia meridionale (45).

Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 1901-1925; (781).

2149 *Agrotis syricola* Berio, 1936

Presente anche in **Romagna**: 1976-2000; (3522).

2154 *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766) (= *suffusa* Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 1951-1975; (2110).

2155 *Agrotis bigramma* (Esper, 1790)

Nuovi dati - **Puglia**: Mottola (TA): gravina di Petruscio, 100-150 m, 5.X.1984 (PRN).

Presente anche nel **Friuli**: 1901-1915; (1053 bis).

2156 *Agrotis lata* Treitschke, 1835 (= *dirempta* Staudinger, 1859)

Presente anche nell'**Arcipelago siciliano**: 2001-2008; (3491).

2161 *Dichagyris candelisequa* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter).

2164 *Yigoga nigrescens* (Höfner, 1888)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter).

2165 *Yigoga forcipula* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *romanoi* Berio, 1980)

*Ochropleura* (*Yigoga*) *romanoi* è descritta su esemplari della **Sicilia**: Madonie (Castelbuono), Puccia 300 m (2184).

2168 *Actebia praecox* (Linnaeus, 1758)

Confermata per il **Piemonte**: 1951-2008; (3539).

2169 *Basistriga flammatra* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La nuova segnalazione: Valtellina: Sant'Antonio di Valfurva 10.IX.1933 (3501), riportata erroneamente per il **Veneto**, va riferita alla **Lombardia**.

Confermata la presenza in **Lombardia**: 1926-1950; (3501).

2170 *Albocosta musiva* (Hübner, 1803)

Nota - La citazione di *O. musiva* per la **Romagna** (Corniolo 600 m VII) in: (2516), ripresa in (3062), (3500), (3501), ed erroneamente riportata in: (3429) come citata in: (2412), è un errore di cartellinatura, probabilmente da riferire alla **Valle d'Aosta** (3522).

Non ancora segnalata in **Romagna**.

2173 *Ochropleura leucogaster* (Freyer, 1831)

Nuovi dati - **Calabria**: Umbriatico (KR), 422 m, 14.VII.1982 (RTN, PRN).

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3462 ter); e nella **Venezia Giulia** 2001-2008; (3464 bis).

2183 *Epipsilia grisescens* (Fabricius, 1794)

Presente anche in **Basilicata**: 2001-2008; (3532).

2186 *Rhyacia lucipeta* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione per la **Liguria**: (1659) è da riferire alla **Lombardia**.

È riportata genericamente per la **Liguria**: (1976-2000); (3460).

Nuovi dati - **Liguria**: Langhe, Cengio (SV), località Castello 23.IX.1951 (GLL, PRN).

Confermata la presenza in **Liguria**: 1951-1976,

2187 *Chersotis rectangula* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione per la **Liguria**: (1659), riportata in (3500), (3501), va riferita all'**Emilia**. Per la **Liguria** è citata solo genericamente per le Alpi Marittime: (114), (3183). Da confermare.

2189 *Chersotis ocellina* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La nuova citazione Passo Vizza (recte Vize) 2300 m 21.VII.1990 (3501), erroneamente attribuita al **Trentino**, va riferita all'**Alto Adige**. La nuova citazione Passo Valparola 2200 m 24.VII.1990 (3501), erroneamente attribuita al **Trentino**, va riferita al **Veneto**. La nuova citazione Valtellina: Val Cedeo 2500 m VII.1950 (3501), erroneamente attribuita al **Veneto**, va riferita alla **Lombardia**.

2199 *Chersotis fimbriola* (Esper, 1803) (= *maravignae* Duponchel, 1826)

*Noctua maravignae* è descritta su esemplari della **Sicilia**: Monti delle Madonie (46\*), (2576).

2200 *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758)

Nota - La nuova citazione per Grottarossa 12.V.1988 (3501), erroneamente attribuita al **Piemonte**, va riferita al **Lazio**.

2201 *Noctua fimbriata* (Schreber, 1759) (= *fimbria* Linnaeus, 1767; *solani* Fabricius, 1787)

Nuovi dati - **Basilicata**: Pollino: Terranova (PZ): sorgente Acquafredda, 1300 m, 3.VI.1981 (PRN).

2202 *Noctua tirrenica* Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983

Presente anche nella **Venezia Giulia** 2001-2008; (3464 bis), e in **Emilia**: 1975-2010; (3454 bis).

2204 *Noctua interposita* (Hübner, 1790)

Presente anche in **Lombardia**: 2001-2008; (3378 bis).

2206 *Noctua interjecta* Hübner, 1803

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

2207 *Noctua janthe* (Borkhausen, 1792)

Nota - Diversi indizi e ricerche sperimentali indicano che in passato *janthe* forse era una sottospecie, ma oggi è solo una forma infraspecifica di *janthina*. Le differenze nei genitali sono minime e non del tutto costanti e anche negli abituali caratteri distintivi compaiono molte forme di transizione. Inoltre i risultati degli allevamenti indicano che da femmine di *janthe* accanto a forme chiaramente intermedie si possono ottenere come discendenza anche evidenti *janthina* (3528).

Pertanto probabilmente questa specie è da eliminare dalla fauna italiana ed i dati da riferire a *N. janthina*.

2210 *Epilecta linogrisea* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2000; (3462 ter).

2222 *Lycophotia erythrina* (Herrich-Schäffer, 1852)

Confermata la presenza nel **Lazio**: 2001-2008; (3493).

2223 *Peridroma saucia* (Hübner, 1808) (= *margaritosa* Haworth, 1809)

Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 1951-1975; (1910), (2110).

2224 *Diarsia dablii* (Hübner, 1813)

Presente anche in **Piemonte**: 1951-1975; (3539); e nel **Friuli** 2001-2008; (3464 bis).

2227 *Diarsia rubi* (Vieweg, 1790)

Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis).

2247 *Xestia ochreago* (Hübner, 1809)

Presente anche nel **Friuli** 2001-2008; (3464 bis).

2250 *Xestia xanthographa* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *lepida* Costantini, 1922)

Nuovi dati - **Campania**: Battipaglia (SA): Cioffi 25.X.1984 (RTN, PRN). **Basilicata**: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 25.IX.1981, 6.X.1983 (PRN).

2255 *Cerastis rubricosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).

2258 *Naenia typica* (Linnaeus, 1758)

Nuovi dati - **Molise**: Gambatesa, torrente Tappino, 23.VI.2004 (SCR).

Presente anche nel **Molise**: 2001-2008; (3453 bis).

2261 *Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758)

Nuovi dati - **Basilicata**: Monticchio Sgarroni (PZ): località Grotticelle, 500-600 m, 19.IV.1980; Rotonda (PZ), 650 m, 10.VI.1978, 19.V, 23.VII.1979, 8.VI, 17.VII.1980, 28.III, 9.V, 8.VIII.1981, 16.V.1983; Pollino: Lago Fondo 1700 m 15.V.1983; Terranova di Pollino (PZ): sorgente Acquafredda, 1300 m, 3.VI.1981; Lago della Duglia (Massiccio del Pollino, PZ) 1600 m, 18.VI, 18.VII.1982 (PRN); **Calabria**: Santo Stefano di Rogliano (CS), 1100 m, 5-10.VII.1981 (RTN, PRN).

2274 *Orgyia antiqua* (Linnaeus, 1758) (= *gonostigma* Scopoli, 1763; *recens* Hübner 1819, sensu Forster & Wohlfahrt, 1960)

Nuovi dati - **Calabria**: Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 22.VII.2002 (SCL).

2278 *Teia dubia* (Tauscher, 1806)

- Presente anche nell'**Arcipelago siciliano**: 1976-2000; (2857), (3206).
- 2283 *Leucoma salicis* (**Linnaeus, 1758**)  
Confermata per il **Friuli** 2001-2008; (3464 bis).
- 2289 *Nola confusalis* (**Herrich-Schäffer, 1847**)  
Nota - Le segnalazioni per la **Romagna** di *N. confusalis* in (2516), (3007), (3429 bis), sono da riferire a *N. cicatricalis* (3522).  
Non ancora segnalata in **Romagna**.
- 2293 *Nola cristatula* (**Hübner, 1793**)  
Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter).
- 2295 *Nola chlamitulalis* (**Hübner, 1813**) (= *chlamydulana* Duponchel, 1845)  
*Nola chlamydulana* è descritta su esemplari della **Sicilia** (104 \*), (2609).  
Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).
- 2297 *Nycteola revayana* (**Scopoli, 1772**)  
Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis).
- 2300 *Nycteola asiatica* (**Krulikowsky, 1904**)  
Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).
- 2301 *Nycteola sicilana* (**Fuchs, 1899**) (= *cuneana* Patocka, 1953)  
*Sarothrips cuneana* è stata descritta su una femmina dell'**Alto Adige**: Terlano (1605).
- 2304 *Pseudoips prasinana* (**Linnaeus, 1758**) (= *faganus* Fabricius, 1781; *sylvana* Fabricius, 1783; *fiorii* Costantini, 1911)  
Nuovi dati - **Basilicata**: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 3.VI.1981, Pollino: Rotonda (PZ), 600 m, 16.IX.1979, 17.VII, 9 e 10.VIII.1980, Rotonda (PZ) località Valli, 700 m, 18.VII.1980 (PRN). **Calabria**: Monte Moschereto (CS), 800 m, 15.VII.1980 (PRN). **Puglia**: Mottola (TA): gravina di Petruscio, 100-150 m, 5.X.1984 (PRN).
- 2307 *Earias vernana* (**Fabricius, 1787**)  
Presente anche nella **Venezia Giulia**: 2001-2008; (3464 bis).
- 2310 *Thumatha senex* (**Hübner, 1808**)  
Presente anche in **Toscana**: 2001-2008; (3493).
- 2319 *Pelosia obtusa* (**Herrich-Schäffer, 1847**)  
Presente anche nel **Friuli**: 2001-2008; (3464 bis).
- 2330 *Eilema pygmaeola* (**Doubleday, 1847**)  
Presente anche nel **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
- 2332 *Eilema lutarella* (**Linnaeus, 1758**)  
Presente anche in **Friuli**: 1901-1925; (628).
- 2338 *Setina irrorella* (**Linnaeus, 1758**)  
Presente anche in **Calabria**: 1976-2000; (3211).
- 2341 *Setina roscida* (**Denis & Schiffermüller, 1775**) (= *kublweini* Hübner, 1824)  
Non presente in **Piemonte**. La citazione generica: (114) va riferita a *S. irrorella*: (3539).

2344 *Syntomis ragazzii* Turati, 1917

*Synthomis bertula* è descritta su esemplari della **Calabria**: Aspromonte 900-1100 m (924). È sinonimo di *S. ragazzii* var. *asperomontana* Turati, 1917 (868), in: (1804).

2346 *Syntomis kruegeri* Ragusa, 1904

Nota - La località Pollino: Monte Cerviero, Acquatemola, citata in (3501), va corretta in Pollino: Acquatemola (PZ) 1500 m.

2349 - *Dysauxes punctata* (Fabricius, 1781)

Nota - Le citazioni di *D. punctata* per la **Romagna** in: (1010), (1885), riprese in: (1943), (3500), (3501), sono da riferire a *D. famula* (3007), (3522).

Non ancora segnalata in **Romagna**.

2351 *Coscinia cribraria* (Linnaeus, 1758) (= *cribrum* Linnaeus, 1761)

Nuovi dati - **Sicilia**: Palermo: Villa Alliata 19.V, 26.VIII.1926, 30.IV, 5 e 18.V.1927, VIII.1928, 6.V.1929, 1.V.1932, 9.V.1945, 10.IX.1947 (ALL).

2354 *Utetheisa pulchella* (Linnaeus, 1758) (= *pulchra* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Sicilia**: Caronia (ME), 304 m, X.1926, VI.1927; Palermo: Villa Alliata 3 e 27.IX, 5 e 8.X, 18.XI.1925, 19.V, 15 e 18.IX, 1.XI.1926, X.1927, VI, IX e X.1929, 3.IV.1932; Mondello XI.1925 (ALL).

Presente anche nell'**Arcipelago sardo**: 1951-1975; (2110).

2357 *Ocnogyna parasita* (Hübner, 1790)

Nota - La citazione per il **Piemonte**: (293) va cassata, in quanto la località Madone de Fenestra 2000 m attualmente è in territorio francese. La prima citazione per il **Piemonte** è: (2894).

2358 *Chelis maculosa* (Gerning, 1780)

Nuovi dati - **Piemonte**: Bardonecchia (TO): Vallestretta 1700 m 13.VII.2005 (Teobaldelli *in litt.*). **Marche**: Monte Prata (MC) 1500 m 5.VII.2005 (Teobaldelli *in litt.*).

2359 *Chelis simplonica* (Boisduval, 1840)

Nota - La citazione per il **Veneto** in (769), ripresa in (1038), (2894), (3500), (3501), va riferita all'**Alto Adige**.

Non presente nel **Veneto**.

2364 *Cymbalophora rivularis* (Ménétriés, 1832)

Nota - Turati in (553) comunica che Dannehl nel 1907 ha catturato tre individui di *Euprepia rivularis* sulla Majella, senza altre notizie; sempre Turati, in (894) dice "Gli interessanti esemplari di questa specie raccolti nell'**Abruzzo**, che il signor Sohn Rethel ritenne appartenere ad una razza particolare italiana, ch'egli chiamò *dannehli*, non mi pare giustificino il loro nome", che pertanto può essere radiato; Dannehl in (1127) cita *Euprepia rivularis dannehli* Turati, 1919, e descrive quattro nuove aberrazioni; O. Bang-Haas in (1157 ter) elenca una *Euprepia rivularis* ssp. *dannehli* O. Sohn-Rethel i. l., Dannehl (Mitt. Münchner ent. Ges. 18, p. 102 (1929)), dicendo che però la descrizione

non è stata pubblicata. La ssp. *dannebli* è una ssp. *fantasma*, non descritta da Turati, nè da Dannehl, nè da Sohn-Rethel.

Nuovi dati - **Umbria**: Monti Sibillini: Castelluccio di Norcia (PG) 1500 m 6.IX.1973, 19.VIII.2005 (Teobaldelli *in litt.*).

2373 ***Diaphora mendica* (Clerck, 1759)**

Confermata per il **Friuli**: 1976-2008; (3462 ter).

2377 ***Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758)** (= *russula* Linnaeus, 1758)

Nota - La citazione Sulmona 26.VII.1979 (3501), erroneamente riportata per l'**Umbria**, va riferita all'**Abruzzo**.

2384 ***Arctia villica* (Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per la **Sicilia** vanno riferite a *A. konewkaii* (Freyer, 1831), specie distinta, che la sostituisce nell'isola: (3484).

2384 bis ***Arctia konewkaii* (Freyer, 1831)**

Nota - Endemismo siculo che sostituisce *A. villica* nell'isola (3484).

Presente solo in **Sicilia**: 1801-2005; (97); (3228).

2385 ***Arctia festiva* (Hufnagel, 1766)** (= *hebe* Linnaeus, 1767)

Nuovi dati - **Sicilia**: San Martino delle Scale (PA), 580 m, 30.IV, 11 e 12.V.1927, 2.V.1929, Cinisi (PA), 75 m, 6.V.1927, tutte ex larva (ALL).

2388 ***Tyria jacobaeae* (Linnaeus, 1758)** (= *senecionis* Godart, 1832)

Nuovi dati - **Sicilia**: Palermo: Morana 7.IV-9.V.1935 ex larva, Villa Alliata 29.V.1926, 25.IV.1935 (ALL).

#### AUTORI CITATI

I seguenti titoli di bibliografia sostituiscono o integrano, con lo stesso numero d'ordine, le corrispondenti citazioni bibliografiche - pubblicate in allegato a Phytophaga, XV - perchè queste ultime sono errate o incomplete.

#### CORRIGENDA

4\* LINNÉ C., 1763 - Museum S.ae R.ae M.tis Ludovicae Ulrica Reginae Svaecorum... - Stockholmiae, vi+720 pp.

6 ALLIONI C., 1766 - Manipulus Insectorum Taurinensium - *Miscellanea di Filosofia e Matematica della Società Reale di Torino per gli anni 1762-1765*, 3 (7): 185-198.

12\* - VON LAICHARTING J.N., 1782 - in Fuessly: Archiv der Insecten-geschichte - Steiner, Zürich u. Winthertur. 3 vol., 53 Tavv.

16\* BORKHAUSEN M.B., 1788-1794 - Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge nach systematischer Ordnung. I (Tagschmetterlinge) - Frankfurt. I (Tagschmetterlinge) (1788) 36+288 pp., I tav, II (1789), III (1790), IV (1792), V (1794).

53 BOISDUVAL J.A., (1828) 1829 - Essay sur une Monographie des Zygénides suivi du Tableau méthodique des Lépidoptères d'Europe - Chez Mèquignon-Marvin, Libraire-Editeur, Paris, XXVI + 132 pp.

- 56\* FREYER C.F., 1828 - Beyträge zur Geschichte europäischer Schmetterlinge, mit Abbildungen nach der Natur. T. 1 - Rieger, Nürnberg, 1: 164 pp, 48 Tavv.
- 60 (60\*+61\*) BOISDUVAL J.A., 1829 - Errata et Addenda - Monographie des Zygénides. Europaeorum Lepidopterorum Index Methodicus - De l'Imprimerie de Plassant et C.ie, Rue de Vaugirard, N° 15, Derrière l'Odeon, 8 pp.
- 147 BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1861 - Observations sur la faune entomologique de la Sicile. Lépidoptères de Sicile - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 3° serie, VIII (1860): 667-713.
- 349 RIGGIO G., 1888-1889 - Materiali per una fauna entomologica dell'Isola d'Ustica. Seconda contribuzione - *Il Naturalista Siciliano*, VII (12) (1888): 292-298; VIII (1) (1888): 20-22, (5) (1889): 115-121.
- 483 - l'autore è LEONHARDT e non LEONHARD
- 568 HOFFMANN F., 1909 - Ausflug nach Adelsberg in Krain und und Triest-Muggia in Istrien - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 2 (1908/09) (45): 284, (47): 294-295.
- 637 DIETZE K., 1910 - Biologie der Eupitheciën. Erster Teil. Abbildungen - Friedländer & Sohn, Berlin, 30 pp., 82 Tavv.
- 654 MARCHI G., 1910 - I Ropaloceri del Trentino - Società degli Alpinisti Tridentini, Trento, 190 pp.
- 757 DIETZE K., 1913 - Biologie der Eupitheciën. Zweiter Teil. Text - Friedländer & Sohn, pp. I-III + 172, 4 Tavv., Berlin.
- 807 TURATI E., 1915 - Contribuzioni alla Fauna d'Italia e descrizione di specie e forme nuove di Lepidotteri. I. Lepidotteri della Valcamonica. II. Faunula dei Monti Aurunci e delle Mainarde (Lazio Meridionale) - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, LIII (1914): 468-619.
- 828 VERITY R., 1914 - Contributo allo studio della variazione nei Lepidotteri tratto principalmente da materiale di Toscana, delle Marche e di Calabria - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XLV (1913): 203-238.
- 829 VERITY R., 1914 - Elenco di lepidotteri Ropaloceri dell'Alto Appennino Pistoiese (900-2000 m. circa) - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XLV (1-4) (1913): 139-154.
- 923 STAUDER H., 1921 - Neue Zygænaformen aus Südtalien - Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde, II (4): 30-31.
- 1054 BANG-HAAS O., 1926 - Novitates macrolepidopterologicae. Katalog der im "Seitz" nicht enthaltenen und seitdem neu beschriebenen palaearktischen Macrolepidopteren. 1. Band. Bis zum Jahre 1920 - Dresden-Blasewitz, 238 pp.
- 1210 BRYK F. & EISNER C., 1932 - Kritische Revision der Gattung *Parnassius* unter Benutzung der Materials der Collection Eisner, Dahlem [cont.] - *Parnassiana*, 2: 12-14; 27-30; 34-42; 51-65; 69-102; 1 pl.
- 1272 VERITY R., 1934-1936 - The Lowland Races of Butterflies of the Upper Rhone Valley - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, suppl. XLVI (1934): (1)-(40); XLVII (1935): (41)-(76); XLVIII (1936): (77)-(90).
- 1656 WOLFSBERGER J., 1960 - Die Grossschmetterlinge des Gardaseegebietes als Ausdruck des dortigen mediterranen Klimas - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona*, VIII: 127-146.
- 1691 MELLINI E., 1962 - Studi sui Ditteri Larvevoridi. VIII. *Strobliomyia tibialis* R. D. su *Lithosia complana* L. (Lepidoptera Arctiidae) e generalità sulla sopravvivenza degli insetti ospiti all'esodo dei parassitoidi - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna*, XXVI: 103-129.
- 1732 WOLFSBERGER J., 1963 - Ein weiterer nachweis von *Hydraecia püngeleri* Trt. (Lep. Noct.) - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona*, XI: 125-127.
- 2250 BIERMANN H. & HESCH F.-J., 1982 - Beiträge zur Tagfalterfauna Sardiniens (Lep., Rhopalocera u. Hesperiiidae) - *Atalanta*, Würzburg, XIII (4): 266-293.
- 2849 HAUSMANN A., 1995 - Revision der altweltlichen Arten der Gattung *Microloxia* Warren, 1893

- (Lepidoptera, Geometridae: Geometrinae) - *Atalanta*, Würzburg, 25 (1994) (3/4): 571-608.
- 2874 RAVIGLIONE M.C., BOGGIO F. & RAVIGLIONE M., 1994 - Lepidotteri Ropaloceri dell'alta Valle Sessera in Piemonte (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 125 (3): 255-258.
- 2974 HUEMER P., 1997 - Lepidopteren im Bereich der dealpinen flüsse Meduna und Tagliamento (Friuli-Venezia Giulia, Norditalien) - *Gortania, Atti del Museo Friulano di Storia Naturale*, Udine, 18 (1996): 201-214, 2 figg.
- 3428 Il nome della rivista è *Aldrovandia* e non *Aldovrandia*
- 3436 Il nome della rivista è *Aldrovandia* e non *Aldovrandia*
- 3366 DAPPORTO L., 2004 - Due specie di lepidotteri nuove per l'Arcipelago Toscano: *Cacyreus marshalli* Butler, 1898 e *Aletia languida* (Walker, 1858) (Lycaenidae, Noctuidae) - *Atti della Società toscana di Scienze naturali residente in Pisa*, Memorie, Serie B, 110 (2003): 1-2.
- 3463 FLAMIGNI C., FIUMI G. & PARENZAN P., 2007 - Lepidotteri Eteroceri d'Italia. Geometridae Ennominae I - Natura Edizioni Scientifiche, Bologna, 382 pp., 16 Tavv. col.
- 3469 SCALERCIO S. & INFUSINO M., 2006 - I Macrolepidotteri notturni del basso corso della Fiumara del Trionto (Calabria, Italia meridionale) (Lepidoptera) - *Quaderni della Stazione di Ecologia del Civico Museo di Storia naturale di Ferrara*, 16: 181-204.
- 3470 SCIARRETTA A., PARENZAN P. & MANCINI M., 2006 - I Lepidotteri cavernicoli in Italia - Atti 3° Incontro di Studi "Il Carsismo nell'Area Mediterranea", Castro Marina (Lecce) 16 - 18 settembre 2005, in *Thalassia salentina*, 29 Suppl: 139-158.
- 3471 TIMOSSO G., 2006 - Lepidotteri Eteroceri del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi: secondo contributo (Lepidoptera Geometridae, Noctuidae, Lymantriidae) - *Lavori - Società Veneziana di Scienze Naturali*, 31: 11-16.

#### ADDENDA

- 15 ter ESPER E.J.C., 1788-1791 - Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. Die europäischen Schmetterlinge. Vierten Theils zweiter Band erster Abschnitt welcher die Eulenphalenen - Erlangen, im Verlage Wolfgang Walthers: 378-397, 408-415, 466-483, 494-501, 516-526, 594-601.
- 18 bis\* BORKHAUSEN M.B., 1790 - in Scriba, Beiträge zur Insekten Geschichte - Frankfurt
- 21 ter BORKHAUSEN M.B., 1793 - VI. Entomologische Bemerkungen und Berichtigungen - *Rheinisches Magazin zur Erweiterung der Naturkunde* - Giesen, 1: 625-651.
- 176 bis MILLIÈRE P., 1869-1874 - Iconographie et Description de Chénilles et Lépidoptères inédits. Tome III - Lyon. Tome III.
- 206 bis MANN J., 1873 - Zwei neue Schaben aus Sicilien - *Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XXIII: 130-132.
- 1053 bis STAUDER H., 1925-1929 - Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro-Adriatica). 3. Abschnitt. III. Systematischer Teil: Noctuidae - *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie*, Berlin, XX (1925) (8): 191-226; XXI (1926) (8/9): 179-190, (10): 223-238; XXII (1927): 30-45.
- 1091 bis REBEL H., 1927 - Eine neue südalpine Geometride: *Larentia mesembrina* Rbl. (nov. spec.). In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXVI (2): (68)-(71), 1 fig., (1926).
- 1157 bis STAUDER H., 1929-1933 - Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro-Adriatica). 4. Abschnitt. III. Systematischer Teil: Geometridae, Nolidae, Syntomidae, Arctiidae, Zygaenidae, Psychidae, Sesiidae - *Entomologischer Anzeiger*, Wien, IX (1929): 39-41, 53-58, 65-72, 88-94, 115-117, 131-137, 157-158, 177-178, 194-199, 213-218, 233-236, 251-252, 272-273, 292-293, 299-306, 318-325, 359-364, 379-384, 397-403, 420-423, 437-442; X (1930): 9-11, 36-37, 52-57, 75-77, 105-108, 133-136, 153-155, 201-204, 249-252, 275-276, 294-297, 309-310, 351-352, 374-377, 436-437; XII (1932): 35-39, 53-54, 71-72, 131-132, 150-152, 200, 233-234, 256; XIII (1933): 18-20.

- 1157 ter BANG-HAAS O., 1930 - Novitates macrolepidopterologicae. Katalog der Neubeschreibungen von palaarktischen Macrolepidopteren. Band V. Neubeschreibungen des Jahres 1929. Faunenverzeichnisse der Jahre 1758 bis 1930 - Dresden-Blasewitz, 208 pp.
- 1254 bis WEHRLI E., 1933 - Psychidae - in Seitz: Die Palaarktischen Spinner und Schwärmer. Supplement vol. 2 - Alfred Kernen Verlag, Stuttgart: 241-226.
- 1602 bis CROWSON R.A., 1958 - Some observations on a coleopterological visit to Central Italy - *Entomologist's Monthly Magazine*, 94: 248-251.
- 2047 bis TARMANN G., 1975 - Die Zygaeniden Nordtirols (Insecta: Lepidoptera). Versuch einer Zusammenfassung des bisherigen Kenntnisstandes - *Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum Innsbruck*, 55: 113-251.
- 2224 bis EITSCHBERGER U. & STEINIGER H., 1981 - Eine neue Unterart von *Notodonta tritophus* (Esper, 1786) aus den Alpen (Lep., Notodontidae) - *Atalanta*, Würzburg, 12 (5): 361-368.
- 2448 bis MILO DI VILLAGRAZIA P., 1986 - Le farfalle diurne (Rhopalocera) di Gorizia e dintorni - Poster. Tipografia Sociale, Gorizia.
- 2481 bis EITSCHBERGER U., 1994 - *Notodonta tarburi* Eitschberger & Steiniger, 1981 stat. rev. et stat. nov. (Lepidoptera, Notodontidae) - *Atalanta*, Würzburg, 25 (1/2): 281-296.
- 2980 bis KLEINEKUHLE J., 1996 - Zoogeographische Analyse der Balearen und Sardokorsiens (unter besonderer Berücksichtigung der Lepidopteren) - Diplomarbeit an der Universität Oldenburg, 70 pp.
- 3002 bis VIGNALI G., 1996 - Guida alle mostre fotografiche. Lepidotteri - VI Settimana della cultura Scientifica, Parco della Rinchiostra 25-31 marzo 1996, Massa: 1-21.
- 3239 bis HACKER H.H., 2001 - Fauna of the Nolidae and Noctuidae of the Levante with descriptions and taxonomic notes (Lepidoptera, Noctuoidea). Appendix: Revision of the genus *Clytie* Hübner, [1823] - *Esperiana*, Schwanfeld, 8: 7-398, 130 figs., 25 col. pls.
- 3294 bis JUTZELER D., SALA G., MORANDINI C., VEROVNIK R. & VOLPE G., 2002 - The identification, variation, races and distribution of *Erebia styx* (Freyer, 1834) and *E. stirius* (Godart, 1824) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) (4th part of the *styx/stirius*-series devoted to *Erebia stirius*) - *Linneana Belgica*, XVIII (7): 335-350.
- 3315 bis BOILLAT H., 2003 - *Coenonympha lyllus* Esper, 1805, spec. rev. Une nouvelle approche taxinomique du complexe *pamphilus* (Lepidoptera Nymphalidae Satyrinae) - *Alexanor*, 22 (5) (2002): 243-309.
- 3324 bis DRESCHER J. & JAUBERT R., 2003 - *Paysandisia archon* continues sa progression - *PHM - Revue Horticole*, 445: 49-51.
- 3346 bis SANNINO L., 2003 - *Spodoptera littoralis* in Italia: possibili ragioni della crescente diffusione e mezzi di lotta - *Informatore Fitopatologico*, LIII (6): 28-31.
- 3378 bis HUEMER P., 2004 - Assessment of the species diversity of Lepidoptera in a relict forest of the Po plain - a first attempt - In: Cerretti P., Handersen S., Mason F., Nardi G., Tisato M. & Zapparoli M., Invertebrati di una foresta della Pianura Padana - Bosco della Fontana - secondo contributo - *Conservazione Habitat Invertebrati* - 3: 185-194, Verona.
- 3382 bis LEMM H., 2004 - Rezente Schmetterlingsnachweise im Südtiroler Vinschgau - *Forest observer*, 1: 101-120.
- 3429 bis DAPPORTO L., FIORINI G., FIUMI G. & GOVI G., 2005 - Farfalle e Falene. Lepidoptera. In: Atlante della Biodiversità del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: 113-151.
- 3432 ter FLAMIGNI C., REZBANYAI-RESER L. & SCHÄFFER E., 2005 - Macroheterocera, Repubblica di San Marino - Specie catturate durante la 2° manifestazione European Moth Nights - [www.european-moth-nights.ch.vu](http://www.european-moth-nights.ch.vu)
- 3453 bis SCIARRETTA A., 2005 - Phytoclimatic areas and Macrolepidoptera fauna in the Molise region (Italy) - Abstracts XIV European Congress of Lepidopterology, Rome - Italy 12-17 September 2005: 55.
- 3454 bis SPETTOLI R., 2005 - Contributo alla conoscenza dei Lepidotteri crepuscolari e notturni del Ferrarese con note su *Gastropacha populifolia* (Esper, 1783) - *Annali del Museo civico di Storia*

- naturale di Ferrara*, 6 (2003): 21-27.
- 3455 bis TIMOSSO G., 2005 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 441 - *Dysgonia torrida* (Guenée, 1852) (Lepidoptera Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 137 (2): 139-140.
- 3461 ter CASSULO L. & CAVALLO O., 2006 - I Lepidotteri Diurni e le Zigene del Museo "F. Eusebio" - *Alba Pompeia*, n. s., XXV/II: 5-48.
- 3461 quater DAPPORTO L., FIUMI G. & GOVI G., 2006 - Interessanti specie di Lepidotteri Eteroceri della regione sardo-corsa (Lepidoptera Heterocera) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 138 (1): 45-50.
- 3462 ter DEUTSCH H., 2006 - Beitrag zur Lepidopterenfauna von Friaul Julisch Venetien (Norditalien). Teil 1: Provinz Udine (Karnische Alpen, Karnische Voralpen, oberer Tagliamento) - *Gortania, Atti del Museo Friulano di Storia Naturale*, Udine, 27 (2005): 227-298.
- 3463 FLAMIGNI C., FIUMI G. & PARENZAN P., 2007 - Lepidotteri Eteroceri d'Italia. Geometridae Ennominae I - Natura Edizioni Scientifiche, Bologna, 382 pp., 16 Tavv. col.
- 3464 bis HUEMER H. & MORANDINI C., 2006 - Wetland habitats in Friuli Venezia Giulia: relict areas of biodiversity for Lepidoptera - *Gortania, Atti del Museo Friulano di Storia Naturale*, Udine, 27 (2005): 137-226.
- 3464 cinque JUTZELER D. & VOLPE G., 2006 - Confirmation de la dualité du "Petit Sylvandre" diagnostiquée par Leraut (1990). 3ème partie: figurations d'*Hipparchia alcyone* Denis et Schiffermüller (1775) et d'*H. genava* Fruhstorfer (1908) dans la littérature (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica*, XX (6): 229-233.
- 3477 BERTACCINI E. & CAMPRI V., 2007 - Rinvenute in Liguria occidentale due specie nuove er l'Italia: *Idaea lybicata* (Barterl, 1906), *Eupithecia rosmarinata* (Dardoin & Millière, 1865) ed altre specie di particolare interesse faunistico (Insecta Lepidoptera Heterocera) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna*, 24: 117-133, 16 figg., 1 Tav. col.
- 3479 CHIAVETTA M., 2007 - L'*Apatura ilia* (Denis & Schiffermueller 1775) - *Apatura*, N. 0: 5-9.
- 3480 CICERALE A.M., 2007 - Nuove specie di lepidotteri ropaloceri del Subappennino dauno (Italia meridionale - Puglia). Lycaenidae, Hesperidae, Satyridae, Nymphalidae - Osservatorio di Ecologia Appenninica, Roseto Valfortore, Contributi scientifici alla conoscenza del Subappennino dauno. N° 2, 103 pp.
- 3481 CUPEDO F., 2007 - Geographical variation and Pleistocene history of the *Erebia pandrose-sthenyo* complex (Nymphalidae; Satyrinae) - *Nota lepidopterologica*, 30 (2): 329-353.
- 3484 DE FREINA J. & NARDELLI U., 2007 - Revision des *Arctia villica*-Komplex - 1. Teil: Nomenklatur und Systematik der adriato- und atlantomediterranen Arten *Arctia villica* (Linnaeus, 1758 (partim), *Arctia angelica* (Boisduval, 1829) stat. nov. und *Arctia konewkaii* (Freyer, 1831) stat. rev. (Lepidoptera: Arctiidae, Arctiinae) - *Entomologische Zeitschrift*, Stuttgart, 117 (3): 105-123.
- 3486 ESPINOSA B. & SANNINO L., 2007 - Un lepidottero nuovo per la fauna europea: *Hipoepa fractalis* (Guenée) dannoso a orchidee in serra - Proceeding XXI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Campobasso, 11-16 Giugno 2007: 192.
- 3489 FIBIGER M. & HACKER H., 2007 - Noctuidae Europaeae. Vol. 9. Amphipyridae - Xyleninae - Entomological Press, Sorø: 410 pp., 12 Tavv. col., 288 figg.
- 3491 FIUMI G., GUIDI M. & FOLIGATTI I., 2007 - Interessanti reperti della Lepidotterofauna italiana raccolti nell'isola di Lampedusa (Insecta Lepidoptera) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna*, 24: 107-116.
- 3493 GRASSI A., PIMPINELLI I., PINZARI M. & ZILLI A., 2007 - Some noteworthy records of macromoths from Central Italy (Lepidoptera) - *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia*, 62 (1-4): 131-144.
- 3494 HENSLE J., 2007 - Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae und Lycaenidae 2006 - *Atalanta*, Würzburg, 38 (1/2): 15-135.
- 3496 INFUSINO M. & SCALERCIO S., 2007 - I macrolepidotteri notturni della faggeta di Monte

- Curcio, Sila Grande (Calabria, Italia meridionale) - Proceeding XXI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Campobasso, 11-16 Giugno 2007: 59.
- 3498 MORANDINI C. & ZILLI A., 2007 - Note su due specie di *Shargacucullia* italiane (Lepidoptera, Noctuidae) - *Gortania, Atti del Museo Friulano di Storia Naturale*, Udine, 28 (2006): 131-138, 10 figg.
- 3500 PARENZAN P. & PORCELLI F., 2007 - I macrolepidotteri italiani. Fauna Lepidopterorum Italiae (Macrolepidoptera) - *Phytophaga*, XV (2005-2006): 5-391.
- 3501 PARENZAN P. & PORCELLI F., 2007 - I macrolepidotteri italiani. Fauna Lepidopterorum Italiae (Macrolepidoptera) - *Phytophaga*, XV (2005-2006): 1-1051. Allegato in p.d.f.
- 3502 PIGNATARO C., FIUMI G. & VICIDOMINI S., 2007 - I lepidotteri Geometridi conservati nel Museo Naturalistico di Corleto Monforte (SA): reperti della Campania - Proceeding XXI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Campobasso, 11-16 Giugno 2007: 67.
- 3505 QUACCHIA A., FERRACINI C. & ALMA A., 2007 - Adattamento di *Cacyreus marshalli* Butler (Lepidoptera Lycaenidae) a Geraniacee endemiche della flora italica - Proceeding XXI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Campobasso, 11-16 Giugno 2007: 193.
- 3507 RIOLO P., NARDI S., CARBONI M., RIGA F., PIUNTI A. & ISIDORO N., 2007 - Insetti associati ad *Arecaceae* nelle Marche - Proceeding XXI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Campobasso, 11-16 Giugno 2007: 216.
- 3513 SCALERCIO S., IANNOTTA N. & BRANDMAYR P., 2007 - The role of semi-natural and abandoned vegetation patches in sustaining lepidopteran diversity in an organic olive orchard - *Bulletin of Insectology*, 60 (1): 13-22.
- 3514 SCARAVELLI D., CARLINI A. & TRENTINI M., 2007 - I lepidotteri nell'analisi ambientale: transetti in ambienti differenziali dell'Appennino riminese - Proceeding XXI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Campobasso, 11-16 Giugno 2007: 77.
- 3515 SCIARRETTA A. & CICERALE A.M., 2007 - Popolamenti a macrolepidotteri in biotopi di interesse naturalistico del Subappennino Dauno - Proceeding XXI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Campobasso, 11-16 Giugno 2007: 71.
- 3516 SIESA M., PAVESI M. & CANTINI M., 2007 - La Palude di Albate: indagini entomologiche per il piano di gestione del SIC - Proceeding XXI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Campobasso, 11-16 Giugno 2007: 72.
- 3517 VEGLIANTE F. & ZILLI A., 2007 - The Butterflies and Moths of the Park and surroundings (Lepidoptera). In: *Artropodi del Parco Nazionale del Vesuvio: ricerche preliminari - Conservazione Habitat Invertebrati*, 4: 307-364.
- 3518 VICIDOMINI S. & DINDO M.L., 2007 - Prima segnalazione europea di parassitizzazione di *Cacyreus marshalli* (Butler) da parte di un Tachinide indigeno - Proceeding XXI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Campobasso, 11-16 Giugno 2007: 355.
- 3522 BERTACCINI E., 2008 - Note integrative sulla Macrolepidotterofauna romagnola (Insecta Lepidoptera Rhopalocera, Heterocera) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna*, 26: 91-128, 12 figg., 1 Tav. col.
- 3523 BERTACCINI E., FIUMI G., PARENZAN P. & ZILLI A., 2008 - Lepidotteri Eteroceri d'Italia. Noctuidae 1 (Calpinae e Catocalinae) - *Natura Edizioni Scientifiche*, Bologna, 287 pp., 16 Tavv. col.
- 3524 CASINI P.M., 2008 - Biogeografia di *Melanargia arge* (Sulzer, 1776) in Toscana e Umbria - *Apatura*, N. 1: 9-12.
- 3528 FLAMIGNI C., REZBANYAI-RESER L. & SCHÄFFER E., 2008 - Dati per la fauna delle farfalle notturne della Repubblica di San Marino (Lepidoptera: "Macroheterocera") (2° Notti europee delle farfalle notturne 2005). In: *Suzzi Valli A., Casali S., Santi D. & Busignani G. (eds.), Scritti e Ricerche di Storia Naturale della Repubblica di San Marino. Vol. I (1997-2007) - Centro Naturalistico Sammarinese. San Marino.*
- 3530 MOSCONI F., 2008 - Primi dati sulla biologia riproduttiva e sull'ecologia di due specie cavernicole affini: *Triphosa dubitata* e *T. dyriata* - *Atti del Convegno Biospeleologia nell'Appennino, San Vittore di Genga (AN) 8-9 Marzo 2008: 45-50.*

- 3532 SCALERCIO S., 2008 - Novità faunistiche sui Lepidotteri notturni del Parco Nazionale del Pollino (Italia Meridionale) (Lepidoptera Heterocera) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 140 (2): 115-120.
- 3533 SCALI S., RAINERI V. & FAVA A., 2008 - Considerazioni fenologiche, ecologiche e faunistiche sui Geometridi del Lajone nel Gruppo del Monte Beigua, Appennino Ligure Occidentale (Lepidoptera, Geometridae) - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia Naturale di Milano*, 149 (1): 125-144.
- 3538 TEOBALDELLI A., 2008 - Elenco aggiornato dei Lepidotteri rinvenuti all'interno di alcune caverne nelle Marche - Atti del Convegno Biospeleologia nell'Appennino, San Vittore di Genga (AN) 8-9 Marzo 2008: 66-70.
- 3539 HELLMANN F. & PARENZAN P., 2009 - I Macrolepidotteri del Piemonte - Regione Piemonte, Museo Regionale di Scienze Naturali, Monografie, in stampa.